Prontuario antibiotici veterinari autorizzati in Italia per categoria AMEG

a cura dell'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Viterbo

Edizione n. 1 – Ottobre 2026

Classificazione EMA – AMEG (categorie A, B, C, D) · Fonti: banca dati europea UPD dei medicinali veterinari e open data del Ministero della Salute

Prontuario antibiotici veterinari autorizzati in Italia per categoria AMEG (Ed. Ottobre 2026 a cura dell'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Viterbo)

Classificazione: EMA - Categorizzazione degli antibiotici destinati all'impiego negli animali (AMEG), pag. 2 dell'infografica.
Specialità: banca dati europea dei medicinali veterinari UPD (medicines.health.europa.eu/veterinary), ricerca per sostanza con filtro 'Autorizzato in: Italia' e stato 'Autorizzato'. Estrazione del 22/10/2026.
Sono inclusi solo medicinali veterinari autorizzati in Italia. Esclusi i medicinali per uso umano e quelli autorizzati solo in altri Paesi.
Specie DPA: animali destinati alla produzione di alimenti (il cavallo è considerato DPA salvo dichiarazione di non DPA). Specie non DPA: animali da compagnia e altre specie non destinate al consumo umano (indicate anche come «Cavallo Non DPA» e «Coniglio Non DPA»). Il colombo è considerato specie DPA per le specialità registrate anche per altre specie DPA e specie non DPA per quelle registrate per uccelli da gabbia e da voliera (compresi i colombi viaggiatori).
Una specialità contenente più antibiotici della stessa categoria AMEG compare sotto ciascuna molecola (es. associazioni sulfamidico + trimetoprim). Se le molecole appartengono a categorie diverse, la specialità compare solo nella categoria a rischio più alto (D = 1, C = 2, B = 3, A = 4), sotto la molecola corrispondente.

Codici AIC: elenco open data del Ministero della Salute «Farmaci veterinari» (dati.salute.gov.it), versione del 22/10/2026, una riga per confezione. Abbinamento alle specialità per denominazione, dosaggio, forma farmaceutica, via di somministrazione e codice ATCvet; le specialità autorizzate ma assenti dall'elenco ministeriale sono indicate come «Non presente nell'elenco ministeriale».
Tempi di attesa: dall'elenco ministeriale «Farmaci veterinari», per specie (e categoria), tessuto e via di somministrazione, riuniti per tutte le confezioni della specialità. Prima dell'uso verificare sempre il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP) aggiornato.

AVVERTENZA: le specialità riportate sono quelle che risultano autorizzate (registrate) in Italia; non si dispone di dati certi sulla loro effettiva disponibilità in commercio. Le informazioni d'uso riportate (specie di destinazione, vie di somministrazione, tempi di attesa) hanno carattere indicativo e vanno sempre verificate nel foglietto illustrativo e nel Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP) aggiornati della specialità.

Categoria D - PRUDENZA

Classe di antibiotici	Molecola	Specialità veterinaria	Sostanze attive	Forma farmaceutica	Specie DPA	Specie non DPA	Vie di somministrazione	Tempi di attesa	Codice AIC	ATCvet	Uso (da ATCvet)
AMINOPENICILLINE SENZA INIBITORI DELLE BETA-LATTAMASI	amoxicillina	AMARCORD	Amoxicillin	Polvere per soluzione orale	Bovini (vitello), Suino, Pollo (pollo da carne), Tacchino		Uso orale	Bovini (vitelli): carne 2 giorni (uso orale) Pollo: carne 1 giorni (uso orale) Suino: carne 1 giorni (uso orale) Uccelli (tacchino): carne 1 giorni (uso orale)	105748014	QJ01CA04	Sistemico
		Amoxibactin 250 mg compresse per cani Amoxibactin 250 mg tablets for dogs	Amoxicillin trihydrate	Compressa		Cane	Uso orale		104712017 104712029 104712031 104712043 104712056 104712068 104712070 104712082 104712094	QJ01CA04	Sistemico
		Amoxibactin 50 mg compresse per cani e gatti Amoxibactin 50 mg tablets for dogs and cats	Amoxicillin trihydrate	Compressa		Cane, Gatto	Uso orale		104712017 104712029 104712031 104712043 104712056 104712068 104712070 104712082 104712094	QJ01CA04	Sistemico
		Amoxibactin 500 mg compresse per cani Amoxibactin 500 mg tablets for dogs	Amoxicillin trihydrate	Compressa		Cane	Uso orale		104712017 104712029 104712031 104712043 104712056 104712068 104712070 104712082 104712094	QJ01CA04	Sistemico
		AMOXICILLIN GLOBAL VET HEALTH 500 mgg powder for use in drinking water for chickens turkeys ducks and pigs AMOXICILLINA GLOBAL VET HEALTH 500 mgg polvere per uso in acqua da bere per polli tacchini anatre e suini	Amoxicillin trihydrate	Polvere per somministrazione in acqua da bere	Tacchino, Polli, Anatra, Suino		Uso orale	Pollo: carne 1 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino: carne 2 giorni (somministrazione in acqua da bere) Uccelli (anatre): carne 9 giorni (somministrazione in acqua da bere) Uccelli (tacchino): carne 5 giorni (somministrazione in acqua da bere)	104848015 104848027 104848039 104848041	QJ01CA04	Sistemico
		AMOXID 800 mgg polvere per soluzione orale per vitelli suini polli da carne e tacchini	Amoxicillin trihydrate	Polvere per somministrazione in acqua da bere/latte	Bovini (vitello), Suino, Pollo (pollo da carne), Tacchino		Uso orale	Bovini (vitelli): carne 2 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Pollo (broiler): carne 1 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino: carne 1 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Uccelli (tacchino): carne 1 giorni (somministrazione in acqua da bere)	102298015 102298027 102298039 102298041 102298054 102298066 102298078	QJ01CA04	Sistemico
		Amoxifarma 800 mg g Polvere solubile ad uso in acqua da bere per suini broilers tacchini anatre oche faraone fagiani starne piccioni pernici e quaglie	Amoxicillin trihydrate	Polvere per somministrazione in acqua da bere	Quaglia, Tacchino, Pollo (pollo da carne), Anatra, Oca, Faraona, Pernice, Fagiano, Suino, Colombo		Somministrazione in acqua da bere	Bovini (vitelli da latte): carne 3 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Pollo (broiler): carne 1 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino: carne 1 giorni (somministrazione in acqua da bere) Uccelli (anatre): carne 1 giorni (somministrazione in acqua da bere) Uccelli (fagiani): carne 1 giorni (somministrazione in acqua da bere) Uccelli (faraone): carne 1 giorni (somministrazione in acqua da bere) Uccelli (oche): carne 1 giorni (somministrazione in acqua da bere) Uccelli (pernici/starne): carne 1 giorni (somministrazione in acqua da bere) Uccelli (piccione/colomba): carne 1 giorni (somministrazione in acqua da bere) Uccelli (quaglie): carne 2 giorni (somministrazione in acqua da bere) Uccelli (tacchino): carne 1 giorni (somministrazione in acqua da bere)	103727018 103727032 103727044 103727057 103727069	QJ01CA04	Sistemico
		AMOXINDOX 50 g100 g polvere per uso in acqua da bere per polli da carne tacchini e suini	Amoxicillin	Polvere per somministrazione in acqua da bere	Pollo (pollo da carne), Tacchino, Suino		Somministrazione in acqua da bere/latte	Pollo (broiler): carne 1 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino: carne 6 giorni (somministrazione in acqua da bere) Uccelli (tacchino): carne 1 giorni (somministrazione in acqua da bere)	102219019 102219021 102219033 102219045	QJ01CA04	Sistemico
		AMOXINDOX 80 g100 g polvere per uso in acqua da bere per polli da carne tacchini e suini	Amoxicillin	Polvere per somministrazione in acqua da bere	Pollo (pollo da carne), Tacchino, Suino		Somministrazione in acqua da bere/latte	Pollo (broiler): carne 1 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino: carne 6 giorni (somministrazione in acqua da bere) Uccelli (tacchino): carne 1 giorni (somministrazione in acqua da bere)	102219019 102219021 102219033 102219045	QJ01CA04	Sistemico
		Amoxy Active 697 mgg oral powder for pigs and chickens	Amoxicillin trihydrate	Polvere orale	Polli, Suino		Somministrazione in acqua da bere	Pollo: carne 1 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino: carne 2 giorni (somministrazione con il mangime, somministrazione in acqua da bere/latte); carne 5 giorni (somministrazione con il mangime)	104643010 104643022 104643034 104643046 104643059 104643061 104643073	QJ01CA04	Sistemico
		AMOXY ACTIVE CTD 697 mgg polvere per uso in acqua da bere per polli tacchini e anatre Amoxy Active CTD 697 mgg Powderfor Use in Drinking Water for Chickens Turkeys and Ducks	Amoxicillin trihydrate	Polvere per somministrazione in acqua da bere	Polli, Tacchino, Anatra		Somministrazione in acqua da bere	Pollo: carne 1 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Uccelli (anatre): carne 9 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte); organi 9 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Uccelli (tacchino): carne 5 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte)	105209011 105209023 105209035 105209047 105209050 105209062 105209074	QJ01CA04	Sistemico

Categoria D - PRUDENZA

Classe di antibiotici	Molecola	Specialità veterinaria	Sostanze attive	Forma farmaceutica	Specie DPA	Specie non DPA	Vie di somministrazione	Tempi di attesa	Codice AIC	ATCvet	Uso (da ATCvet)
AMINOPENICILLINE SENZA INIBITORI DELLE BETA-LATTAMASI	amoxicillina	AMOXYSOL LA	Amoxicillin trihydrate	Sospensione iniettabile	Bovini, Suino	Cane, Gatto	Uso intramuscolare; Uso sottocutaneo	Bovini (bovini da carne): carne 88 giorni (uso intramuscolare) Bovini (vitelli da latte): latte 6 giorni (uso intramuscolare) Suino (suini da ingrasso): carne 50 giorni (uso intramuscolare)	102471012 102471024 102471036 102471048	QJ01CA04	Sistemico
		BETAMOX LA 150 mgml sospensione iniettabile per bovini suini cani e gatti	Amoxicillin	Sospensione iniettabile	Suino, Bovini		Uso intramuscolare	Bovini: carne 39 giorni (uso intramuscolare); latte 108 ore (uso intramuscolare) Suino: carne 42 giorni (uso intramuscolare)	102806015 102806027 102806039 102806041 102806054 102806066 102806078	QJ01CA04	Sistemico
		BIMOXYL LA 150 mgml sospensione iniettabile per bovini e suini	Amoxicillin	Sospensione iniettabile	Bovini, Suino		Uso intramuscolare	Bovini: carne 23 giorni (uso intramuscolare); latte 72 ore (uso intramuscolare) Suino: carne 20 giorni (uso intramuscolare)	102255015 102255027 102255039 102255041	QJ01CA04	Sistemico
		Bimoxyvet LA 150 mgml Suspension for Injection for cattle sheep and pigs Bimoxyvet LA 150 mgml sospensione iniettabile per bovini ovini e suini	Amoxicillin trihydrate	Sospensione iniettabile	Bovini, Ovino, Suino		Uso intramuscolare	Bovini: carne 18 giorni (uso intramuscolare); latte 72 ore (uso intramuscolare) Ovini: carne 21 giorni (uso intramuscolare) Suino: carne 21 giorni (uso intramuscolare)	104999014 104999026 104999038 104999040	QJ01CA04	Sistemico
		BIOCILLINA	Amoxicillin trihydrate + Cloxacillin hemibenzathine	Sospensione iniettabile	Bovini		Uso intramuscolare	Bovini: carne 35 giorni (uso intramuscolare); latte 60 ore (uso intramuscolare)	102003011 102003023	QJ01CR50	Sistemico
		Citramox 1000 mgg powder for use in drinking water for chickens ducks turkeys and pigs	Amoxicillin trihydrate	Polvere per somministrazione in acqua da bere	Tacchino, Polli, Anatra, Suino		Somministrazione in acqua da bere	Pollo: carne 1 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino: carne 2 giorni (somministrazione in acqua da bere) Uccelli (anatre): carne 9 giorni (somministrazione in acqua da bere) Uccelli (tacchino): carne 5 giorni (somministrazione in acqua da bere)	105492033	QJ01CA04	Sistemico
		CITRAMOX LA 150 mgml sospensione iniettabile per bovini e suini CITRAMOX LA 150 mgml suspension for injection for cattle and pigs	Amoxicillin trihydrate	Sospensione iniettabile	Bovini, Suino		Uso intramuscolare	Bovini: carne 18 giorni (uso intramuscolare); organi 18 giorni (uso intramuscolare) Bovini: latte 3 giorni (uso intramuscolare) Suino: carne 20 giorni (uso intramuscolare); organi 20 giorni (uso intramuscolare)	105443016 105443028	QJ01CA04	Sistemico
		CLAMOXYL LA Sospensione iniettabile 150 mgml per suini cani e gatti	Amoxicillin	Sospensione iniettabile	Suino	Gatto, Cane	Uso sottocutaneo; Uso intramuscolare	Suino: carne 90 giorni (uso intramuscolare); organi 90 giorni (uso intramuscolare)	100236013 100236025 100236037	QJ01CA04	Sistemico
		Clamoxyl RTU 150 mgml sospensione iniettabile per bovini suini ovini cani e gatti	Amoxicillin	Sospensione iniettabile	Bovini, Ovino, Suino	Cane, Gatto	Uso intramuscolare; Uso sottocutaneo	Bovini: carne 40 giorni (uso intramuscolare); latte 60 ore (uso intramuscolare) Ovini: carne 44 giorni (uso intramuscolare); latte 96 ore (uso intramuscolare) Suino: carne 47 giorni (uso intramuscolare)	101427019 101427021	QJ01CA04	Sistemico
		EFFEKTOR	Amoxicillin trihydrate	Polvere orale	Tacchino, Polli, Bovini (vitello), Suino		Somministrazione in acqua da bere/latte	Bovini (vitelli): carne 2 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Pollo: carne 1 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Suino: carne 1 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Uccelli (tacchino): carne 1 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte)	104814013 104814025	QJ01CA04	Sistemico
		GAMMAMIX	Amoxicillin trihydrate	Premiscela per alimenti medicamentosi	Tacchino, Pollo (pollo da carne), Bovini (vitello), Pesce, Suino		Somministrazione con il mangime	Bovini (vitelli): carne 22 giorni (somministrazione con il mangime) Pesci: carne 225 gradi giorno (somministrazione con il mangime) Pollo (broiler): carne 5 giorni (somministrazione con il mangime) Suino: carne 2 giorni (somministrazione con il mangime) Uccelli (tacchino): carne 5 giorni (somministrazione con il mangime)	103322018	QJ01CA04	Sistemico
		HUVACILLIN 800 mgg polvere per uso nellacqua da bere per polli e suini Huvacillin 800 mgg Powder for use in drinking water for chickens and pigs	Amoxicillin trihydrate	Polvere per somministrazione in acqua da bere	Polli, Suino		Somministrazione in acqua da bere	Pollo: carne 1 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino: carne 2 giorni (somministrazione in acqua da bere)	105632018 105632020 105632032 105632044	QJ01CA04	Sistemico
		Huvamox 800 mgg powder for use in drinking water for chickens turkeys ducks and pigs	Amoxicillin trihydrate	Polvere per somministrazione in acqua da bere	Tacchino, Polli, Anatra, Suino		Somministrazione in acqua da bere	Pollo: carne 1 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino: carne 2 giorni (somministrazione in acqua da bere) Uccelli (anatre): carne 9 giorni (somministrazione in acqua da bere) Uccelli (tacchino): carne 5 giorni (somministrazione in acqua da bere)	105496018 105496020 105496032 105496044	QJ01CA04	Sistemico
		IZOMAST pomata endomammaria per bovine in lattazione	Cloxacillin sodium + Amoxicillin sodium	Pomata intramammaria	Bovini (vacca in lattazione)		Per uso intramammario	Bovini (bovine /vacche in lattazione): carne 12 giorni (uso intramammario); latte 96 ore (uso intramammario)	102030018	QJ51RC26	Intramammario
		Kelamoxil LA 150 mgml suspension for injection for cattle and pig	Amoxicillin	Sospensione iniettabile	Bovini, Suino		Uso intramuscolare	Bovini: carne 18 giorni (uso intramuscolare); latte 3 giorni (uso intramuscolare) Suino: carne 20 giorni (uso intramuscolare)	105715015 105715027 105715039 105715041	QJ01CA04	Sistemico
		LAMOX 800 MGG POLVERE PER USO IN ACQUA DA BERE PER POLLI Lamox 800 mgg powder for use in drinking water for chickens and pigs	Amoxicillin trihydrate	Polvere per somministrazione in acqua da bere	Suino, Pollo (gallina)		Uso orale	Pollo (broiler): carne 2 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino: carne 2 giorni (somministrazione in acqua da bere)	104237019 104237021 104237033	QJ01CA04	Sistemico
		Lamoxsan 150 mgml sospensione iniettabile per bovini e suini Lamoxsan 150 mgml suspension for injection for cattle and pigs	Amoxicillin	Sospensione iniettabile	Bovini, Suino		Uso intramuscolare	Bovini: carne 18 giorni (uso intramuscolare); latte 3 giorni (uso intramuscolare) Suino: carne 20 giorni (uso intramuscolare)	105716017 105716029 105716031 105716043	QJ01CA04	Sistemico

Categoria D - PRUDENZA

Classe di antibiotici	Molecola	Specialità veterinaria	Sostanze attive	Forma farmaceutica	Specie DPA	Specie non DPA	Vie di somministrazione	Tempi di attesa	Codice AIC	ATCvet	Uso (da ATCvet)
AMINOPENICILLINE SENZA INIBITORI DELLE BETA-LATTAMASI	amoxicillina	LONGOCILLINA LA 150 mgml sospensione iniettabile per bovini e suini	Amoxicillin	Sospensione iniettabile	Bovini, Suino		Uso intramuscolare	Bovini: carne 18 giorni (uso intramuscolare); latte 72 ore (uso intramuscolare) Suino: carne 16 giorni (uso intramuscolare)	104220013 104220025 104220037 104220052 104220064 104220076 104220088	QJ01CA04	Sistemico
		MAYMOXI 100 mgg PREMIX MAYMOXI 100 GKG PREMISCELA PER SUINI	Amoxicillin trihydrate	Premiscela per alimenti medicamentosi	Suino (suinetto)		Somministrazione con il mangime	Suino: carne 8 giorni (somministrazione con il mangime)	104026012	QJ01CA04	Sistemico
		MICROAMOX 300 gkg premiscela per mangimi medicati per suini	Amoxicillin trihydrate	Premiscela per alimenti medicamentosi	Suino		Uso orale	Suino: carne 7 giorni (somministrazione con il mangime)	102474018 102474020	QJ01CA04	Sistemico
		MIXACILLINA 100 MGG	Amoxicillin trihydrate	Premiscela per alimenti medicamentosi	Suino		Somministrazione con il mangime	Suino: carne 2 giorni (somministrazione con il mangime)	105044010	QJ01CA04	Sistemico
		MOXAPULVIS 500 mgg powder for use in drinking water	Amoxicillin trihydrate	Polvere per somministrazione in acqua da bere	Tacchino, Polli, Anatra, Suino		Somministrazione in acqua da bere	Pollo: carne 1 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino: carne 2 giorni (somministrazione in acqua da bere) Uccelli (anatre): carne 9 giorni (somministrazione in acqua da bere) Uccelli (tacchino): carne 5 giorni (somministrazione in acqua da bere)	105110011 105110023 105110035	QJ01CA04	Sistemico
		OCTACILLIN 697 MGG POLVERE PER USO IN ACQUA DI BEVANDA PER SUINI Octacillin 800 mgg powder for use in drinking water for pigs amoxicillin trihydrate	Amoxicillin trihydrate	Polvere per somministrazione in acqua da bere	Suino		Somministrazione in acqua da bere	Suino: carne 2 giorni (somministrazione in acqua da bere)	104330016 104330028 104330030 104330042	QJ01CA04	Sistemico
		Octacillin 697 mgg Powder for use in drinking water Octacillin 697 mgg polvere solubile per uso orale per polli	Amoxicillin trihydrate	Polvere per somministrazione in acqua da bere	Polli		Uso orale	Pollo (broiler): carne 1 giorni (somministrazione in acqua da bere)	103775019 103775021 103775033 103775045	QJ01CA04	Sistemico
		QALIAMOX	Amoxicillin trihydrate	Polvere per somministrazione in acqua da bere	Bovini (vitello), Suino		Somministrazione in acqua da bere/latte	Bovini (vitelli): carne 28 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Suino: carne 28 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte)	102574011 102574023 102574035	QJ01CA04	Sistemico
		Rhemox 500 mgg polvere da usare in acqua da bere per suini polli da carne anatre da carne e tacchini da carne Rhemox 500 mgg powder for use in drinking water for pigs chicken broilers duck broilers and turkeys for meat production	Amoxicillin trihydrate	Polvere per somministrazione in acqua da bere	Suino, Pollo (pollo da carne), Tacchino (da carne), Anatra (anatra da carne)		Somministrazione in acqua da bere	Pollo (broiler): carne 1 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Suino: carne 6 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Uccelli (anatre): carne 9 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Uccelli (tacchino): carne 5 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte)	104893033 104893045	QJ01CA04	Sistemico
		RHEMOX FORTE Robucina 1000 mgg powder for use in drinking water for chickens ducks turkeys	Amoxicillin trihydrate	Polvere per somministrazione in acqua da bere	Tacchino, Anatra, Polli		Somministrazione in acqua da bere	Pollo: carne 1 giorni (somministrazione in acqua da bere) Uccelli (anatre): carne 9 giorni (somministrazione in acqua da bere) Uccelli (tacchino): carne 5 giorni (somministrazione in acqua da bere)	104831019 104831021 104831033 104831045 104831058	QJ01CA04	Sistemico
		RHEMOX PREMIX 100 mgg Premix for medicated feeding stuff for pigs	Amoxicillin trihydrate	Premiscela per alimenti medicamentosi	Suino		Somministrazione con il mangime	Suino: carne 4 giorni (somministrazione con il mangime)	104052016 104052028	QJ01CA04	Sistemico
		SOLAMOCTA 697 MGG POLVERE DA SOMMINISTRARE NEL ACQUA DA BERE PER POLLIANATRE E TACCHINI Solamocta 697 mgg Powder for Use in Drinking Water for Chickens Ducks and Turkeys	Amoxicillin trihydrate	Polvere per somministrazione in acqua da bere	Polli, Tacchino, Anatra		Somministrazione in acqua da bere; Uso orale	Pollo (broiler): carne 1 giorni (somministrazione in acqua da bere) Uccelli (anatre): carne 9 giorni (somministrazione in acqua da bere) Uccelli (struzzi): carne 5 giorni (somministrazione in acqua da bere) Uccelli (tacchino): carne 5 giorni (somministrazione in acqua da bere)	104763014 104763026 104763038 104763040	QJ01CA04	Sistemico
		STABOX 5 PREMIX	Amoxicillin	Premiscela per alimenti medicamentosi	Suino (suinetto)		Somministrazione con il mangime	Suino: carne 8 giorni (somministrazione con il mangime)	102486014 102486026 102486038 102486040 102486053 102486065	QJ01CA04	Sistemico
		SUPRAMOX SP 700 mgg polvere per uso orale per vitelli suini polli tacchini anatre faraone fagiani e quaglie	Amoxicillin	Polvere per somministrazione in acqua da bere/latte	Bovini (vitello), Suino, Tacchino, Quaglia, Anatra, Fagiano, Faraona, Polli		Uso orale	Bovini (vitelli): carne 20 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Pollo (broiler): carne 2 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Pollo: carne 2 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Suino: carne 2 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte, somministrazione con il mangime) Uccelli (anatre): carne 2 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Uccelli (fagiani): carne 2 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Uccelli (faraone): carne 2 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Uccelli (quaglie): carne 2 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Uccelli (tacchino): carne 2 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte)	101963015 101963027 101963039 101963054 101963066 101963078 101963080	QJ01CA04	Sistemico
		SUPRAMOX SP 700 mgg premiscela per alimenti medicamentosi per suini	Amoxicillin	Premiscela per alimenti medicamentosi	Suino		Uso orale	Bovini (vitelli): carne 20 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Pollo (broiler): carne 2 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Pollo: carne 2 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Suino: carne 2 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte, somministrazione con il mangime) Uccelli (anatre): carne 2 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Uccelli (fagiani): carne 2 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Uccelli (faraone): carne 2 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Uccelli (quaglie): carne 2 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Uccelli (tacchino): carne 2 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte)	101963015 101963027 101963039 101963054 101963066 101963078 101963080	QJ01CA04	Sistemico
		SURAMOX STABOX 50 OSP POULTRY	Amoxicillin trihydrate	Polvere per soluzione orale	Pollo (pollo da carne)		Uso orale	Non disponibile (specialità assente dall'elenco ministeriale)	Non presente nell'elenco ministeriale	QJ01CA04	Sistemico

Categoria D - PRUDENZA

Classe di antibiotici	Molecola	Specialità veterinaria	Sostanze attive	Forma farmaceutica	Specie DPA	Specie non DPA	Vie di somministrazione	Tempi di attesa	Codice AIC	ATCvet	Uso (da ATCvet)
AMINOPENICILLINE SENZA INIBITORI DELLE BETA-LATTAMASI	amoxicillina	SURAMOX 1000 MGG POWDER FOR USE IN DRINKING WATER FOR CHICKENS DUCKS TURKEYS	Amoxicillin trihydrate	Polvere per somministrazione in acqua da bere	Tacchino, Anatra, Polli, Pollo (pollo da carne)		Uso orale	Non disponibile (specialità assente dall'elenco ministeriale)	Non presente nell'elenco ministeriale	QJ01CA04	Sistemico
		SURAMOX 50 POWDER FOR ORAL SOLUTION FOR PIGS	Amoxicillin trihydrate	Polvere per soluzione orale	Suino		Uso orale	Non disponibile (specialità assente dall'elenco ministeriale)	Non presente nell'elenco ministeriale	QJ01CA04	Sistemico
		Trymox LA 150 mgml Suspension for Injection for Cattle Sheep Pigs Dogs and Cats	Amoxicillin trihydrate	Sospensione iniettabile	Bovini, Ovino, Suino	Cane, Gatto	Uso intramuscolare; Uso sottocutaneo	Bovini: carne 39 giorni (uso intramuscolare); latte 108 ore (uso intramuscolare) Bovini (bovini da latte): latte 84 ore (uso intramuscolare) Ovini: carne 29 giorni (uso intramuscolare) Suino: carne 42 giorni (uso intramuscolare)	105242010 105242022 105242034 105242046 105242059 105242061	QJ01CA04	Sistemico
		ZOOBIOTIC 150 mgml sospensione iniettabile per bovini ovini suini equini cani e gatti	Amoxicillin	Sospensione iniettabile	Bovini, Ovino, Cavallo, Suino	Cane, Gatto	Uso intramuscolare; Uso sottocutaneo	Bovini: carne 29 giorni (uso intramuscolare, uso sottocutaneo); latte 144 ore (uso intramuscolare, uso sottocutaneo) Equidi (cavallo): carne 29 giorni (uso intramuscolare, uso sottocutaneo) Ovini: carne 29 giorni (uso intramuscolare, uso sottocutaneo); latte 144 ore (uso intramuscolare, uso sottocutaneo) Suino: carne 29 giorni (uso intramuscolare, uso sottocutaneo)	100015015 100015027	QJ01CA04	Sistemico
		ZOOBIOTIC GLOBULIT 150 mgg Premix for medicated feeding stuff for pigs ZOOBIOTIC GLOBULIT 150 mgg premiscela per alimenti medicamentosi per suini	Amoxicillin trihydrate	Premiscela per alimenti medicamentosi	Suino (suinetto)		Somministrazione con il mangime	Bovini: carne 29 giorni (uso intramuscolare, uso sottocutaneo); latte 144 ore (uso intramuscolare, uso sottocutaneo) Equidi (cavallo): carne 29 giorni (uso intramuscolare, uso sottocutaneo) Ovini: carne 29 giorni (uso intramuscolare, uso sottocutaneo); latte 144 ore (uso intramuscolare, uso sottocutaneo) Suino: carne 29 giorni (uso intramuscolare, uso sottocutaneo)	100015015 100015027	QJ01CA04	Sistemico
	ampicillina	ALBIPEN LA	Ampicillin	Sospensione iniettabile	Bovini, Ovino, Suino	Cane, Gatto	Uso intramuscolare; Uso sottocutaneo	Bovini: carne 28 giorni (uso intramuscolare); latte 6 giorni (uso intramuscolare); organi 28 giorni (uso intramuscolare) Ovini: carne 28 giorni (uso intramuscolare); latte 6 giorni (uso intramuscolare); organi 28 giorni (uso intramuscolare) Suino: carne 24 giorni (uso intramuscolare)	100017019 100017021 100017033 100017045	QJ01CA01	Sistemico
		AMPIDOX	Ampicillin trihydrate	Premiscela per alimenti medicamentosi	Bovini (vitello), Suino		Somministrazione con il mangime	Bovini (vitelli): carne 14 giorni (somministrazione con il mangime) Suino: carne 4 giorni (somministrazione con il mangime)	102982028	QJ01CA01	Sistemico
		AMPIFARMA 750 mgg polvere solubile per uso orale per broilers e suini	Ampicillin	Polvere per somministrazione in acqua da bere	Suino, Pollo (pollo da carne)		Somministrazione in acqua da bere/latte; Somministrazione in acqua da bere	Pollo (broiler): carne 4 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino: carne 9 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte)	102932023	QJ01CA01	Sistemico
		Cloxadry 600 mg + 300 mg Sospensione intramammaria per bovine da latte in asciutta	Cloxacillin + Ampicillin	Sospensione intramammaria	Bovini (vacca da latte in asciutta)		Per uso intramammario	Bovini: carne 28 giorni (uso intramammario); latte 5 giorni (uso intramammario)	102593011	QJ51CR50	Intramammario
		CLOXALENE MAX 600 MG + 300 MG POMATA INTRAMAMMARIA PER BOVINE IN ASCIUTTA	Cloxacillin hemibenzathine + Ampicillin trihydrate	Pomata intramammaria	Bovini (vacca in asciutta)		Per uso intramammario	Bovini (bovine/vacche in asciutta): carne 8 giorni (uso intramammario); latte 0 mungiture (uso intramammario); latte 0 ore (uso intramammario)	102832019 102832021 102832033 102832045	QJ51CR50	Intramammario
		CLOXALENE PLUS 953 mgml + 478 mgml sospensione iniettabile per bovini equini suini cani e gatti	Dicloxacillin + Ampicillin	Soluzione iniettabile	Bovini, Cavallo, Suino	Cane, Gatto	Uso intramuscolare	Bovini: carne 4 giorni (uso intramuscolare); latte 48 ore (uso intramuscolare) Equidi (cavallo): carne 14 giorni (uso intramuscolare) Suino: carne 3 giorni (uso intramuscolare)	101718056 101718068 101718082	QJ01CA51	Sistemico
		CLOXALENE PLUS pomata intramammaria per bovine in lattazione	Ampicillin sodium + Dicloxacillin sodium	Pomata intramammaria	Bovini		Per uso intramammario	Bovini (bovine /vacche in lattazione): carne 2 giorni (uso intramammario); latte 48 ore (uso intramammario, uso intramuscolare)	101718043 101718070 101718094 101718106	QJ51CR50	Intramammario
		VETAMPEN polvere e solvente per soluzione iniettabile	Ampicillin + Ampicillin + Ampicillin + Ampicillin	Polvere per soluzione iniettabile	Bovini, Suino, Cavallo	Cane, Gatto	Uso intraperitoneale; Uso intramuscolare; Uso endovenoso	Bovini: carne 14 giorni (uso intramuscolare, uso intraperitoneale, uso endovenoso); latte 12 mungiture (uso intramuscolare, uso intraperitoneale, uso endovenoso) Equidi (cavallo): carne 12 giorni (uso intramuscolare, uso intraperitoneale, uso endovenoso) Suino: carne 12 giorni (uso intramuscolare, uso intraperitoneale, uso endovenoso)	101854014 101854026 101854040 101854053	QJ01CA01	Sistemico
		VETAMPLIUS 750 mgg polvere per uso in acqua da bere per polli da carne e tacchini	Ampicillin	Polvere per soluzione orale	Pollo (pollo da carne), Tacchino		Uso orale	Pollo (broiler): carne 1 giorni (uso orale) Uccelli (tacchino): carne 2 giorni (uso orale)	100031018 100031020 100031032 100031044 100031057	QJ01CA01	Sistemico
		VETAMPLIUS MUCOSOL 10 g50 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile	Bromhexine + Ampicillin + Bromhexine + Ampicillin	Polvere e solvente per soluzione per infusione	Bovini, Suino, Pollo (pollo da carne)	Cavallo Non DPA	Uso endovenoso; Uso intramuscolare	Bovini: carne 3 giorni (uso intramuscolare, uso endovenoso) Pollo (broiler): carne 11 giorni (uso intramuscolare, uso endovenoso) Suino: carne 14 giorni (uso intramuscolare, uso endovenoso)	101786010 101786022 101786034	QJ01CA51	Sistemico
		VETAMPLIUS MUCOSOL 100 g500 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile	Bromhexine + Ampicillin + Bromhexine + Ampicillin	Polvere e solvente per soluzione per infusione	Bovini, Suino, Pollo (pollo da carne)	Cavallo Non DPA	Uso endovenoso; Uso intramuscolare	Bovini: carne 3 giorni (uso intramuscolare, uso endovenoso) Pollo (broiler): carne 11 giorni (uso intramuscolare, uso endovenoso) Suino: carne 14 giorni (uso intramuscolare, uso endovenoso)	101786010 101786022 101786034	QJ01CA51	Sistemico
		VETAMPLIUS MUCOSOL 4g20 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile	Ampicillin + Bromhexine	Polvere e solvente per soluzione per infusione	Bovini, Suino, Pollo (pollo da carne)	Cavallo Non DPA	Uso endovenoso	Bovini: carne 3 giorni (uso intramuscolare, uso endovenoso) Pollo (broiler): carne 11 giorni (uso intramuscolare, uso endovenoso) Suino: carne 14 giorni (uso intramuscolare, uso endovenoso)	101786010 101786022 101786034	QJ01CA51	Sistemico
		VETAMPLIUS polvere e solvente per soluzione iniettabile	Ampicillin + Ampicillin + Ampicillin + Ampicillin	Polvere e solvente per soluzione iniettabile	Bovini, Ovino, Suino, Cavallo	Cane, Gatto	Uso intraperitoneale; Uso intramuscolare; Uso endovenoso	Bovini: carne 3 giorni (uso intramuscolare, uso intraperitoneale, uso endovenoso); latte 5 giorni (uso intramuscolare, uso intraperitoneale, uso endovenoso) Equidi (cavallo): carne 9 giorni (uso intramuscolare, uso intraperitoneale, uso endovenoso) Ovini: carne 9 giorni (uso intramuscolare, uso intraperitoneale, uso endovenoso); latte 5 giorni (uso intramuscolare, uso intraperitoneale, uso endovenoso) Suino: carne 9 giorni (uso intramuscolare, uso intraperitoneale, uso endovenoso)	101702013 101702025 101702037 101702049	QJ01CA01	Sistemico

Categoria D - PRUDENZA

Classe di antibiotici	Molecola	Specialità veterinaria	Sostanze attive	Forma farmaceutica	Specie DPA	Specie non DPA	Vie di somministrazione	Tempi di attesa	Codice AIC	ATCvet	Uso (da ATCvet)
AMINOPENICILLINE SENZA INIBITORI DELLE BETA-LATTAMASI		VETAMPLIUS SUINI 750 mgg polvere per uso in acqua da bere per suini	Ampicillin sodium	Polvere orale	Suino		Uso orale; Somministrazione in acqua da bere	Pollo (broiler): carne 1 giorni (uso orale) Uccelli (tacchino): carne 2 giorni (uso orale)	100031018 100031020 100031032 100031044 100031057	QJ01CA01	Sistemico
	metampicillina	Nessuna specialità veterinaria autorizzata in Italia									
AMINOGLICOSIDI: SOLO SPECTINOMICINA	spectinomicina	Spectin 500 500 mgg premiscela per alimenti medicamentosi per suini	Spectinomycin	Premiscela per alimenti medicamentosi	Suino		Somministrazione con il mangime	Suino: carne 20 giorni (somministrazione con il mangime)	103414013 103414025 103414037	QJ01XX04	Sistemico
		Spectinomicina 50 Chemifarma 500 mgg polvere per uso in acqua da bere e mangime liquido per suini e broiler	Spectinomycin	Polvere per soluzione orale	Suino, Pollo (pollo da carne)		Uso orale	Pollo (broiler): carne 11 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino: carne 20 giorni (somministrazione in acqua da bere)	103413013 103413035 103413047	QJ01XX04	Sistemico
SULFONAMIDI, INIBITORI DELLA DIIDROFOLATO REDUTTASI E COMBINAZIONI	formosulfatiazolo	CURAMETRIL 25 g pasta endouterina per bovine	Formosulfathiazole	Emulsione intrauterina	Bovini (vacca)		Uso intrauterino	Bovini: carne 0 giorni (uso intrauterino); latte 0 ore (uso intrauterino)	104377015	QG02CB03	Intrauterino
		SOCATIL 50 g 100 g Pasta per uso orale per bovini e suini	Formosulfathiazole	Pasta per uso orale	Bovini, Suino		Uso orale	Bovini: carne 17 giorni (uso orale); latte 11 giorni (uso orale) Suino: carne 14 giorni (uso orale)	100132036 100132048 100132051 100132063	QA07AB90	Intestinale
		SOCATIL 50 g100 g pasta per uso topico per CAVALLI non DPA	Formosulfathiazole	Pasta cutanea		Cavallo Non DPA	Uso cutaneo		100132036 100132048 100132051 100132063	QA07AB90	Intestinale
		SOCATIL 75 g15 g Pasta per uso orale nei gatti e per uso topico nei cani	Formosulfathiazole	Pasta cutanea		Cane, Gatto	Uso cutaneo; Uso orale		100132036 100132048 100132051 100132063	QA07AB90	Intestinale
		SOCATIL METRITIS 25 g Pasta endouterina per bovine in siringa preriempita	Formosulfathiazole	Emulsione intrauterina	Bovini		Uso intrauterino	Bovini: carne 0 giorni (uso intrauterino); latte 0 giorni (uso intrauterino)	103937013	QG51AA09	Intrauterino
	ftalilsulfatiazolo	Nessuna specialità veterinaria autorizzata in Italia (presente solo in associazione con antibiotici di categoria superiore: vedi Categoria C)									
	sulfacetamide	Nessuna specialità veterinaria autorizzata in Italia									

Categoria D - PRUDENZA

Classe di antibiotici	Molecola	Specialità veterinaria	Sostanze attive	Forma farmaceutica	Specie DPA	Specie non DPA	Vie di somministrazione	Tempi di attesa	Codice AIC	ATCvet	Uso (da ATCvet)
SULFONAMIDI, INIBITORI DELLA DIIDROFOLATO REDUTTASI E COMBINAZIONI	sulfaclorpiridazina	Nessuna specialità veterinaria autorizzata in Italia									
	sulfaclozina	Nessuna specialità veterinaria autorizzata in Italia									
	sulfadiazina	CENSULFATRIM 200 mgml + 40 mgml solution for injection Censulfatrim 200 mgml + 40 mgml Soluzione iniettabile	Trimethoprim + Sulfadiazine	Soluzione iniettabile	Bovini, Suino, Cavallo	Cane, Gatto	Uso intramuscolare; Uso endovenoso; Uso sottocutaneo	Bovini: carne 12 giorni (uso intramuscolare, uso endovenoso); latte 48 ore (uso intramuscolare, uso endovenoso) Equidi (cavallo): carne 28 giorni (uso endovenoso) Suino: carne 20 giorni (uso intramuscolare, uso endovenoso)	105737011 105737023 105737035 105737047	QJ01EW10	Sistemico
		Cubarmix Equi 400 mgg and 80 mgg oral powder for horses	Sulfadiazine + Trimethoprim	Polvere orale	Cavallo		Uso orale	Equidi (cavallo): carne 6 mesi (uso orale)	105919017 105919029 105919031 105919043 105919056	QJ01EW10	Sistemico
		Diatrim 200 mgml + 40 mgml solution for injection for cattle pigs dogs and cats Diatrim 200 mgml + 40 mgml soluzione iniettabile per bovini suini cani e gatti	Trimethoprim + Sulfadiazine	Soluzione iniettabile	Bovini, Suino	Cane, Gatto	Uso intramuscolare; Uso sottocutaneo	Bovini: carne 12 giorni (uso endovenoso, uso intramuscolare); latte 48 ore (uso endovenoso, uso intramuscolare) Suino: carne 20 giorni (uso endovenoso, uso intramuscolare)	105087011 105087023	QJ01EW10	Sistemico
		DOXATRIM 15 PM 25 mgg + 125 mgg premiscela per alimenti medicamentosi per suini polli tacchini e pesci	Sulfadiazine + Trimethoprim	Premiscela per alimenti medicamentosi	Suino, Pollo (pollo da carne), Tacchino, Pesce		Uso orale	Pesci: carne 500 gradi giorno (somministrazione con il mangime) Pollo (broiler): carne 4 giorni (somministrazione con il mangime) Suino: carne 10 giorni (somministrazione con il mangime) Uccelli (tacchino): carne 6 giorni (somministrazione con il mangime)	102868027	QJ01EW10	Sistemico
		EQUIBACTIN 250 MGG + 50 MGG POLVERE ORALE PER CAVALLI Equibactin vet 250 mgg + 50 mgg oral powder	Trimethoprim + Sulfadiazine	Polvere orale	Cavallo		Uso orale	Equidi (cavallo): carne 10 giorni (basso dosaggio) (uso orale); carne 20 giorni (alto dosaggio) (uso orale)	105162010 105162022 105162034 105162046 105162059	QJ01EW10	Sistemico
		EQUIBACTIN VET Equibactin vet 333 mgg + 67 mgg oral paste for horses	Trimethoprim + Sulfadiazine	Pasta per uso orale	Cavallo		Uso orale	Equidi (cavallo): carne 14 giorni (uso orale)	103891014 103891026	QJ01EW10	Sistemico
		HYDROTRIM 500 MGG + 100 MGG POWDER FOR USE IN DRINKING WATERMILK FOR CATTLE SHEEP PIGS AND CHICKENS Hydrotrim 500 mgg + 100 mgg polvere per uso in acqua da berelatte per bovini ovini suini e polli	Sulfadiazine sodium + Trimethoprim	Polvere per somministrazione in acqua da bere/latte	Bovini (preruminante), Ovino (agnello), Polli, Suino		Somministrazione in acqua da bere/latte; Somministrazione in acqua da bere	Bovini (vitelli): carne 12 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Ovini (agnelli): carne 12 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Pollo (broiler): carne 12 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino: carne 12 giorni (somministrazione in acqua da bere)	105709012 105709024	QJ01EW10	Sistemico
		NEOPRIDIMET ORALE 600 mgg +120 mgg premiscela per alimenti medicamentosi per suini e salmonidi	Sulfadiazine + Trimethoprim	Premiscela per alimenti medicamentosi	Suino, Salmonidi		Somministrazione con il mangime	Pesci (salmonidi): carne 250 gradi giorno (somministrazione con il mangime) Suino: carne 3 giorni (somministrazione con il mangime)	103546014 103546026 103546038	QJ01EW10	Sistemico
		NEOPRIDIMET soluzione orale 200 mg + 40 mgml per uso in acqua da bere per polli da carne e conigli	Trimethoprim + Sulfadiazine	Soluzione per somministrazione in acqua da bere	Coniglio, Pollo (pollo da carne)		Uso orale	Conigli: carne 5 giorni (somministrazione in acqua da bere) Pollo: carne 5 giorni (somministrazione in acqua da bere)	102364015 102364027 102364039 102364041 102364054	QJ01EW10	Sistemico
		Norodine 24 Soluzione iniettabile per bovini equini suini cani e gatti	Trimethoprim + Sulfadiazine	Soluzione iniettabile	Bovini, Suino, Cavallo	Cane, Gatto	Uso intramuscolare; Uso endovenoso; Uso sottocutaneo	Bovini: carne 12 giorni (uso intramuscolare, uso endovenoso); latte 48 ore (uso intramuscolare, uso endovenoso) Equidi (cavallo): carne 28 giorni (uso intramuscolare, uso endovenoso) Suino: carne 15 giorni (uso intramuscolare, uso endovenoso)	101080012 101080024	QJ01EW10	Sistemico
		SULFAPREX 250 mgg + 50 mgg premiscela per mangimi medicati per suini SULFAPREX 25050 mgg Premix for medicated feeding stuff for pigs	Sulfadiazine + Trimethoprim	Premiscela per alimenti medicamentosi	Suino		Somministrazione con il mangime	Suino: carne 5 giorni (somministrazione con il mangime)	104472016	QJ01EW10	Sistemico
		SULFATRIMDOX 200 GL + 40 GL	Sulfadiazine + Trimethoprim	Soluzione orale	Pollo (pollo da carne), Coniglio		Somministrazione in acqua da bere	Conigli: carne 5 giorni (somministrazione in acqua da bere) Pollo (broiler): carne 5 giorni (somministrazione in acqua da bere)	105181010 105181022 105181034	QJ01EW10	Sistemico

Categoria D - PRUDENZA

Classe di antibiotici	Molecola	Specialità veterinaria	Sostanze attive	Forma farmaceutica	Specie DPA	Specie non DPA	Vie di somministrazione	Tempi di attesa	Codice AIC	ATCvet	Uso (da ATCvet)
SULFONAMIDI, INIBITORI DELLA DIIDROFOLATO REDUTTASI E COMBINAZIONI	sulfadiazina	TRIMESUL CM 40 mgml + 200 mgml soluzione iniettabile per bovini suini equini cani gatti	Sulfadiazine + Trimethoprim	Soluzione iniettabile	Bovini, Suino, Cavallo	Cane, Gatto	Uso intramuscolare; Uso endovenoso; Uso sottocutaneo	Bovini: carne 14 giorni (uso intramuscolare, uso endovenoso); latte 96 ore (uso intramuscolare, uso endovenoso) Equidi (cavallo): carne 14 giorni (uso endovenoso) Suino: carne 14 giorni (uso intramuscolare, uso endovenoso)	103255016 103255028 103255030	QJ01EW10	Sistemico
		TRIMETHOSULFA MLP premiscela per mangimi medicati per suini	Trimethoprim + Sulfadiazine	Premiscela per alimenti medicamentosi	Suino		Somministrazione con il mangime	Suino: carne 7 giorni (somministrazione con il mangime)	103553018	QJ01EW10	Sistemico
		TRIMETHOSULFA ORALE soluzione orale per vitelli suini conigli polli da carne e tacchini	Trimethoprim + Sulfadiazine	Soluzione orale	Bovini (vitello), Coniglio, Suino, Tacchino, Pollo (pollo da carne)		Uso orale; Somministrazione in acqua da bere/latte; Somministrazione in acqua da bere	Bovini (vitelli): carne 9 giorni (somministrazione in acqua da bere, uso orale, somministrazione in acqua da bere/latte) Conigli: carne 15 giorni (somministrazione in acqua da bere, uso orale) Pollo (broiler): carne 3 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino: carne 3 giorni (uso orale, somministrazione in acqua da bere, somministrazione in acqua da bere/latte) Uccelli (tacchino): carne 7 giorni (somministrazione in acqua da bere)	100131010 100131022 100131034 100131046	QJ01EW10	Sistemico
		Triquest 333 mgml + 67 mgml sospensione orale per cavalli Triquest Vet 333 mgml + 67 mgml oral suspension for horses	Sulfadiazine + Trimethoprim	Sospensione orale	Cavallo		Uso orale	Equidi (cavallo): carne 10 giorni (uso orale)	105746010 105746022	QJ01EW10	Sistemico
		TRISULFAN 30 soluzione iniettabile per bovini equini suini ovicaprini e cani	Sulfadiazine + Sulfamerazine + Sulfadimidine	Soluzione iniettabile	Caprino, Ovino, Suino, Cavallo, Bovini	Cane	Uso intramuscolare; Uso endovenoso	Bovini: carne 15 giorni (uso endovenoso); latte 60 ore (uso endovenoso) Caprini: carne 35 giorni (uso intramuscolare); latte 7 giorni (uso intramuscolare) Equidi (cavallo): carne 35 giorni (uso intramuscolare) Ovini: carne 35 giorni (uso intramuscolare); latte 7 giorni (uso intramuscolare) Suino: carne 35 giorni (uso intramuscolare)	101520029	QJ01EQ30	Sistemico
	sulfadimetoxina	CHEMITRIM Soluzione per uso orale per suini	Sulfadimethoxine + Trimethoprim	Soluzione orale	Suino		Uso orale	Suino: carne 7 giorni (somministrazione in acqua da bere)	102899010 102899022 102899034	QJ01EW09	Sistemico
		COCCIDIOL L soluzione orale per uccelli da gabbia e da voliera e colombi viaggiatori da somministrare diluita in acqua da bere	Sulfaquinoxaline + Sulfadimethoxine + Diaveridine	Soluzione orale		Uccelli da gabbia e da voliera, Colombo	Uso orale; Somministrazione in acqua da bere/latte		103711014 103711026	QP51AG53	Antiprotozoario
		DIAVERIDINA 05 SULFADIMETOSSINA 05 LIQUIDO FORMEVET Soluzione orale per uccelli da gabbia e voliera canarini psittacidi piccoli uccelli ornamentali silvani ecc colombi viaggiatori	Sulfadimethoxine + Diaveridine	Soluzione orale		Uccelli da gabbia e da voliera	Somministrazione in acqua da bere		103473017	QJ01EQ59	Sistemico
		Dimetossin 200 200 mgg premiscela per alimenti medicamentosi per polli da carne conigli e suini fino a 6 mesi	Sulfadimethoxine	Premiscela per alimenti medicamentosi	Pollo (pollo da carne), Coniglio, Suino (suinetto)		Somministrazione con il mangime	Conigli: carne 21 giorni (somministrazione con il mangime) Pollo (broiler): carne 15 giorni (somministrazione con il mangime) Suino: carne 28 giorni (somministrazione con il mangime)	103426019 103426021	QJ01EQ09	Sistemico
		DOXATRIM soluzione per uso in acqua da bere per polli da carne e tacchini	Sulfadimethoxine + Sulfadimidine + Trimethoprim	Soluzione per somministrazione in acqua da bere	Pollo (pollo da carne), Tacchino		Uso orale	Pollo: carne 3 giorni (somministrazione in acqua da bere) Uccelli (tacchino): carne 7 giorni (somministrazione in acqua da bere)	101145023 101145050 101145062 101145074	QJ01EW30	Sistemico
		FILOSULFA SOL	Sulfadimethoxine	Polvere per somministrazione in acqua da bere	Suino (suinetto), Bovino (vitello lattante)		Somministrazione in acqua da bere/latte	Bovini (vitelli da latte): carne 28 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Suino: carne 28 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte)	102657020	QJ01EQ09	Sistemico
		POLISULFAN 100 100 mgg + 40 mgg premiscela per alimenti medicamentosi per suini e conigli	Sulfadimethoxine + Chlortetracycline	Premiscela per alimenti medicamentosi	Coniglio, Suino		Somministrazione con il mangime	Conigli: carne 14 giorni (somministrazione con il mangime) Suino: carne 7 giorni (somministrazione con il mangime)	102466012 102466024	QJ01AA53	Sistemico
		Prazil N Orale 200 mgml + 40 mgml soluzione orale per bovini suini broilers tacchini e conigli	Sulfadimethoxine + Trimethoprim	Soluzione orale	Bovini (vitello), Suino, Suini (da ingrasso), Tacchino, Pollo (pollo da carne), Coniglio		Somministrazione in acqua da bere/latte; Somministrazione in acqua da bere	Bovini (vitelli): carne 20 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Conigli: carne 6 giorni (somministrazione in acqua da bere) Pollo (broiler): carne 4 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino (suini da ingrasso): carne 8 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Suino: carne 8 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Uccelli (tacchino): carne 9 giorni (somministrazione in acqua da bere)	101305062 101305086 101305098 101305100	QJ01EW09	Sistemico
		PRIDIMET 100 mgml + 20 mgml soluzione orale per polli tacchini suinetti vitelli	Sulfadimethoxine + Trimethoprim	Soluzione orale	Polli, Tacchino, Suino (suinetto), Bovini (vitello)		Uso orale	Bovini: carne 20 giorni (uso intraperitoneale, uso intramuscolare, uso endovenoso, uso sottocutaneo); latte 84 giorni (uso intramuscolare); latte 84 ore (uso endovenoso, uso intramuscolare) Bovini (vitelli): carne 20 giorni (somministrazione in acqua da bere, uso intramuscolare, somministrazione in acqua da bere/latte) Pollo (broiler): carne 11 giorni (somministrazione in acqua da bere) Pollo: carne 11 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Suino: carne 12 giorni (somministrazione in acqua da bere, somministrazione in acqua da bere/latte); carne 20 giorni (uso intramuscolare) Suino: carne 20 giorni (uso intramuscolare, uso intraperitoneale, uso endovenoso, uso sottocutaneo) Uccelli (tacchino): carne 11 giorni (somministrazione in acqua da bere, somministrazione in acqua da bere/latte)	101772010 101772022 101772034 101772059 101772061 101772073 101772085	QJ01EW09	Sistemico

Categoria D - PRUDENZA

Classe di antibiotici	Molecola	Specialità veterinaria	Sostanze attive	Forma farmaceutica	Specie DPA	Specie non DPA	Vie di somministrazione	Tempi di attesa	Codice AIC	ATCvet	Uso (da ATCvet)
SULFONAMIDI, INIBITORI DELLA DIIDROFOLATO REDUTTASI E COMBINAZIONI	sulfadimetoxina	PRIDIMET 200 mgml + 40 mgml soluzione iniettabile per bovini e suini	Sulfadimethoxine + Trimethoprim + Sulfadimethoxine + Trimethoprim + Sulfadimethoxine + Trimethoprim	Soluzione iniettabile	Bovini, Suino, Suino (suinetto), Bovini (vitello), Bovini (vacca da latte)		Uso intraperitoneale; Uso endovenoso; Uso intramuscolare	Bovini: carne 20 giorni (uso intraperitoneale, uso intramuscolare, uso endovenoso, uso sottocutaneo); latte 84 giorni (uso intramuscolare); latte 84 ore (uso endovenoso, uso intramuscolare) Bovini (vitelli): carne 20 giorni (somministrazione in acqua da bere, uso intramuscolare, somministrazione in acqua da bere/latte) Pollo (broiler): carne 11 giorni (somministrazione in acqua da bere) Pollo: carne 11 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Suino: carne 12 giorni (somministrazione in acqua da bere, somministrazione in acqua da bere/latte); carne 20 giorni (uso intramuscolare) Suino: carne 20 giorni (uso intramuscolare, uso intraperitoneale, uso endovenoso, uso sottocutaneo) Uccelli (tacchino): carne 11 giorni (somministrazione in acqua da bere, somministrazione in acqua da bere/latte)	101772010 101772022 101772034 101772059 101772061 101772073 101772085	QJ01EW09	Sistemico
		PRIDIMET 24 200 mgml + 40 mgml soluzione per uso in acqua da berelatte per polli tacchini suinetti vitelli	Sulfadimethoxine + Trimethoprim	Soluzione per somministrazione in acqua da bere/latte	Polli, Tacchino, Bovini (vitello), Suino (suinetto)		Uso orale	Bovini: carne 20 giorni (uso intraperitoneale, uso intramuscolare, uso endovenoso, uso sottocutaneo); latte 84 giorni (uso intramuscolare); latte 84 ore (uso endovenoso, uso intramuscolare) Bovini (vitelli): carne 20 giorni (somministrazione in acqua da bere, uso intramuscolare, somministrazione in acqua da bere/latte) Pollo (broiler): carne 11 giorni (somministrazione in acqua da bere) Pollo: carne 11 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Suino: carne 12 giorni (somministrazione in acqua da bere, somministrazione in acqua da bere/latte); carne 20 giorni (uso intramuscolare) Suino: carne 20 giorni (uso intramuscolare, uso intraperitoneale, uso endovenoso, uso sottocutaneo) Uccelli (tacchino): carne 11 giorni (somministrazione in acqua da bere, somministrazione in acqua da bere/latte)	101772010 101772022 101772034 101772059 101772061 101772073 101772085	QJ01EW09	Sistemico
		SADIMET	Sulfadimethoxine	Soluzione iniettabile	Bovini, Ovino, Suino, Cavallo		Uso orale; Uso intramuscolare; Uso endovenoso; Uso sottocutaneo	Bovini: carne 14 giorni (uso intramuscolare, uso sottocutaneo); carne 35 giorni (uso orale); carne 6 giorni (uso endovenoso); latte 264 ore (uso intramuscolare, uso sottocutaneo); latte 60 ore (uso endovenoso); latte 672 ore (uso orale) Equidi (cavallo): carne 14 giorni (uso intramuscolare, uso sottocutaneo); carne 35 giorni (uso orale); carne 9 giorni (uso endovenoso) Ovini: carne 10 giorni (uso endovenoso); carne 14 giorni (uso sottocutaneo, uso intramuscolare); carne 35 giorni (uso orale); latte 192 ore (uso endovenoso); latte 264 ore (uso sottocutaneo, uso intramuscolare); latte 672 ore (uso orale) Suino: carne 10 giorni (uso endovenoso); carne 14 giorni (uso intramuscolare, uso sottocutaneo); carne 35 giorni (uso orale)	101777011 101777023	QJ01EQ09	Sistemico
		SULDIMET 200	Sulfadimethoxine	Premiscela per alimenti medicamentosi	Suino		Somministrazione con il mangime	Suino: carne 19 giorni (somministrazione con il mangime)	103356010	QJ01EQ09	Sistemico
		Sulfachinossalina 2 Sulfadimetossina 1 Diaveridina 1 LIQUIDO FORMEVET Soluzione orale per uccelli da gabbia e da voliera	Sulfaquinoxaline + Sulfadimethoxine + Diaveridine	Soluzione orale		Uccelli da gabbia e da voliera	Somministrazione in acqua da bere		103443014 103443026	QP51AG53	Antiprotozoario
		SULFADIMETOSSINA 0425+DIAVERIDINA 0425 CANDIOLI	Sulfadimethoxine + Diaveridine	Soluzione orale		Uccelli da gabbia e da voliera	Somministrazione in acqua da bere		103459018	QJ01EQ59	Sistemico
		Sulfadimetossina 20 Chemifarma 200 mgg polvere solubile orale per uso in acqua da bere latte o alimento liquido	Sulfadimethoxine	Polvere per somministrazione in acqua da bere	Bovino (vitello lattante), Pollo (pollo da carne), Coniglio, Suino (suinetto)		Somministrazione in acqua da bere/latte; Somministrazione in acqua da bere	Bovini (vitelli da latte): carne 28 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Conigli: carne 21 giorni (somministrazione in acqua da bere) Pollo (broiler): carne 15 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino: carne 28 giorni (somministrazione in acqua da bere)	103349015 103349027	QJ01EQ09	Sistemico
		SULFADIMETOSSINA 20 DOXAL	Sulfadimethoxine	Polvere orale	Bovini (vitello), Suino, Pollo (pollo da carne)		Somministrazione in acqua da bere/latte; Somministrazione in acqua da bere	Bovini (vitelli): carne 28 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Pollo (broiler): carne 15 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino: carne 28 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte)	103357012	QJ01EQ09	Sistemico
		SULFADIMETOSSINA 200 PREMIX	Sulfadimethoxine	Premiscela per alimenti medicamentosi	Pollo (pollo da carne), Coniglio, Suino		Somministrazione con il mangime	Conigli: carne 21 giorni (somministrazione con il mangime) Pollo (broiler): carne 15 giorni (somministrazione con il mangime) Suino: carne 28 giorni (somministrazione con il mangime)	102659024 102659036	QJ01EQ09	Sistemico
		Sulfadimetossina 25 Sulfachinossalina 25 Diaveridina 25 liquido Chemifarma soluzione per uso orale per uccelli da gabbia e da voliera	Diaveridine + Sulfaquinoxaline + Sulfadimethoxine	Soluzione orale		Uccelli da gabbia e da voliera	Uso orale		101986014 101986026 101986038	QP51AG53	Antiprotozoario
		SULFAPRIM soluzione iniettabile per bovini equini suini cani e gatti	Trimethoprim + Sulfadimethoxine sodium	Soluzione iniettabile	Bovini, Suino, Cavallo	Cane, Gatto	Uso intramuscolare; Uso endovenoso	Bovini: carne 20 giorni (uso intramuscolare, uso endovenoso); latte 96 ore (uso intramuscolare, uso endovenoso) Equidi (cavallo): carne 30 giorni (uso intramuscolare, uso endovenoso) Suino: carne 16 giorni (uso intramuscolare, uso endovenoso)	101779015 101779027 101779039	QJ01EW09	Sistemico
		TRIMETOPRIM 40 SULFADIMETOSSINA 200 Soluzione orale per uso in acqua da bere per polli da carne tacchini e conigli	Sulfadimethoxine + Trimethoprim	Soluzione per somministrazione in acqua da bere	Pollo (pollo da carne), Tacchino, Coniglio		Uso orale	Conigli: carne 11 giorni (somministrazione in acqua da bere) Pollo (broiler): carne 8 giorni (somministrazione in acqua da bere) Uccelli (tacchino): carne 7 giorni (somministrazione in acqua da bere)	102382013 102382037 102382049 102382064	QJ01EW09	Sistemico
		ANPROMETAZINA 200	Sulfadimidine	Premiscela per alimenti medicamentosi	Suino (suinetto)		Somministrazione con il mangime	Suino: carne 28 giorni (somministrazione con il mangime)	102849015 102849027	QJ01EQ03	Sistemico
		DOXATRIM soluzione per uso in acqua da bere per polli da carne e tacchini	Sulfadimethoxine + Sulfadimidine + Trimethoprim	Soluzione per somministrazione in acqua da bere	Pollo (pollo da carne), Tacchino		Uso orale	Pollo: carne 3 giorni (somministrazione in acqua da bere) Uccelli (tacchino): carne 7 giorni (somministrazione in acqua da bere)	101145023 101145050 101145062 101145074	QJ01EW30	Sistemico

Categoria D - PRUDENZA

Classe di antibiotici	Molecola	Specialità veterinaria	Sostanze attive	Forma farmaceutica	Specie DPA	Specie non DPA	Vie di somministrazione	Tempi di attesa	Codice AIC	ATCvet	Uso (da ATCvet)
SULFONAMIDI, INIBITORI DELLA DIIDROFOLATO REDUTTASI E COMBINAZIONI	sulfadimidina	METAMERAZINA	Sulfamerazine sodium + Sulfathiazole sodium + Sulfadimidine sodium	Soluzione iniettabile	Bovini, Polli, Ovino, Coniglio, Suino, Cavallo	Cane, Gatto	Uso intraperitoneale; Uso intramuscolare; Uso endovenoso	Bovini: carne 24 giorni (uso endovenoso, uso intraperitoneale, uso intramuscolare); latte 168 ore (uso intraperitoneale, uso intramuscolare, uso endovenoso); latte 72 ore (uso endovenoso) Conigli: carne 18 giorni (uso endovenoso, uso intraperitoneale, uso intramuscolare) Equidi (cavallo): carne 24 giorni (uso endovenoso, uso intraperitoneale, uso intramuscolare) Ovini: carne 24 giorni (uso endovenoso, uso intraperitoneale, uso intramuscolare); latte 168 ore (uso intraperitoneale, uso intramuscolare, uso endovenoso); latte 72 ore (uso endovenoso) Pollo: carne 18 giorni (uso endovenoso, uso intraperitoneale, uso intramuscolare) Suino: carne 24 giorni (uso endovenoso, uso intraperitoneale, uso intramuscolare)	101721025 101721037 101721049 101721090	QJ01EQ30	Sistemico
		Sulfametazina 20 Chemifarma SpA	Sulfadimidine	Polvere per somministrazione in acqua da bere	Suino		Uso orale	Suino: carne 28 giorni (somministrazione in acqua da bere)	102846019 102846021 102846033	QJ01EQ03	Sistemico
		TINKANIUM	Trimethoprim + Sulfadimidine	Soluzione iniettabile	Bovini, Suino		Uso intramuscolare; Uso endovenoso	Bovini: carne 7 giorni (uso intramuscolare, uso endovenoso); latte 48 ore (uso endovenoso, uso intramuscolare) Suino: carne 7 giorni (uso intramuscolare, uso endovenoso)	101453088 101453090	QJ01EW03	Sistemico
	sulfadimidina	TRISULFAN 30 soluzione iniettabile per bovini equini suini ovicaprini e cani	Sulfadiazine + Sulfamerazine + Sulfadimidine	Soluzione iniettabile	Caprino, Ovino, Suino, Cavallo, Bovini	Cane	Uso intramuscolare; Uso endovenoso	Bovini: carne 15 giorni (uso endovenoso); latte 60 ore (uso endovenoso) Caprini: carne 35 giorni (uso intramuscolare); latte 7 giorni (uso intramuscolare) Equidi (cavallo): carne 35 giorni (uso intramuscolare) Ovini: carne 35 giorni (uso intramuscolare); latte 7 giorni (uso intramuscolare) Suino: carne 35 giorni (uso intramuscolare)	101520029	QJ01EQ30	Sistemico
	sulfadoxina	Nessuna specialità veterinaria autorizzata in Italia									
	sulfafurazolo	Nessuna specialità veterinaria autorizzata in Italia									
	sulfaguanidina	IZOASPERSORIO	Sulfaguanidine + Sulfanilamide + Chlortetracycline hydrochloride + Benzylpenicillin sodium	Polvere cutanea	Caprino, Bovini, Ovino, Suino	Cane, Cavallo Non DPA, Gatto	Uso cutaneo	Bovini (bovini da carne): carne 0 giorni (uso cutaneo) Bovini (bovini da latte): latte 0 giorni (uso cutaneo) Caprini: carne 0 giorni (uso cutaneo) Caprini (capre per la produzione di latte): latte 0 giorni (uso cutaneo) Ovini (ovini/pecore per prod carne): carne 0 giorni (uso cutaneo) Ovini (ovini/pecore per prod latte): latte 0 giorni (uso cutaneo) Suino (suini da ingrasso): carne 0 giorni (uso cutaneo)	102017011	QD06C	Dermatologico
	sulfalene	Nessuna specialità veterinaria autorizzata in Italia									
	sulfamerazina	METAMERAZINA	Sulfamerazine sodium + Sulfathiazole sodium + Sulfadimidine sodium	Soluzione iniettabile	Bovini, Polli, Ovino, Coniglio, Suino, Cavallo	Cane, Gatto	Uso intraperitoneale; Uso intramuscolare; Uso endovenoso	Bovini: carne 24 giorni (uso endovenoso, uso intraperitoneale, uso intramuscolare); latte 168 ore (uso intraperitoneale, uso intramuscolare, uso endovenoso); latte 72 ore (uso endovenoso) Conigli: carne 18 giorni (uso endovenoso, uso intraperitoneale, uso intramuscolare) Equidi (cavallo): carne 24 giorni (uso endovenoso, uso intraperitoneale, uso intramuscolare) Ovini: carne 24 giorni (uso endovenoso, uso intraperitoneale, uso intramuscolare); latte 168 ore (uso intraperitoneale, uso intramuscolare, uso endovenoso); latte 72 ore (uso endovenoso) Pollo: carne 18 giorni (uso endovenoso, uso intraperitoneale, uso intramuscolare) Suino: carne 24 giorni (uso endovenoso, uso intraperitoneale, uso intramuscolare)	101721025 101721037 101721049 101721090	QJ01EQ30	Sistemico
		TRISULFAN 30 soluzione iniettabile per bovini equini suini ovicaprini e cani	Sulfadiazine + Sulfamerazine + Sulfadimidine	Soluzione iniettabile	Caprino, Ovino, Suino, Cavallo, Bovini	Cane	Uso intramuscolare; Uso endovenoso	Bovini: carne 15 giorni (uso endovenoso); latte 60 ore (uso endovenoso) Caprini: carne 35 giorni (uso intramuscolare); latte 7 giorni (uso intramuscolare) Equidi (cavallo): carne 35 giorni (uso intramuscolare) Ovini: carne 35 giorni (uso intramuscolare); latte 7 giorni (uso intramuscolare) Suino: carne 35 giorni (uso intramuscolare)	101520029	QJ01EQ30	Sistemico

Categoria D - PRUDENZA

Classe di antibiotici	Molecola	Specialità veterinaria	Sostanze attive	Forma farmaceutica	Specie DPA	Specie non DPA	Vie di somministrazione	Tempi di attesa	Codice AIC	ATCvet	Uso (da ATCvet)
SULFAMIDICI, DIAMINOPIRIMIDINE E LORO COMBINAZIONI	sulfametizolo	Nessuna specialità veterinaria autorizzata in Italia									
	sulfametoxazolo	METAXOL Metaxol 20100 mgml Oral solution for pigs and chickens	Trimethoprim + Sulfamethoxazole	Soluzione per somministrazione in acqua da bere	Polli, Suino		Somministrazione in acqua da bere	Pollo (broiler): carne 5 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Suino (suini da ingrasso): carne 8 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte)	104896016 104896028	QJ01EW11	Sistemico
	sulfametoxazolo	METHOXASOL Methoxasol 20100 mgml solution for use in drinking water for pigs and broilers	Sulfamethoxazole + Trimethoprim	Soluzione per somministrazione in acqua da bere	Suino, Polli		Somministrazione in acqua da bere	Pollo (broiler): carne 6 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Suino: carne 5 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte)	104420017 104420029	QJ01EW11	Sistemico
	sulfametoxazolo	NOXAPRIM 333 g100 g + 67 g100 g Pasta ad uso orale per Equidi non destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano NDPA	Sulfamethoxazole + Trimethoprim	Pasta per uso orale		Cavallo Non DPA	Uso orale		100151012 100151024	QJ01EW11	Sistemico
	sulfametoxazolo	TSsol 20100 TSsol 20100 mgml soluzione per uso in acqua da bere per suini e polli	Trimethoprim + Sulfamethoxazole	Soluzione per somministrazione in acqua da bere	Suini (da ingrasso), Pollo (pollo da carne)		Somministrazione in acqua da bere	Pollo (broiler): carne 5 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino: carne 8 giorni (somministrazione in acqua da bere)	105051015 105051027	QJ01EW11	Sistemico
	sulfametoxipiridazina	Nessuna specialità veterinaria autorizzata in Italia									
	sulfamonometoxina	DAIMETON 40 soluzione iniettabile al 40 per bovini equini suini polli da carne tacchini cani e gatti	Sulfamonomethoxine sodium	Soluzione iniettabile	Tacchino, Bovini, Pollo (pollo da carne), Suino, Cavallo	Cane, Gatto	Uso intramuscolare; Uso endovenoso	Bovini: carne 11 giorni (uso intramuscolare, uso endovenoso); latte 72 ore (uso intramuscolare, uso endovenoso) Equidi (cavallo): carne 35 giorni (uso endovenoso) Pollo (broiler): carne 28 giorni (uso intramuscolare, uso endovenoso) Suino: carne 16 giorni (uso intramuscolare, uso endovenoso) Uccelli (tacchino): carne 28 giorni (uso intramuscolare, uso endovenoso)	102007046 102007061 102007073	QJ01EQ18	Sistemico
	sulfamonometoxina	DAIPRIM 200 mgml + 4 mgml soluzione per uso in acqua da bere per vitelli suinetti e polli	Sulfamonomethoxine sodium + Trimethoprim	Soluzione orale	Bovini (vitello), Suino (suinetto), Polli		Uso orale	Bovini: carne 13 giorni (uso intramuscolare); latte 120 ore (uso intramuscolare) Bovini (vitelli): carne 11 giorni (somministrazione in acqua da bere) Pollo: carne 7 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino: carne 3 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino: carne 20 giorni (uso intramuscolare)	102009014 102009026 102009038 102009040	QJ01EW17	Sistemico
	sulfamonometoxina	DAIPRIM 200 mgml + 40 mgml soluzione iniettabile per bovini e suini	Trimethoprim + Sulfamonomethoxine sodium	Soluzione iniettabile	Bovini, Suino		Uso intramuscolare	Bovini: carne 13 giorni (uso intramuscolare); latte 120 ore (uso intramuscolare) Bovini (vitelli): carne 11 giorni (somministrazione in acqua da bere) Pollo: carne 7 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino: carne 3 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino: carne 20 giorni (uso intramuscolare)	102009014 102009026 102009038 102009040	QJ01EW17	Sistemico
	sulfamonometoxina	ENDOSPRAY schiuma endouterina per bovine	Sulfamonomethoxine sodium + Oxytetracycline dihydrate	Schiuma intrauterina	Bovini		Uso intrauterino	Bovini: carne 20 giorni (uso intrauterino); latte 0 giorni (uso intrauterino)	101950018	QG01AA99	Ginecologico

Categoria D - PRUDENZA

Classe di antibiotici	Molecola	Specialità veterinaria	Sostanze attive	Forma farmaceutica	Specie DPA	Specie non DPA	Vie di somministrazione	Tempi di attesa	Codice AIC	ATCvet	Uso (da ATCvet)
SULFONAMIDI, INIBITORI DELL	sulfanilamide	IZOASPERSORIO	Sulfaguanidine + Sulfanilamide + Chlortetracycline hydrochloride + Benzylpenicillin sodium	Polvere cutanea	Caprino, Bovini, Ovino, Suino	Cane, Cavallo Non DPA, Gatto	Uso cutaneo	Bovini (bovini da carne): carne 0 giorni (uso cutaneo) Bovini (bovini da latte): latte 0 giorni (uso cutaneo) Caprini: carne 0 giorni (uso cutaneo) Caprini (capre per la produzione di latte): latte 0 giorni (uso cutaneo) Ovini (ovini/pecore per prod carne): carne 0 giorni (uso cutaneo) Ovini (ovini/pecore per prod latte): latte 0 giorni (uso cutaneo) Suino (suini da ingrasso): carne 0 giorni (uso cutaneo)	102017011	QD06C	Dermatologico
	sulfapiridina	IZOPIRIDINA	Sulfapyridine sodium	Soluzione iniettabile	Bovini		Uso endovenoso	Bovini: carne 9 giorni (uso endovenoso); latte 144 ore (uso endovenoso)	102037013	QJ01EQ04	Sistemico
	sulfachinossalina	CANDIOANTIBIOTICO	Menadione + Thiamine hydrochloride + TETRACYCLINE HYDROCHLORIDE PH. EUR. + TETRACYCLINE HYDROCHLORIDE PH. EUR. + Sulfaquinoxaline sodium	Polvere orale		Uccelli da gabbia e da voliera	Somministrazione con il mangime		102977016 102977028 102977030	QJ01RA	Sistemico
		COCCIDIOL L soluzione orale per uccelli da gabbia e da voliera e colombi viaggiatori da somministrare diluita in acqua da bere	Sulfaquinoxaline + Sulfadimethoxine + Diaveridine	Soluzione orale		Uccelli da gabbia e da voliera, Colombo	Uso orale; Somministrazione in acqua da bere/latte		103711014 103711026	QP51AG53	Antiprotozoario
		IZOCHINOSSAL	Sulfaquinoxaline sodium	Soluzione orale	Coniglio, Pollo (pollo da carne)		Somministrazione in acqua da bere/latte; Somministrazione in acqua da bere	Conigli: carne 9 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Pollo (broiler): carne 24 giorni (somministrazione in acqua da bere)	102021019 102021021 102021033	QP51AG03	Antiprotozoario
		Sulfachinossalina 2 Sulfadimetossina 1 Diaveridina 1 LIQUIDO FORMEVET Soluzione orale per uccelli da gabbia e da voliera	Sulfaquinoxaline + Sulfadimethoxine + Diaveridine	Soluzione orale		Uccelli da gabbia e da voliera	Somministrazione in acqua da bere		103443014 103443026	QP51AG53	Antiprotozoario
		Sulfachinossalina 20 liquido Chemifarma	Sulfaquinoxaline	Soluzione orale	Pollo (pollo da carne), Coniglio		Uso orale	Conigli: carne 22 giorni (somministrazione in acqua da bere) Pollo (broiler): carne 35 giorni (somministrazione in acqua da bere)	101987016 101987028 101987030	QJ01EQ16	Sistemico
		Sulfadimetossina 25 Sulfachinossalina 25 Diaveridina 25 liquido Chemifarma soluzione per uso orale per uccelli da gabbia e da voliera	Diaveridine + Sulfaquinoxaline + Sulfadimethoxine	Soluzione orale		Uccelli da gabbia e da voliera	Uso orale		101986014 101986026 101986038	QP51AG53	Antiprotozoario
		SULFAZONE	Thiamine hydrochloride + Pyridoxine hydrochloride + Riboflavin + Menadione + Sulfaquinoxaline + Furazolidone	Polvere orale		Uccelli da gabbia e da voliera	Somministrazione con il mangime		103460010 103460022 103460034	QP51AG53	Antiprotozoario
	sulfatiazolo	METAMERAZINA	Sulfamerazine sodium + Sulfathiazole sodium + Sulfadimidine sodium	Soluzione iniettabile	Bovini, Polli, Ovino, Coniglio, Suino, Cavallo	Cane, Gatto	Uso intraperitoneale; Uso intramuscolare; Uso endovenoso	Bovini: carne 24 giorni (uso endovenoso, uso intraperitoneale, uso intramuscolare); latte 168 ore (uso intraperitoneale, uso intramuscolare, uso endovenoso); latte 72 ore (uso endovenoso) Conigli: carne 18 giorni (uso endovenoso, uso intraperitoneale, uso intramuscolare) Equidi (cavallo): carne 24 giorni (uso endovenoso, uso intraperitoneale, uso intramuscolare) Ovini: carne 24 giorni (uso endovenoso, uso intraperitoneale, uso intramuscolare); latte 168 ore (uso intraperitoneale, uso intramuscolare, uso endovenoso); latte 72 ore (uso endovenoso) Pollo: carne 18 giorni (uso endovenoso, uso intraperitoneale, uso intramuscolare) Suino: carne 24 giorni (uso endovenoso, uso intraperitoneale, uso intramuscolare)	101721025 101721037 101721049 101721090	QJ01EQ30	Sistemico
		CENSULFATRIM 200 mgml + 40 mgml solution for injection Censulfatrim 200 mgml + 40 mgml Soluzione iniettabile	Trimethoprim + Sulfadiazine	Soluzione iniettabile	Bovini, Suino, Cavallo	Cane, Gatto	Uso intramuscolare; Uso endovenoso; Uso sottocutaneo	Bovini: carne 12 giorni (uso intramuscolare, uso endovenoso); latte 48 ore (uso intramuscolare, uso endovenoso) Equidi (cavallo): carne 28 giorni (uso endovenoso) Suino: carne 20 giorni (uso intramuscolare, uso endovenoso)	105737011 105737023 105737035 105737047	QJ01EW10	Sistemico
UTTASI E COMBINAZIONI		CHEMITRIM Soluzione per uso orale per suini	Sulfadimethoxine + Trimethoprim	Soluzione orale	Suino		Uso orale	Suino: carne 7 giorni (somministrazione in acqua da bere)	102899010 102899022 102899034	QJ01EW09	Sistemico

Categoria D - PRUDENZA

Classe di antibiotici	Molecola	Specialità veterinaria	Sostanze attive	Forma farmaceutica	Specie DPA	Specie non DPA	Vie di somministrazione	Tempi di attesa	Codice AIC	ATCvet	Uso (da ATCvet)
SULFONAMIDI, INIBITORI DELLA DIIDROFOLATO REDU	trimetoprim	Cubarmix Equi 400 mgg and 80 mgg oral powder for horses	Sulfadiazine + Trimethoprim	Polvere orale	Cavallo		Uso orale	Equidi (cavallo): carne 6 mesi (uso orale)	105919017 105919029 105919031 105919043 105919056	QJ01EW10	Sistemico
		DAIPRIM 200 mgml + 4 mgml soluzione per uso in acqua da bere per vitelli suinetti e polli	Sulfamonomethoxine sodium + Trimethoprim	Soluzione orale	Bovini (vitello), Suino (suinetto), Polli		Uso orale	Bovini: carne 13 giorni (uso intramuscolare); latte 120 ore (uso intramuscolare) Bovini (vitelli): carne 11 giorni (somministrazione in acqua da bere) Pollo: carne 7 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino: carne 3 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino: carne 20 giorni (uso intramuscolare)	102009014 102009026 102009038 102009040	QJ01EW17	Sistemico
		DAIPRIM 200 mgml + 40 mgml soluzione iniettabile per bovini e suini	Trimethoprim + Sulfamonomethoxine sodium	Soluzione iniettabile	Bovini, Suino		Uso intramuscolare	Bovini: carne 13 giorni (uso intramuscolare); latte 120 ore (uso intramuscolare) Bovini (vitelli): carne 11 giorni (somministrazione in acqua da bere) Pollo: carne 7 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino: carne 3 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino: carne 20 giorni (uso intramuscolare)	102009014 102009026 102009038 102009040	QJ01EW17	Sistemico
		Diatrim 200 mgml + 40 mgml solution for injection for cattle pigs dogs and cats Diatrim 200 mgml + 40 mgml soluzione iniettabile per bovini suini cani e gatti	Trimethoprim + Sulfadiazine	Soluzione iniettabile	Bovini, Suino	Cane, Gatto	Uso intramuscolare; Uso sottocutaneo	Bovini: carne 12 giorni (uso endovenoso, uso intramuscolare); latte 48 ore (uso endovenoso, uso intramuscolare) Suino: carne 20 giorni (uso endovenoso, uso intramuscolare)	105087011 105087023	QJ01EW10	Sistemico
		DOXATRIM 15 PM 25 mgg + 125 mgg premiscela per alimenti medicamentosi per suini polli tacchini e pesci	Sulfadiazine + Trimethoprim	Premiscela per alimenti medicamentosi	Suino, Pollo (pollo da carne), Tacchino, Pesce		Uso orale	Pesci: carne 500 gradi giorno (somministrazione con il mangime) Pollo (broiler): carne 4 giorni (somministrazione con il mangime) Suino: carne 10 giorni (somministrazione con il mangime) Uccelli (tacchino): carne 6 giorni (somministrazione con il mangime)	102868027	QJ01EW10	Sistemico
		DOXATRIM soluzione per uso in acqua da bere per polli da carne e tacchini	Sulfadimethoxine + Sulfadimidine + Trimethoprim	Soluzione per somministrazione in acqua da bere	Pollo (pollo da carne), Tacchino		Uso orale	Pollo: carne 3 giorni (somministrazione in acqua da bere) Uccelli (tacchino): carne 7 giorni (somministrazione in acqua da bere)	101145023 101145050 101145062 101145074	QJ01EW30	Sistemico
		EQUIBACTIN 250 MGG + 50 MGG POLVERE ORALE PER CAVALLI Equibactin vet 250 mgg + 50 mgg oral powder	Trimethoprim + Sulfadiazine	Polvere orale	Cavallo		Uso orale	Equidi (cavallo): carne 10 giorni (basso dosaggio) (uso orale); carne 20 giorni (alto dosaggio) (uso orale)	105162010 105162022 105162034 105162046 105162059	QJ01EW10	Sistemico
		EQUIBACTIN VET Equibactin vet 333 mgg + 67 mgg oral paste for horses	Trimethoprim + Sulfadiazine	Pasta per uso orale	Cavallo		Uso orale	Equidi (cavallo): carne 14 giorni (uso orale)	103891014 103891026	QJ01EW10	Sistemico
		HYDROTRIM 500 MGG + 100 MGG POWDER FOR USE IN DRINKING WATERMILK FOR CATTLE SHEEP PIGS AND CHICKENS Hydrotrim 500 mgg + 100 mgg polvere per uso in acqua da berelatte per bovini ovini suini e polli	Sulfadiazine sodium + Trimethoprim	Polvere per somministrazione in acqua da bere/latte	Bovini (preruminante), Ovino (agnello), Polli, Suino		Somministrazione in acqua da bere/latte; Somministrazione in acqua da bere	Bovini (vitelli): carne 12 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Ovini (agnelli): carne 12 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Pollo (broiler): carne 12 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino: carne 12 giorni (somministrazione in acqua da bere)	105709012 105709024	QJ01EW10	Sistemico
		METAXOL Metaxol 20100 mgml Oral solution for pigs and chickens	Trimethoprim + Sulfamethoxazole	Soluzione per somministrazione in acqua da bere	Polli, Suino		Somministrazione in acqua da bere	Pollo (broiler): carne 5 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Suino (suini da ingrasso): carne 8 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte)	104896016 104896028	QJ01EW11	Sistemico
		METHOXASOL Methoxasol 20100 mgml solution for use in drinking water for pigs and broilers	Sulfamethoxazole + Trimethoprim	Soluzione per somministrazione in acqua da bere	Suino, Polli		Somministrazione in acqua da bere	Pollo (broiler): carne 6 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Suino: carne 5 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte)	104420017 104420029	QJ01EW11	Sistemico
		NEOPRIDIMET ORALE 600 mgg +120 mgg premiscela per alimenti medicamentosi per suini e salmonidi	Sulfadiazine + Trimethoprim	Premiscela per alimenti medicamentosi	Suino, Salmonidi		Somministrazione con il mangime	Pesci (salmonidi): carne 250 gradi giorno (somministrazione con il mangime) Suino: carne 3 giorni (somministrazione con il mangime)	103546014 103546026 103546038	QJ01EW10	Sistemico
		NEOPRIDIMET soluzione orale 200 mg + 40 mgml per uso in acqua da bere per polli da carne e conigli	Trimethoprim + Sulfadiazine	Soluzione per somministrazione in acqua da bere	Coniglio, Pollo (pollo da carne)		Uso orale	Conigli: carne 5 giorni (somministrazione in acqua da bere) Pollo: carne 5 giorni (somministrazione in acqua da bere)	102364015 102364027 102364039 102364041 102364054	QJ01EW10	Sistemico
		Norodine 24 Soluzione iniettabile per bovini equini suini cani e gatti	Trimethoprim + Sulfadiazine	Soluzione iniettabile	Bovini, Suino, Cavallo	Cane, Gatto	Uso intramuscolare; Uso endovenoso; Uso sottocutaneo	Bovini: carne 12 giorni (uso intramuscolare, uso endovenoso); latte 48 ore (uso intramuscolare, uso endovenoso) Equidi (cavallo): carne 28 giorni (uso intramuscolare, uso endovenoso) Suino: carne 15 giorni (uso intramuscolare, uso endovenoso)	101080012 101080024	QJ01EW10	Sistemico
		NOXAPRIM 333 g100 g + 67 g100 g Pasta ad uso orale per Equidi non destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano NDPA	Sulfamethoxazole + Trimethoprim	Pasta per uso orale		Cavallo Non DPA	Uso orale		100151012 100151024	QJ01EW11	Sistemico
NAZIONI		Prazil N Orale 200 mgml + 40 mgml soluzione orale per bovini suini broilers tacchini e conigli	Sulfadimethoxine + Trimethoprim	Soluzione orale	Bovini (vitello), Suino, Suini (da ingrasso), Tacchino, Pollo (pollo da carne), Coniglio		Somministrazione in acqua da bere/latte; Somministrazione in acqua da bere	Bovini (vitelli): carne 20 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Conigli: carne 6 giorni (somministrazione in acqua da bere) Pollo (broiler): carne 4 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino (suini da ingrasso): carne 8 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Suino: carne 8 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Uccelli (tacchino): carne 9 giorni (somministrazione in acqua da bere)	101305062 101305086 101305098 101305100	QJ01EW09	Sistemico

Categoria D - PRUDENZA

Classe di antibiotici	Molecola	Specialità veterinaria	Sostanze attive	Forma farmaceutica	Specie DPA	Specie non DPA	Vie di somministrazione	Tempi di attesa	Codice AIC	ATCvet	Uso (da ATCvet)
SULFONAMIDI, INIBITORI DELLA DIIDROFOLATO REDUTTASI E COMBINAZIONI	trimetoprim	PRIDIMET 100 mgml + 20 mgml soluzione orale per polli tacchini suinetti vitelli	Sulfadimethoxine + Trimethoprim	Soluzione orale	Polli, Tacchino, Suino (suinetto), Bovini (vitello)		Uso orale	Bovini: carne 20 giorni (uso intraperitoneale, uso intramuscolare, uso endovenoso, uso sottocutaneo); latte 84 giorni (uso intramuscolare); latte 84 ore (uso endovenoso, uso intramuscolare) Bovini (vitelli): carne 20 giorni (somministrazione in acqua da bere, uso intramuscolare, somministrazione in acqua da bere/latte) Pollo (broiler): carne 11 giorni (somministrazione in acqua da bere) Pollo: carne 11 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Suino: carne 12 giorni (somministrazione in acqua da bere, somministrazione in acqua da bere/latte); carne 20 giorni (uso intramuscolare) Suino: carne 20 giorni (uso intramuscolare, uso intraperitoneale, uso endovenoso, uso sottocutaneo) Uccelli (tacchino): carne 11 giorni (somministrazione in acqua da bere, somministrazione in acqua da bere/latte)	101772010 101772022 101772034 101772059 101772061 101772073 101772085	QJ01EW09	Sistemico
		PRIDIMET 200 mgml + 40 mgml soluzione iniettabile per bovini e suini	Sulfadimethoxine + Trimethoprim + Sulfadimethoxine + Trimethoprim + Sulfadimethoxine + Trimethoprim	Soluzione iniettabile	Bovini, Suino, Suino (suinetto), Bovini (vitello), Bovini (vacca da latte)		Uso intraperitoneale; Uso endovenoso; Uso intramuscolare	Bovini: carne 20 giorni (uso intraperitoneale, uso intramuscolare, uso endovenoso, uso sottocutaneo); latte 84 giorni (uso intramuscolare); latte 84 ore (uso endovenoso, uso intramuscolare) Bovini (vitelli): carne 20 giorni (somministrazione in acqua da bere, uso intramuscolare, somministrazione in acqua da bere/latte) Pollo (broiler): carne 11 giorni (somministrazione in acqua da bere) Pollo: carne 11 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Suino: carne 12 giorni (somministrazione in acqua da bere, somministrazione in acqua da bere/latte); carne 20 giorni (uso intramuscolare) Suino: carne 20 giorni (uso intramuscolare, uso intraperitoneale, uso endovenoso, uso sottocutaneo) Uccelli (tacchino): carne 11 giorni (somministrazione in acqua da bere, somministrazione in acqua da bere/latte)	101772010 101772022 101772034 101772059 101772061 101772073 101772085	QJ01EW09	Sistemico
		PRIDIMET 24 200 mgml + 40 mgml soluzione per uso in acqua da berelatte per polli tacchini suinetti vitelli	Sulfadimethoxine + Trimethoprim	Soluzione per somministrazione in acqua da bere/latte	Polli, Tacchino, Bovini (vitello), Suino (suinetto)		Uso orale	Bovini: carne 20 giorni (uso intraperitoneale, uso intramuscolare, uso endovenoso, uso sottocutaneo); latte 84 giorni (uso intramuscolare); latte 84 ore (uso endovenoso, uso intramuscolare) Bovini (vitelli): carne 20 giorni (somministrazione in acqua da bere, uso intramuscolare, somministrazione in acqua da bere/latte) Pollo (broiler): carne 11 giorni (somministrazione in acqua da bere) Pollo: carne 11 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Suino: carne 12 giorni (somministrazione in acqua da bere, somministrazione in acqua da bere/latte); carne 20 giorni (uso intramuscolare) Suino: carne 20 giorni (uso intramuscolare, uso intraperitoneale, uso endovenoso, uso sottocutaneo) Uccelli (tacchino): carne 11 giorni (somministrazione in acqua da bere, somministrazione in acqua da bere/latte)	101772010 101772022 101772034 101772059 101772061 101772073 101772085	QJ01EW09	Sistemico
		SULFAPREX 250 mgg + 50 mgg premiscela per mangimi medicati per suini SULFAPREX 25050 mgg Premix for medicated feeding stuff for pigs	Sulfadiazine + Trimethoprim	Premiscela per alimenti medicamentosi	Suino		Somministrazione con il mangime	Suino: carne 5 giorni (somministrazione con il mangime)	104472016	QJ01EW10	Sistemico
		SULFAPRIM soluzione iniettabile per bovini equini suini cani e gatti	Trimethoprim + Sulfadimethoxine sodium	Soluzione iniettabile	Bovini, Suino, Cavallo	Cane, Gatto	Uso intramuscolare; Uso endovenoso	Bovini: carne 20 giorni (uso intramuscolare, uso endovenoso); latte 96 ore (uso intramuscolare, uso endovenoso) Equidi (cavallo): carne 30 giorni (uso intramuscolare, uso endovenoso) Suino: carne 16 giorni (uso intramuscolare, uso endovenoso)	101779015 101779027 101779039	QJ01EW09	Sistemico
		SULFATRIMDOX 200 GL + 40 GL	Sulfadiazine + Trimethoprim	Soluzione orale	Pollo (pollo da carne), Coniglio		Somministrazione in acqua da bere	Conigli: carne 5 giorni (somministrazione in acqua da bere) Pollo (broiler): carne 5 giorni (somministrazione in acqua da bere)	105181010 105181022 105181034	QJ01EW10	Sistemico
		TINKANIUM	Trimethoprim + Sulfadimidine	Soluzione iniettabile	Bovini, Suino		Uso intramuscolare; Uso endovenoso	Bovini: carne 7 giorni (uso intramuscolare, uso endovenoso); latte 48 ore (uso endovenoso, uso intramuscolare) Suino: carne 7 giorni (uso intramuscolare, uso endovenoso)	101453088 101453090	QJ01EW03	Sistemico
		TRIMESUL CM 40 mgml + 200 mgml soluzione iniettabile per bovini suini equini cani gatti	Sulfadiazine + Trimethoprim	Soluzione iniettabile	Bovini, Suino, Cavallo	Cane, Gatto	Uso intramuscolare; Uso endovenoso; Uso sottocutaneo	Bovini: carne 14 giorni (uso intramuscolare, uso endovenoso); latte 96 ore (uso intramuscolare, uso endovenoso) Equidi (cavallo): carne 14 giorni (uso endovenoso) Suino: carne 14 giorni (uso intramuscolare, uso endovenoso)	103255016 103255028 103255030	QJ01EW10	Sistemico
		TRIMETHOSULFA MLP premiscela per mangimi medicati per suini	Trimethoprim + Sulfadiazine	Premiscela per alimenti medicamentosi	Suino		Somministrazione con il mangime	Suino: carne 7 giorni (somministrazione con il mangime)	103553018	QJ01EW10	Sistemico
		TRIMETHOSULFA ORALE soluzione orale per vitelli suini conigli polli da carne e tacchini	Trimethoprim + Sulfadiazine	Soluzione orale	Bovini (vitello), Coniglio, Suino, Tacchino, Pollo (pollo da carne)		Uso orale; Somministrazione in acqua da bere/latte; Somministrazione in acqua da bere	Bovini (vitelli): carne 9 giorni (somministrazione in acqua da bere, uso orale, somministrazione in acqua da bere/latte) Conigli: carne 15 giorni (somministrazione in acqua da bere, uso orale) Pollo (broiler): carne 3 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino: carne 3 giorni (uso orale, somministrazione in acqua da bere, somministrazione in acqua da bere/latte) Uccelli (tacchino): carne 7 giorni (somministrazione in acqua da bere)	100131010 100131022 100131034 100131046	QJ01EW10	Sistemico
		TRIMETOPRIM 40 SULFADIMETOSSINA 200 Soluzione orale per uso in acqua da bere per polli da carne tacchini e conigli	Sulfadimethoxine + Trimethoprim	Soluzione per somministrazione in acqua da bere	Pollo (pollo da carne), Tacchino, Coniglio		Uso orale	Conigli: carne 11 giorni (somministrazione in acqua da bere) Pollo (broiler): carne 8 giorni (somministrazione in acqua da bere) Uccelli (tacchino): carne 7 giorni (somministrazione in acqua da bere)	102382013 102382037 102382049 102382064	QJ01EW09	Sistemico

Categoria D - PRUDENZA

Classe di antibiotici	Molecola	Specialità veterinaria	Sostanze attive	Forma farmaceutica	Specie DPA	Specie non DPA	Vie di somministrazione	Tempi di attesa	Codice AIC	ATCvet	Uso (da ATCvet)
SULFONAMIDI, INIB		Triquest 333 mgml + 67 mgml sospensione orale per cavalli Triquest Vet 333 mgml + 67 mgml oral suspension for horses	Sulfadiazine + Trimethoprim	Sospensione orale	Cavallo		Uso orale	Equidi (cavallo): carne 10 giorni (uso orale)	105746010 105746022	QJ01EW10	Sistemico
		TSsol 20100 TSsol 20100 mgml soluzione per uso in acqua da bere per suini e polli	Trimethoprim + Sulfamethoxazole	Soluzione per somministrazione in acqua da bere	Suini (da ingrasso), Pollo (pollo da carne)		Somministrazione in acqua da bere	Pollo (broiler): carne 5 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino: carne 8 giorni (somministrazione in acqua da bere)	105051015 105051027	QJ01EW11	Sistemico
TETRACICLINE	clortetraciclina	Animedazon Spray 245 ww cutaneous spray suspension for cattle sheep and pigs Animedazon Spray 245 pp spray cutaneo sospensione per bovini ovini e suini	Chlortetracycline hydrochloride	Spray cutaneo, sospensione	Bovini, Ovino, Suino		Uso cutaneo	Bovini (bovini da carne): carne 0 giorni (uso cutaneo) Bovini (bovini da latte): latte 0 giorni (uso cutaneo) Ovini (ovini/pecore per prod carne): carne 0 giorni (uso cutaneo) Ovini (ovini/pecore per prod latte): latte 0 giorni (uso cutaneo) Suino (suini da ingrasso): carne 0 giorni (uso cutaneo)	103980013	QD06AA02	Dermatologico
		CLORBIOTIC 200 200gkg premiscela per mangimi medicati per suini e pesci	Chlortetracycline	Premiscela per alimenti medicamentosi	Pesce, Suino		Somministrazione con il mangime	Pesci: carne 500 gradi giorno (somministrazione con il mangime) Suino: carne 9 giorni (somministrazione con il mangime)	102542038	QJ01AA03	Sistemico
		CLORDOX 200	Chlortetracycline	Polvere orale	Pollo (gallina ovaiola), Pollo (pollo da carne), Suino, Bovino (vitello lattante)		Uso orale	Bovini (vitelli da latte): carne 14 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Pollo (broiler): carne 6 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Pollo (galline ovaiole): uova 5 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Suino: carne 12 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte)	103975013	QJ01AA03	Sistemico
		CLORTETRA 200 PREMIX	Chlortetracycline	Premiscela per alimenti medicamentosi	Pollo (gallina ovaiola), Pollo (pollo da carne), Pesce, Suino		Somministrazione con il mangime	Pesci: carne 500 gradi giorno (somministrazione con il mangime) Pollo (broiler): carne 6 giorni (somministrazione con il mangime) Pollo (galline ovaiole): uova 9 giorni (somministrazione con il mangime) Suino: carne 24 giorni (somministrazione con il mangime)	102541036 102541048	QJ01AA03	Sistemico
		Clortetraciclina 20 Chemifarma SpA 200 mgg polvere per soluzione orale per suini polli da carne galline ovaiole e vitelli da latte da sciogliere in acqua da bere o mangime liquido	Chlortetracycline	Polvere orale	Bovino (vitello lattante), Pollo (gallina ovaiola), Pollo (pollo da carne), Suino		Somministrazione in acqua da bere/latte; Somministrazione in acqua da bere	Bovini (vitelli da latte): carne 24 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Pollo (broiler): carne 6 giorni (somministrazione in acqua da bere) Pollo (galline ovaiole): uova 5 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino: carne 4 giorni (somministrazione in acqua da bere)	102536012 102536024	QJ01AA03	Sistemico
		CLORTETRACICLINA 20 UNIONE COMMERCIALE LOMBARDA	Chlortetracycline	Polvere per somministrazione in acqua da bere	Pollo (gallina ovaiola), Pollo (pollo da carne), Suino		Somministrazione in acqua da bere	Pollo (broiler): carne 6 giorni (somministrazione in acqua da bere) Pollo (galline ovaiole): uova 5 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino: carne 4 giorni (somministrazione in acqua da bere)	102546013	QJ01FA91	Sistemico
		Clortetraciclina 200 200 mgg premiscela per alimenti medicamentosi per suini polli da carne e galline ovaiole	Chlortetracycline	Premiscela per alimenti medicamentosi	Pollo (gallina ovaiola), Pollo (pollo da carne), Suino		Somministrazione con il mangime	Pollo (broiler): carne 6 giorni (somministrazione con il mangime) Pollo (galline ovaiole): uova 9 giorni (somministrazione con il mangime) Suino: carne 9 giorni (somministrazione con il mangime)	102537014 102537026	QJ01AA03	Sistemico
		Clortetraciclina TREI 200 mgg polvere per soluzione orale per vitelli da latte polli da carne galline ovaiole e suini	Chlortetracycline	Polvere per somministrazione in acqua da bere/latte	Pollo (pollo da carne), Bovino (vitello lattante), Suino, Pollo (gallina)		Somministrazione in acqua da bere/latte	Bovini (vitelli da latte): carne 24 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Pollo (broiler): carne 6 giorni (somministrazione in acqua da bere) Pollo (galline ovaiole): uova 5 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino: carne 4 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte)	102543016 102543028 102543030 102543042	QJ01AA03	Sistemico
		Clortetraciclina TREI 800 mgg polvere per soluzione orale per vitelli da latte polli da carne galline ovaiole e suini	Chlortetracycline	Polvere per soluzione orale	Pollo (pollo da carne), Bovino (vitello lattante), Suino, Pollo (gallina)		Uso orale	Bovini (vitelli da latte): carne 24 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Pollo (broiler): carne 6 giorni (somministrazione in acqua da bere) Pollo (galline ovaiole): uova 5 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino: carne 4 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte)	102543016 102543028 102543030 102543042	QJ01AA03	Sistemico
		CTC 150 150 gkg premiscela per alimenti medicamentosi per suini polli da carne e galline ovaiole	Chlortetracycline	Premiscela per alimenti medicamentosi	Pollo (gallina ovaiola), Pollo (pollo da carne), Suino		Somministrazione con il mangime	Pollo (broiler): carne 6 giorni (somministrazione con il mangime) Pollo (galline ovaiole): uova 9 giorni (somministrazione con il mangime) Suino: carne 9 giorni (somministrazione con il mangime)	102538016	QJ01AA03	Sistemico
		CTC Spray 245 ww for cattle sheep and pigs Cyclospray 245 ww spray cutaneo sospensione per bovini ovini e suini	Chlortetracycline hydrochloride	Spray cutaneo, sospensione	Bovini, Ovino, Suino		Uso cutaneo	Bovini: carne 0 giorni (spray); latte 0 giorni (spray) Ovini: carne 0 giorni (spray); latte 0 giorni (spray) Suino: carne 0 giorni (spray)	103184014 103184026	QD06AA02	Dermatologico
		ISOSPEN 100 mg compresse per cani e gatti	Chlortetracycline hydrochloride	Compressa		Cane, Gatto	Uso orale		102245026	QP51BX	Antiprotozoario
	clortetraciclina	IZOASPERSORIO	Sulfaguanidine + Sulfanilamide + Chlortetracycline hydrochloride + Benzylpenicillin sodium	Polvere cutanea	Caprino, Bovini, Ovino, Suino	Cane, Cavallo Non DPA, Gatto	Uso cutaneo	Bovini (bovini da carne): carne 0 giorni (uso cutaneo) Bovini (bovini da latte): latte 0 giorni (uso cutaneo) Caprini: carne 0 giorni (uso cutaneo) Caprini (capre per la produzione di latte): latte 0 giorni (uso cutaneo) Ovini (ovini/pecore per prod carne): carne 0 giorni (uso cutaneo) Ovini (ovini/pecore per prod latte): latte 0 giorni (uso cutaneo) Suino (suini da ingrasso): carne 0 giorni (uso cutaneo)	102017011	QD06C	Dermatologico
		Ophtocycline 10 mgg unguento oftalmico per cani gatti e cavalli Ophtocycline 10mgg eye ointment for horses dogs and cats	Chlortetracycline hydrochloride	Unguento oftalmico	Cavallo	Cane, Gatto	Uso oftalmico	Equidi (cavallo): carne 1 giorni (uso oftalmico)	105029019	QS01AA02	Oftalmico
		POLISULFAN 100 100 mgg + 40 mgg premiscela per alimenti medicamentosi per suini e conigli	Sulfadimethoxine + Chlortetracycline	Premiscela per alimenti medicamentosi	Coniglio, Suino		Somministrazione con il mangime	Conigli: carne 14 giorni (somministrazione con il mangime) Suino: carne 7 giorni (somministrazione con il mangime)	102466012 102466024	QJ01AA53	Sistemico
		SOLCLOR 200 S	Chlortetracycline	Premiscela per alimenti medicamentosi	Pesce, Suino		Somministrazione con il mangime	Pesci: carne 500 gradi giorno (somministrazione con il mangime) Suino: carne 7 giorni (somministrazione con il mangime)	102547015	QJ01AA03	Sistemico

Categoria D - PRUDENZA

Classe di antibiotici	Molecola	Specialità veterinaria	Sostanze attive	Forma farmaceutica	Specie DPA	Specie non DPA	Vie di somministrazione	Tempi di attesa	Codice AIC	ATCvet	Uso (da ATCvet)
TETRACICLINE	doxiciclina	Acquadox 500 mgg polvere per uso nellacqua da bere per suini e polli Soludox 500 mgg powder for use in drinking water for pigs and chickens	Doxycycline hyclate	Polvere per somministrazione in acqua da bere	Polli, Suino		Somministrazione in acqua da bere	Pollo (broiler): carne 3 giorni (basso dosaggio) (somministrazione in acqua da bere); carne 9 giorni (alto dosaggio) (somministrazione in acqua da bere) Suino: carne 4 giorni (somministrazione in acqua da bere)	104224011 104224023 104224035 104224047	QJ01AA02	Sistemico
		Altidox 500 mgg polvere da somministrare nellacqua da bere per suini polli e tacchini Altidox 500 mgg powder for use in drinking water for pigs chickens and turkeys	Doxycycline hyclate	Polvere per somministrazione in acqua da bere	Tacchino, Suino, Polli		Somministrazione in acqua da bere	Pollo: carne 5 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino: carne 4 giorni (somministrazione in acqua da bere) Uccelli (tacchino): carne 12 giorni (somministrazione in acqua da bere)	104963018 104963020	QJ01AA02	Sistemico
		APSASOL HIDOX 500 mgg APSASOL HIDOX 500 mgg polvere per uso nellacqua da bere per polli suini e conigli	Doxycycline hyclate	Polvere per somministrazione in acqua da bere	Suini (da ingrasso), Pollo (pollo da carne), Coniglio		Somministrazione in acqua da bere	Conigli: carne 4 giorni (somministrazione in acqua da bere) Pollo (broiler): carne 7 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino (suini da ingrasso): carne 2 giorni (somministrazione in acqua da bere)	105426011 105426023 105426035	QJ01AA02	Sistemico
		ASHIDOX 500 mgg powder for use in drinking watermilk for cattle preruminant pigs and chickens	Doxycycline hyclate	Polvere per somministrazione in acqua da bere/latte	Bovini, Polli, Suino		Uso orale	Bovini (bovini pre ruminanti): carne 7 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Pollo: carne 5 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Suino: carne 8 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte)	105845010 105845022	QJ01AA02	Sistemico
		BRONCHIDOX 400+40mgg polvere per soluzione orale per vitelli in svezzamento e bovini da carne	Doxycycline + Bromhexine hydrochloride	Polvere per soluzione orale	Bovini (vitello), Bovini (bovino da carne)		Somministrazione in acqua da bere/latte; Somministrazione in acqua da bere	Bovini (bovini da carne): carne 10 giorni (somministrazione in acqua da bere) Bovini (vitelli): carne 10 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte)	104884010 104884022 104884034 104884046	QJ01AA02, QR05CB02	Sistemico
		Centidox 100 powder for use in drinking water or milkmilk replacer for calves and pigs	Doxycycline hyclate	Polvere per somministrazione in acqua da bere/latte	Bovini (vitello), Suino		Somministrazione in acqua da bere/latte	Bovini (vitelli): carne 16 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Suino: carne 8 giorni (somministrazione in acqua da bere)	104205012 104205024 104205036 104205048	QJ01AA02	Sistemico
		DFV DOXIVET 200 mgml solution for use in drinking water for pigs and chickens DOXYCYCLINE 200 MGML DFV	Doxycycline hyclate	Soluzione per somministrazione in acqua da bere	Polli, Suino		Somministrazione in acqua da bere	Pollo: carne 12 giorni (alto dosaggio) (somministrazione in acqua da bere); carne 3 giorni (basso dosaggio) (somministrazione in acqua da bere) Suino: carne 4 giorni (somministrazione in acqua da bere)	104306016 104306028	QJ01AA02	Sistemico
		DFV DOXIVET 500 mgg powder for use in drinking water for pigs and chickens DOXYCYCLINE 500 MGG DFV	Doxycycline hyclate	Polvere per somministrazione in acqua da bere	Polli, Suino		Somministrazione in acqua da bere	Pollo: carne 12 giorni (alto dosaggio) (somministrazione in acqua da bere); carne 3 giorni (basso dosaggio) (somministrazione in acqua da bere) Suino: carne 4 giorni (somministrazione in acqua da bere)	104318011 104318023 104318062	QJ01AA02	Sistemico
		DOXI 500 468 mgg polvere ad uso orale per suini polli da carne e tacchini	Doxycycline	Polvere per somministrazione in acqua da bere	Suino, Pollo (pollo da carne), Tacchino		Uso orale	Pollo (broiler): carne 6 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino: carne 5 giorni (somministrazione in acqua da bere) Uccelli (tacchino): carne 8 giorni (somministrazione in acqua da bere)	103591018 103591020 103591032 103591044 103591057	QJ01AA02	Sistemico
		DOXIBON 50 500 mgg polvere per uso in acqua da bere per polli da carne tacchini e suini	Doxycycline hyclate	Polvere per somministrazione in acqua da bere	Polli, Tacchino, Suino		Uso orale	Pollo: carne 3 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino: carne 4 giorni (somministrazione in acqua da bere) Uccelli (tacchino): carne 10 giorni (somministrazione in acqua da bere)	104416019 104416021	QJ01AA02	Sistemico
		DOXINYL 500 MGG POWDER FOR USE IN DRINKING WATER FOR PIGS CHICKENS AND TURKEYS LIVIDOXX 500 mgg polvere per uso in acqua da bere per suini polli e tacchini	Doxycycline hyclate	Polvere per somministrazione in acqua da bere	Tacchino, Suino, Polli		Somministrazione in acqua da bere	Pollo: carne 5 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino: carne 4 giorni (somministrazione in acqua da bere) Uccelli (tacchino): carne 12 giorni (somministrazione in acqua da bere)	105450011 105450023	QJ01AA02	Sistemico
		DOXIPAN 200 mgg polvere per soluzione orale per vitelli suini polli da carne e tacchini	Doxycycline	Polvere per somministrazione in acqua da bere/latte	Bovini (vitello), Suino, Pollo (pollo da carne), Tacchino		Somministrazione in acqua da bere/latte	Bovini (vitelli da latte): carne 13 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Bovini (vitelli): carne 13 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Pollo (broiler): carne 4 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino: carne 4 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Uccelli (tacchino): carne 10 giorni (somministrazione in acqua da bere)	100150022 100150034 100150061 100150073 100150085 100150097 100150111 100150135	QJ01AA02	Sistemico
		DOXIPAN 54 500 mgg polvere per soluzione orale tacchini e suini	Doxycycline	Polvere per soluzione orale	Pollo (pollo da carne), Tacchino, Suino		Uso orale	Bovini (vitelli da latte): carne 13 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Bovini (vitelli): carne 13 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Pollo (broiler): carne 4 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino: carne 4 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Uccelli (tacchino): carne 10 giorni (somministrazione in acqua da bere)	100150022 100150034 100150061 100150073 100150085 100150097 100150111 100150135	QJ01AA02	Sistemico
		DOXIPAN 800 mgg polvere per soluzione orale per vitelli suini polli da carne e tacchini	Doxycycline hyclate	Polvere orale	Bovini (vitello), Suino, Bovino (vitello lattante), Tacchino, Pollo (pollo da carne)		Somministrazione in acqua da bere/latte; Somministrazione in acqua da bere	Bovini (vitelli da latte): carne 13 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Bovini (vitelli): carne 13 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Pollo (broiler): carne 4 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino: carne 4 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Uccelli (tacchino): carne 10 giorni (somministrazione in acqua da bere)	100150022 100150034 100150061 100150073 100150085 100150097 100150111 100150135	QJ01AA02	Sistemico
		DOXIPULVIS 500 MGG POWDER FOR USE IN DRINKING WATER MILK DOXIPULVIS 500 mgg polvere per uso in acqua da berelatte	Doxycycline hyclate	Polvere per somministrazione in acqua da bere/latte	Tacchino, Suino, Bovini (vitello), Polli		Uso orale	Bovini (vitelli): carne 14 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Pollo: carne 7 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino: carne 6 giorni (somministrazione in acqua da bere) Uccelli (tacchino): carne 12 giorni (somministrazione in acqua da bere)	104912011 104912023	QJ01AA02	Sistemico

Categoria D - PRUDENZA

Classe di antibiotici	Molecola	Specialità veterinaria	Sostanze attive	Forma farmaceutica	Specie DPA	Specie non DPA	Vie di somministrazione	Tempi di attesa	Codice AIC	ATCvet	Uso (da ATCvet)
TETRACICLINE	doxiciclina	DOXXSOL 500 MG G POLVERE PER USO IN ACQUA DA BERE LATTE DoxxSol 500 mgg powder for use in drinking watermilk replacer	Doxycycline hyclate	Polvere per somministrazione in acqua da bere/latte	Polli, Bovini (vitello), Suino		Somministrazione in acqua da bere/latte	Bovini (vitelli da latte): carne 7 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Bovini (vitelli): carne 7 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Pollo: carne 5 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino: carne 8 giorni (somministrazione in acqua da bere)	104732019 104732021	QJ01AA02	Sistemico
		Doxybactin 200 mg Doxybactin 200 mg compresse per cani	Doxycycline hyclate	Compressa		Cane	Uso orale		105052029 105052031 105052043 105052068 105052070 105052082	QJ01AA02	Sistemico
		Doxybactin 400 mg Doxybactin 400 mg compresse per cani	Doxycycline hyclate	Compressa		Cane	Uso orale		105052029 105052031 105052043 105052068 105052070 105052082	QJ01AA02	Sistemico
		Doxybactin 50 mg	Doxycycline hyclate	Compressa		Cane, Gatto	Uso orale		105052029 105052031 105052043 105052068 105052070 105052082	QJ01AA02	Sistemico
		DOXYCYCLINE CALIER 500 mgg Oral powder for chickens turkeys and pigs	Doxycycline hyclate	Polvere per somministrazione in acqua da bere	Tacchino, Suini (da ingrasso), Pollo (pollo da carne)		Somministrazione in acqua da bere	Pollo: carne 12 giorni (alto dosaggio) (somministrazione in acqua da bere); carne 3 giorni (basso dosaggio) (somministrazione in acqua da bere) Suino: carne 4 giorni (somministrazione in acqua da bere)	104318011 104318023 104318062	QJ01AA02	Sistemico
		Doxylin 100 powder for use in drinking watermilk for calves and pigs Doxylin 1000 mgg polvere per lutilizzo in acqua da berenel latte per bovini e suini	Doxycycline hyclate	Polvere per somministrazione in acqua da bere/latte	Bovini (vitello), Suino		Somministrazione in acqua da bere/latte	Bovini (vitelli): carne 14 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Suino: carne 8 giorni (somministrazione in acqua da bere)	104674015 104674027 104674039 104674041 104674054	QJ01AA02	Sistemico
		Doxylin 433 mgg Powder for Use in Drinking Water for Chickens and Turkeys Doxylin CT WSP 500 mgg polvere per somministrazione in acqua da bere per polli e tacchini	Doxycycline hyclate	Polvere per somministrazione in acqua da bere	Tacchino, Polli		Somministrazione in acqua da bere	Pollo: carne 5 giorni (somministrazione in acqua da bere) Uccelli (tacchino): carne 12 giorni (somministrazione in acqua da bere)	104762012 104762024 104762036 104762048	QJ01AA02	Sistemico
		Doxylin 50 WSP Doxylin 50 WSP polvere per soluzione orale nei vitelli preruminanti suini polli	Doxycycline hyclate	Polvere per soluzione orale	Polli, Bovini (vitello), Suino		Uso orale	Bovini (bovini pre ruminanti): carne 7 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Pollo: carne 5 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino: carne 8 giorni (somministrazione in acqua da bere)	105772014 105772026 105772038 105772040	QJ01AA02	Sistemico
		DOXYMIX BMP 100 mgg premiscela per alimenti medicamentosi per suini dopo lo svezzamento	Doxycycline	Premiscela per alimenti medicamentosi	Suino (suinetto)		Uso orale	Suino: carne 7 giorni (uso orale)	105609010	QJ01AA02	Sistemico
		DOXYPREX 100 MGG DOXYPREX 100 mgg Premix for medicated feeding stuff for pigs after weaning	Doxycycline hyclate	Premiscela per alimenti medicamentosi	Suini (da ingrasso)		Somministrazione con il mangime	Suino: carne 7 giorni (somministrazione con il mangime)	103814012 103814024 103814036 103814048	QJ01AA02	Sistemico
		DOXYSOL 1000 gkg polvere per soluzione orale per polli da carne tacchini suini e vitelli	Doxycycline hydrochloride	Polvere per soluzione orale	Suino, Tacchino, Pollo (pollo da carne), Bovini (vitello)		Uso orale	Bovini (vitelli): carne 13 giorni (somministrazione in acqua da bere); carne 21 giorni (somministrazione in acqua da bere) Pollo: carne 4 giorni (somministrazione in acqua da bere); carne 5 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino: carne 4 giorni (somministrazione in acqua da bere) Uccelli (tacchino): carne 10 giorni (somministrazione in acqua da bere)	103946012 103946024 103946036 103946048	QJ01AA02	Sistemico
		DOXYSOL 200 gkg polvere per soluzione orale per polli da carne tacchini suini e vitelli	Doxycycline hydrochloride	Polvere per soluzione orale	Pollo (pollo da carne), Tacchino, Suino, Bovini (vitello)		Uso orale	Bovini (vitelli): carne 13 giorni (somministrazione in acqua da bere); carne 21 giorni (somministrazione in acqua da bere) Pollo: carne 4 giorni (somministrazione in acqua da bere); carne 5 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino: carne 4 giorni (somministrazione in acqua da bere) Uccelli (tacchino): carne 10 giorni (somministrazione in acqua da bere)	103946012 103946024 103946036 103946048	QJ01AA02	Sistemico
		Doxytab vet Flav 200 mg Tablets for dogs Doxytab vet Flav Compresse da 200 mg per cani	Doxycycline hyclate	Compressa		Cane	Uso orale		105433015 105433027 105433039 105433041 105433054 105433066 105433078 105433080 105433092 105433104 105433116 105433128 105433130 105433142 105433155 105433167	QJ01AA02	Sistemico

Categoria D - PRUDENZA

Classe di antibiotici	Molecola	Specialità veterinaria	Sostanze attive	Forma farmaceutica	Specie DPA	Specie non DPA	Vie di somministrazione	Tempi di attesa	Codice AIC	ATCvet	Uso (da ATCvet)
TETRACICLINE	doxiciclina	Doxytab vet Flav 400 mg Tablets for dogs Doxytab vet Flav Compresse da 400 mg per cani	Doxycycline hyclate	Compressa		Cane	Uso orale		105433015 105433027 105433039 105433041 105433054 105433066 105433078 105433080 105433092 105433104 105433116 105433128 105433130 105433142 105433155 105433167	QJ01AA02	Sistemico
		Doxytab vet Flav 50 mg Tablets for dogs and cats Doxytab vet Flav Compresse da 50 mg per cani e gatti	Doxycycline hyclate	Compressa		Cane, Gatto	Uso orale		105433015 105433027 105433039 105433041 105433054 105433066 105433078 105433080 105433092 105433104 105433116 105433128 105433130 105433142 105433155 105433167	QJ01AA02	Sistemico
		DOXYTAB VET FLAV COMPRESSE PER CANI E GATTI Doxytab vet Flav 15 mg Tablets for dogs and cats	Doxycycline hyclate	Compressa		Cane, Gatto	Uso orale		105433015 105433027 105433039 105433041 105433054 105433066 105433078 105433080 105433092 105433104 105433116 105433128 105433130 105433142 105433155 105433167	QJ01AA02	Sistemico
		DoxyvetoC polvere orale per suini e polli	Doxycycline hyclate	Polvere orale	Polli, Suino		Uso orale	Pollo (broiler): carne 6 giorni (uso orale) Suino: carne 4 giorni (uso orale)	103807018 103807020 103807032 103807044 103807057	QJ01AA02	Sistemico
		FATROCICLINA 100 mgg polvere per soluzione orale per suini e vitelli	Doxycycline hyclate	Polvere per soluzione orale	Suino, Bovini (vitello)		Uso orale	Bovini (vitelli): carne 6 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Suino: carne 2 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte)	103748012 103748024 103748036 103748048 103748051 103748063 103748075	QJ01AA02	Sistemico
		FATROCICLINA 300 mgg polvere per soluzione orale per suini e vitelli	Doxycycline hyclate	Polvere per soluzione orale	Suino, Bovini (vitello)		Uso orale	Bovini (vitelli): carne 6 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Suino: carne 2 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte)	103748012 103748024 103748036 103748048 103748051 103748063 103748075	QJ01AA02	Sistemico
		GALLUDOXX GalluDoxx 500 mgg powder for use in drinking watermilk for calves chickens and turkeys	Doxycycline hyclate	Polvere per somministrazione in acqua da bere/latte	Polli, Tacchino, Bovini (vitello)		Somministrazione in acqua da bere/latte	Bovini (vitelli da latte): carne 28 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Pollo: carne 14 giorni (somministrazione in acqua da bere) Uccelli (tacchino): carne 28 giorni (somministrazione in acqua da bere)	104987019 104987021	QJ01AA02	Sistemico
		HYDRODOXX 500 MGG HydroDoxx 500 mgg powder for use in drinking water for chickens and pigs	Doxycycline hyclate	Polvere per somministrazione in acqua da bere	Suini (da ingrasso), Pollo (pollo da carne)		Somministrazione in acqua da bere	Pollo (broiler): carne 6 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino (suini da ingrasso): carne 6 giorni (somministrazione in acqua da bere)	104082045 104082058	QJ01AA02	Sistemico
		ORALCICLINA 200 MGML	Doxycycline	Soluzione orale	Pollo (pollo da carne), Suino		Somministrazione in acqua da bere	Pollo (broiler): carne 7 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino: carne 6 giorni (somministrazione in acqua da bere)	104389010	QJ01AA02	Sistemico

Categoria D - PRUDENZA

Classe di antibiotici	Molecola	Specialità veterinaria	Sostanze attive	Forma farmaceutica	Specie DPA	Specie non DPA	Vie di somministrazione	Tempi di attesa	Codice AIC	ATCvet	Uso (da ATCvet)
TETRACICLINE	doxiciclina	POWDOX 500 MGG Powdox 500 mgg	Doxycycline hyclate	Polvere per somministrazione in acqua da bere	Pollo (pollo da riproduzione), Pollo (pollo da carne), Suini (da ingrasso), Tacchino da riproduzione, Tacchino (da carne)		Somministrazione in acqua da bere	Pollo (broiler): carne 5 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte); organi 5 giorni (somministrazione in acqua da bere) Pollo: carne 5 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino (suini da ingrasso): carne 4 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte, somministrazione in acqua da bere); organi 4 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte, somministrazione in acqua da bere) Uccelli (tacchino): carne 12 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte, somministrazione in acqua da bere); organi 12 giorni (somministrazione in acqua da bere)	104400015 104400027	QJ01AA02	Sistemico
		PULMODOX DOXYCYCLINE 50 PIG PREMIX FOR MEDICATED FEEDING STUFF	Doxycycline hyclate	Premiscela per alimenti medicamentosi	Suino		Somministrazione con il mangime	Suino: carne 7 giorni (somministrazione con il mangime); organi 7 giorni (somministrazione con il mangime)	103117014 103117026 103117038	QJ01AA02	Sistemico
		RONAXAN 100 MG TABLETS FOR DOGS AND CATS Ronaxan 100 mg compresse per cani e gatti	Doxycycline hyclate	Compressa		Cane, Gatto	Uso orale		100327016 100327028 100327030	QJ01AA02	Sistemico
		RONAXAN 20 MG TABLETS FOR DOGS AND CATS Ronaxan 20 mg compresse per cani e gatti	Doxycycline hyclate	Compressa		Cane, Gatto	Uso orale		100327016 100327028 100327030	QJ01AA02	Sistemico
		RONAXAN 250 MG TABLETS FOR DOGS Ronaxan 250 mg compresse per cani	Doxycycline hyclate	Compressa		Cane	Uso orale		100327016 100327028 100327030	QJ01AA02	Sistemico
		SOLUDOX 500 MGG PER POLLI E SUINI Soludox 500 mgg powder for use in drinking water for pigs and chickens	Doxycycline hyclate	Polvere per somministrazione in acqua da bere	Polli, Suino		Somministrazione in acqua da bere	Pollo (broiler): carne 9 giorni (alto dosaggio) (somministrazione in acqua da bere) Pollo: carne 3 giorni (basso dosaggio) (somministrazione in acqua da bere/latte) Suino: carne 4 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte)	104203017 104203029 104203031 104203043	QJ01AA02	Sistemico
		SOLUDOX PER TACCHINI Soludox 500 mgg powder for use in drinking water for turkeys	Doxycycline hyclate	Polvere per somministrazione in acqua da bere	Tacchino		Somministrazione in acqua da bere	Uccelli (tacchino): carne 12 giorni (somministrazione in acqua da bere)	104455011 104455023	QJ01AA02	Sistemico
		Vibravet 100 mg compresse per cani e gatti	Doxycycline	Compressa		Cane, Gatto	Uso orale		100105030 100105042 100105055 100105067	QJ01AA02	Sistemico
		Vibravet 100 mgg pasta per uso orale per cani e gatti	Doxycycline	Pasta per uso orale		Cane, Gatto	Uso orale		100105030 100105042 100105055 100105067	QJ01AA02	Sistemico
		Vibravet 200 mg compresse per cani e gatti	Doxycycline	Compressa		Cane, Gatto	Uso orale		100105030 100105042 100105055 100105067	QJ01AA02	Sistemico
	oxitetraciclina	ALAMYCIN LA 300	Oxytetracycline	Soluzione iniettabile	Bovini, Ovino, Suino		Uso intramuscolare	Bovini: carne 35 giorni (uso intramuscolare) Bovini: latte 10 giorni (uso intramuscolare) Ovini: carne 28 giorni (uso intramuscolare); latte 8 giorni (uso intramuscolare) Suino: carne 28 giorni (uso intramuscolare)	102807017 102807029	QJ01AA06	Sistemico
		Anprociclina 200 200 gkg premiscela per alimenti medicamentosi per suini conigli e pesci	Oxytetracycline dihydrate	Premiscela per alimenti medicamentosi	Coniglio, Pesce, Suino		Somministrazione con il mangime	Conigli: carne 12 giorni (somministrazione con il mangime) Pesci: carne 37 giorni (somministrazione con il mangime) Suino: carne 14 giorni (somministrazione con il mangime)	102777012 102777024	QJ01AA06	Sistemico
		AQUACEN OXITETRACICLINA OSSITETRACICLINA CENAVISA	Oxytetracycline hydrochloride	Premiscela per alimenti medicamentosi	Salmonidi, Rombo, Spigola, Orata, Anguilla, Carpa		Somministrazione con il mangime	Pesci (anguilla europea): carne 300 gradi giorno (uso orale) Pesci (carpa): carne 300 gradi giorno (uso orale) Pesci (orata): carne 300 gradi giorno (uso orale) Pesci (rombi): carne 300 gradi giorno (uso orale) Pesci (salmonidi): carne 300 gradi giorno (uso orale) Pesci (spigola): carne 300 gradi giorno (uso orale)	104815016 104815028	QJ01AA06	Sistemico
		CALIMICINA 200 CL 200 mgml soluzione iniettabile per bovini suini ovini e caprini	Oxytetracycline	Soluzione iniettabile	Bovini, Caprino, Ovino, Suino		Uso intramuscolare; Uso endovenoso; Uso sottocutaneo	Bovini: carne 42 giorni (uso intramuscolare, uso endovenoso, uso sottocutaneo); latte 288 ore (uso intramuscolare, uso endovenoso, uso sottocutaneo) Caprini: carne 42 giorni (uso intramuscolare, uso endovenoso, uso sottocutaneo); latte 288 ore (uso intramuscolare, uso endovenoso, uso sottocutaneo) Ovini: carne 42 giorni (uso intramuscolare, uso endovenoso, uso sottocutaneo); latte 288 ore (uso intramuscolare, uso endovenoso, uso sottocutaneo) Suino: carne 42 giorni (uso intramuscolare)	100039027 100039039	QJ01AA06	Sistemico
		Cyclofin 300 mgml + 20 mgml solution for injection for cattle Cyclofin 300 mgml + 20 mgml soluzione iniettabile per bovini	Flunixin + Oxytetracycline	Soluzione iniettabile	Bovini		Uso intramuscolare	Bovini: carne 28 giorni (uso intramuscolare)	105704011	QJ01AA56	Sistemico
		DUPHACICLINA 300 LA	Oxytetracycline	Soluzione iniettabile	Ovino, Suino, Bovini		Uso intramuscolare	Bovini: carne 28 giorni (uso intramuscolare); carne 35 giorni (alto dosaggio) (uso intramuscolare, uso sottocutaneo); latte 8 giorni (uso intramuscolare) Ovini: carne 28 giorni (uso intramuscolare); carne 28 giorni (alto dosaggio) (uso intramuscolare); latte 8 giorni (uso intramuscolare) Suino: carne 14 giorni (uso intramuscolare); carne 28 giorni (alto dosaggio) (uso intramuscolare)	100326014 100326026	QJ01AA06	Sistemico
		DURACICLINA	Oxytetracycline	Soluzione iniettabile	Bovini, Ovino, Suino		Uso intramuscolare	Bovini: carne 35 giorni (uso intramuscolare); latte 8 giorni (uso intramuscolare) Ovini: carne 22 giorni (uso intramuscolare); latte 8 giorni (uso intramuscolare) Suino: carne 22 giorni (uso intramuscolare)	102251016 102251028	QJ01AA06	Sistemico
		ENDOSPRAY schiuma endouterina per bovine	Sulfamonomethoxine sodium + Oxytetracycline dihydrate	Schiuma intrauterina	Bovini		Uso intrauterino	Bovini: carne 20 giorni (uso intrauterino); latte 0 giorni (uso intrauterino)	101950018	QG01AA99	Ginecologico

Categoria D - PRUDENZA

Classe di antibiotici	Molecola	Specialità veterinaria	Sostanze attive	Forma farmaceutica	Specie DPA	Specie non DPA	Vie di somministrazione	Tempi di attesa	Codice AIC	ATCvet	Uso (da ATCvet)
TETRACICLINE	oxitetraciclina	ENGEMICINA DD	Oxytetracycline	Soluzione iniettabile	Bovini, Ovino, Suino	Cane, Cavallo Non DPA, Gatto	Uso intramuscolare; Uso endovenoso; Uso sottocutaneo	Bovini: carne 27 giorni (alto dosaggio) (uso intramuscolare); carne 39 giorni (basso dosaggio) (uso intramuscolare, uso endovenoso); latte 120 ore (alto dosaggio) (uso intramuscolare); latte 96 ore (basso dosaggio) (uso intramuscolare, uso endovenoso) Ovini: carne 16 giorni (basso dosaggio) (uso intramuscolare, uso endovenoso); carne 18 giorni (alto dosaggio) (uso intramuscolare); latte 120 giorni (alto dosaggio) (uso intramuscolare); latte 120 ore (uso intramuscolare); latte 120 ore (alto dosaggio) (uso intramuscolare); latte 120 ore (basso dosaggio) (uso intramuscolare, uso endovenoso) Suino: carne 13 giorni (basso dosaggio) (uso intramuscolare); carne 9 giorni (alto dosaggio) (uso intramuscolare)	100024049 100024052 100024064 100024076 100024088 100024090 100024102 100024114	QJ01AA06	Sistemico
		Engemicina Spray 25 mgml sospensione spray per uso cutaneo per bovini ovini e suini Engemycin Spray 25mgmL cutaneous spray suspension for cattle sheep and pigs	Oxytetracycline hydrochloride	Spray cutaneo, sospensione	Bovini, Ovino, Suino		Uso cutaneo	Bovini: carne 0 giorni (uso cutaneo); latte 0 giorni (uso cutaneo) Ovini: carne 0 giorni (uso cutaneo); latte 0 giorni (uso cutaneo) Suino: carne 0 giorni (uso cutaneo)	104103015	QD06AA03	Dermatologico
		FILOXI SOL	Oxytetracycline	Polvere orale	Suino, Bovino (vitello lattante)		Somministrazione in acqua da bere/latte	Bovini (vitelli da latte): carne 20 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Suino: carne 18 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte)	102650025	QJ01AA06	Sistemico
		FURAZOLIDONE 2 + OSSITETRACICLINA 2 FORMEVET	Oxytetracycline + Furazolidone	Polvere per soluzione orale		Colombo, Uccelli da gabbia e da voliera	Somministrazione in acqua da bere		103449017	QJ01RA90	Sistemico
		LABIMYCIN LA 300 mgml SOLUTION FOR INJECTION	Oxytetracycline dihydrate	Soluzione iniettabile	Suino, Bovini, Ovino		Uso intramuscolare	Bovini: carne 35 giorni (uso intramuscolare); latte 10 giorni (uso intramuscolare) Ovini: carne 35 giorni (uso intramuscolare); latte 9 giorni (uso intramuscolare) Suino: carne 28 giorni (uso intramuscolare)	105842013 105842025 105842037	QJ01AA06	Sistemico
		NEO SPRAY CAF 2315 mgml spray cutaneo sospensione per bovini ovini e suini	Oxytetracycline hydrochloride	Spray cutaneo, sospensione	Bovini, Ovino, Suino		Uso cutaneo	Bovini: carne 0 giorni (spray); latte 0 ore (spray) Ovini: carne 0 giorni (spray); latte 0 ore (spray) Suino: carne 0 giorni (spray)	100357019	QD06AA03	Dermatologico
		OSSIBIOTIC PREMIX 200 gkg ossitetraciclina premiscela per mangimi medicati per suini conigli e pesci	Oxytetracycline	Premiscela per alimenti medicamentosi	Suino, Coniglio, Pesce		Somministrazione con il mangime	Conigli: carne 12 giorni (somministrazione con il mangime) Pesci: carne 500 gradi giorno (somministrazione con il mangime) Suino: carne 4 giorni (somministrazione con il mangime)	102773013 102773025	QJ01AA06	Sistemico
		OSSIBIOTIC PREMIX 400 gkg ossitetraciclina premiscela per mangimi medicati per suini conigli e pesci	Oxytetracycline	Premiscela per alimenti medicamentosi	Suino, Coniglio, Pesce		Somministrazione con il mangime	Conigli: carne 12 giorni (somministrazione con il mangime) Pesci: carne 500 gradi giorno (somministrazione con il mangime) Suino: carne 4 giorni (somministrazione con il mangime)	102773013 102773025	QJ01AA06	Sistemico
		OSSINOVA 200 mgg polvere orale per uso in acqua da berelatte per vitelli da latte suini polli da carne galline ovaiole tacchini	Oxytetracycline hydrochloride	Polvere per somministrazione in acqua da bere/latte	Bovino (vitello lattante), Suino, Pollo (pollo da carne), Pollo (gallina ovaiola), Tacchino		Uso orale	Bovini (vitelli da latte): carne 20 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Bovini (vitelli): carne 20 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Pollo (broiler): carne 7 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Pollo (galline ovaiole): uova 5 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Suino: carne 12 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Uccelli (tacchino): carne 12 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte)	104401017 104401029 104401031 104401043	QJ01AA06	Sistemico
		OSSINOVA 800 mgg polvere orale per uso in acqua da berelatte per vitelli da latte suini polli da carne galline ovaiole tacchini	Oxytetracycline	Polvere per somministrazione in acqua da bere/latte	Bovino (vitello lattante), Suino, Pollo (pollo da carne), Pollo (gallina ovaiola), Tacchino		Uso orale	Bovini (vitelli da latte): carne 20 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Bovini (vitelli): carne 20 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Pollo (broiler): carne 7 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Pollo (galline ovaiole): uova 5 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Suino: carne 12 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Uccelli (tacchino): carne 12 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte)	104401017 104401029 104401031 104401043	QJ01AA06	Sistemico
		OSSITETRA 200 PREMIX	Oxytetracycline	Premiscela per alimenti medicamentosi	Quaglia, Anatra, Faraona, Fagiano, Coniglio, Pesce, Suino		Somministrazione con il mangime	Conigli: carne 12 giorni (somministrazione con il mangime) Pesci: carne 500 gradi giorno (somministrazione con il mangime) Suino: carne 10 giorni (somministrazione con il mangime) Uccelli (anatre): carne 12 giorni (somministrazione con il mangime) Uccelli (fagiani): carne 12 giorni (somministrazione con il mangime) Uccelli (faraone): carne 12 giorni (somministrazione con il mangime) Uccelli (quaglie): carne 8 giorni (somministrazione con il mangime)	102651039 102651041 102651054 102651066	QJ01AA06	Sistemico
		Ossitetraciclina 20 TREI 200 mgg polvere per uso in acqua da bere per vitelli da latte suini polli da carne tacchini galline ovaiole e conigli	Oxytetracycline	Polvere per somministrazione in acqua da bere	Bovino (vitello lattante), Suino, Pollo (pollo da carne), Pollo (gallina ovaiola), Tacchino, Coniglio		Somministrazione in acqua da bere	Bovini (vitelli da latte): carne 13 giorni (somministrazione in acqua da bere, somministrazione in acqua da bere/latte) Conigli: carne 12 giorni (somministrazione in acqua da bere) Pollo (broiler): carne 8 giorni (somministrazione in acqua da bere) Pollo (galline ovaiole): uova 5 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino: carne 9 giorni (somministrazione in acqua da bere, somministrazione in acqua da bere/latte) Uccelli (tacchino): carne 9 giorni (somministrazione in acqua da bere)	102931019 102931021	QJ01AA06	Sistemico
		Ossitetraciclina 20 Chemifarma 200 mgg Polvere solubile per soluzione orale per polli da carne tacchini galline ovaiole conigli suini vitelli da latte	Oxytetracycline	Polvere per somministrazione in acqua da bere/latte	Pollo (pollo da carne), Tacchino, Pollo (gallina ovaiola), Suino, Coniglio, Bovino (vitello lattante)		Somministrazione in acqua da bere/latte	Bovini (vitelli da latte): carne 20 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Conigli: carne 12 giorni (somministrazione in acqua da bere) Pollo (broiler): carne 7 giorni (somministrazione in acqua da bere) Pollo (galline ovaiole): uova 5 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino: carne 12 giorni (somministrazione in acqua da bere) Uccelli (tacchino): carne 12 giorni (somministrazione in acqua da bere)	102776010 102776022 102776034	QJ01AA06	Sistemico
		OSSITETRACICLINA 20 DOXAL ITALIA	Oxytetracycline	Polvere orale	Pollo (gallina ovaiola), Pollo (pollo da carne)		Uso orale	Pollo (broiler): carne 7 giorni (uso orale) Pollo (galline ovaiole): carne 7 giorni (uso orale); uova 5 giorni (uso orale)	102758012	QJ01AA06	Sistemico

Categoria D - PRUDENZA

Classe di antibiotici	Molecola	Specialità veterinaria	Sostanze attive	Forma farmaceutica	Specie DPA	Specie non DPA	Vie di somministrazione	Tempi di attesa	Codice AIC	ATCvet	Uso (da ATCvet)
TETRACICLINE	oxitetraciclina	Ossitetraciclina 20 liquido Chemifarma 200 mgg Soluzione per uso orale per polli da carne tacchini galline ovaiole conigli suini vitelli da latte	Oxytetracycline	Soluzione orale	Tacchino, Pollo (gallina ovaiola), Pollo (pollo da carne), Coniglio, Suino, Bovino (vitello lattante)		Somministrazione in acqua da bere	Bovini (vitelli da latte): carne 20 giorni (somministrazione in acqua da bere) Conigli: carne 12 giorni (somministrazione in acqua da bere) Pollo (broiler): carne 9 giorni (somministrazione in acqua da bere) Pollo (galline ovaiole): uova 5 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino: carne 18 giorni (somministrazione in acqua da bere) Uccelli (tacchino): carne 12 giorni (somministrazione in acqua da bere)	102775018 102775020 102775032 102775044	QJ01AA06	Sistemico
		OSSITETRACICLINA 20 LIQUIDO UNIONE COMMERCIALE LOMBARDA	Oxytetracycline	Soluzione orale	Tacchino, Pollo (gallina ovaiola), Pollo (pollo da carne), Coniglio, Suino, Bovino (vitello lattante), Bovini (vitello)		Uso orale; Somministrazione in acqua da bere	Bovini (vitelli da latte): carne 24 giorni (uso orale) Bovini (vitelli): carne 24 giorni (somministrazione in acqua da bere) Conigli: carne 12 giorni (uso orale) Pollo (broiler): carne 8 giorni (uso orale) Pollo (galline ovaiole): uova 5 giorni (uso orale) Suino: carne 18 giorni (uso orale) Uccelli (tacchino): carne 12 giorni (uso orale)	103382014 103382026	QJ01AA06	Sistemico
		Ossitetraciclina 50 TREI 500 mgg polvere per uso in acqua da bere per polli da carne e tacchini	Oxytetracycline	Polvere per somministrazione in acqua da bere	Tacchino, Pollo (pollo da carne)		Somministrazione in acqua da bere	Pollo (broiler): carne 8 giorni (somministrazione in acqua da bere) Uccelli (tacchino): carne 9 giorni (somministrazione in acqua da bere)	102605019 102605021	QJ01AA06	Sistemico
		OXI 50 SUPERSOL 500 mgg Polvere per soluzione orale	Oxytetracycline hydrochloride	Polvere orale	Suino, Quaglia, Tacchino, Pollo (gallina ovaiola), Pollo (pollo da carne), Anatra, Oca, Faraona, Fagiano, Coniglio		Somministrazione in acqua da bere/latte; Somministrazione in acqua da bere	Conigli: carne 7 giorni (somministrazione in acqua da bere) Pollo (broiler): carne 7 giorni (somministrazione in acqua da bere) Pollo (galline ovaiole): uova 0 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino: carne 7 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Uccelli (anatre): carne 7 giorni (somministrazione in acqua da bere) Uccelli (fagiani): carne 7 giorni (somministrazione in acqua da bere) Uccelli (faraone): carne 7 giorni (somministrazione in acqua da bere) Uccelli (oche): carne 7 giorni (somministrazione in acqua da bere) Uccelli (quaglie): carne 7 giorni (somministrazione in acqua da bere) Uccelli (tacchino): carne 7 giorni (somministrazione in acqua da bere)	104616014 104616026 104616038	QJ01AA06	Sistemico
		OXIL 20 200 mgg Soluzione orale per uso in acqua da bere per suini vitelli da latte broilers galline ovaiole tacchini e conigli	Oxytetracycline	Soluzione per somministrazione in acqua da bere	Suino, Pollo (pollo da carne), Bovino (vitello lattante), Pollo (gallina ovaiola), Tacchino, Coniglio		Somministrazione con il mangime	Bovini (vitelli da latte): carne 20 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Conigli: carne 12 giorni (somministrazione in acqua da bere); carne 7 giorni (somministrazione in acqua da bere) Pollo (broiler): carne 7 giorni (somministrazione in acqua da bere) Pollo (galline ovaiole): uova 5 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino: carne 18 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Uccelli (tacchino): carne 7 giorni (somministrazione in acqua da bere)	102652017 102652029 102652031	QJ01AA06	Sistemico
		OXITER 200 BMP	Oxytetracycline	Premiscela per alimenti medicamentosi	Coniglio, Pesce, Suino		Somministrazione con il mangime	Conigli: carne 6 giorni (somministrazione con il mangime) Pesci: carne 500 gradi giorno (somministrazione con il mangime) Suino: carne 10 giorni (somministrazione con il mangime)	102760016	QJ01AA06	Sistemico
		OXITER 500 POLVERE SOLUB IN ACQUA DA BERE	Oxytetracycline dihydrate	Polvere per soluzione orale	Tacchino, Pollo (pollo da carne)		Somministrazione in acqua da bere	Pollo (broiler): carne 5 giorni (somministrazione in acqua da bere) Uccelli (tacchino): carne 9 giorni (somministrazione in acqua da bere)	103869018	QJ01AA06	Sistemico
		OXTRA 463 mgml soluzione iniettabile per bovini equini suini ovini cani gatti conigli polli da carne e tacchini	Oxytetracycline + Oxytetracycline	Soluzione iniettabile	Bovini, Cavallo, Suino, Ovino, Coniglio, Polli, Tacchino	Cane, Gatto	Uso endovenoso; Uso intramuscolare	Bovini: carne 39 giorni (uso intramuscolare); latte 14 giorni (uso intramuscolare) Bovini: latte 14 giorni (uso intramuscolare) Bufali: carne 39 giorni (uso intramuscolare); latte 14 giorni (uso intramuscolare) Caprini: carne 39 giorni (uso intramuscolare); latte 15 giorni (uso intramuscolare) Ovini: carne 26 giorni (uso intramuscolare); latte 15 giorni (uso intramuscolare) Pollo (broiler): carne 20 giorni (uso intramuscolare) Suino: carne 16 giorni (uso sottocutaneo) Suino: carne 16 giorni (uso intramuscolare) Uccelli (tacchino): carne 30 giorni (uso intramuscolare)	101709018 101709020 101709032 101709044	QJ01AA06	Sistemico
		OXTRA DD 100 mgml solution for injection for cattle sheep pigs horses dogs and cats	Oxytetracycline hydrochloride	Soluzione iniettabile	Bovini, Ovino, Cavallo, Suino	Cane, Gatto	Uso intramuscolare; Uso endovenoso; Uso sottocutaneo	Bovini: carne 39 giorni (uso intramuscolare); latte 14 giorni (uso intramuscolare) Bovini: latte 14 giorni (uso intramuscolare) Bufali: carne 39 giorni (uso intramuscolare); latte 14 giorni (uso intramuscolare) Caprini: carne 39 giorni (uso intramuscolare); latte 15 giorni (uso intramuscolare) Ovini: carne 26 giorni (uso intramuscolare); latte 15 giorni (uso intramuscolare) Pollo (broiler): carne 20 giorni (uso intramuscolare) Suino: carne 16 giorni (uso sottocutaneo) Suino: carne 16 giorni (uso intramuscolare) Uccelli (tacchino): carne 30 giorni (uso intramuscolare)	101709018 101709020 101709032 101709044	QJ01AA06	Sistemico
		OXTRA LONG ACTING 200 mgml soluzione iniettabile per bovini bufalini ovini e caprini suini polli da carne tacchini	Oxytetracycline hydrochloride	Soluzione iniettabile	Tacchino, Bufalo, Bovini, Pollo (pollo da carne), Caprino, Ovino, Suino, Suino (suinetto)		Uso intramuscolare; Uso sottocutaneo	Bovini: carne 39 giorni (uso intramuscolare); latte 14 giorni (uso intramuscolare) Bovini: latte 14 giorni (uso intramuscolare) Bufali: carne 39 giorni (uso intramuscolare); latte 14 giorni (uso intramuscolare) Caprini: carne 39 giorni (uso intramuscolare); latte 15 giorni (uso intramuscolare) Ovini: carne 26 giorni (uso intramuscolare); latte 15 giorni (uso intramuscolare) Pollo (broiler): carne 20 giorni (uso intramuscolare) Suino: carne 16 giorni (uso sottocutaneo) Suino: carne 16 giorni (uso intramuscolare) Uccelli (tacchino): carne 30 giorni (uso intramuscolare)	101709018 101709020 101709032 101709044	QJ01AA06	Sistemico
		OXTRA MV10 927 mgml soluzione iniettabile per bovini equini suini ovini	Oxytetracycline hydrochloride	Soluzione iniettabile	Bovini, Cavallo, Suino, Ovino		Uso endovenoso; Uso intramuscolare	Bovini: carne 39 giorni (uso intramuscolare); latte 14 giorni (uso intramuscolare) Bovini: latte 14 giorni (uso intramuscolare) Bufali: carne 39 giorni (uso intramuscolare); latte 14 giorni (uso intramuscolare) Caprini: carne 39 giorni (uso intramuscolare); latte 15 giorni (uso intramuscolare) Ovini: carne 26 giorni (uso intramuscolare); latte 15 giorni (uso intramuscolare) Pollo (broiler): carne 20 giorni (uso intramuscolare) Suino: carne 16 giorni (uso sottocutaneo) Suino: carne 16 giorni (uso intramuscolare) Uccelli (tacchino): carne 30 giorni (uso intramuscolare)	101709018 101709020 101709032 101709044	QJ01AA06	Sistemico

Categoria D - PRUDENZA

Classe di antibiotici	Molecola	Specialità veterinaria	Sostanze attive	Forma farmaceutica	Specie DPA	Specie non DPA	Vie di somministrazione	Tempi di attesa	Codice AIC	ATCvet	Uso (da ATCvet)
TETRACICLINE	oxitetraciclina	OXTRA PESSARI EFFERVESCENTI ossitetraciclina 1 g compresse intrauterine per bovine	Oxytetracycline	Compressa effervescente vaginale	Bovini		Uso intrauterino	Bovini: carne 10 giorni (uso intrauterino); latte 84 ore (uso intrauterino)	102334012 102334024 102334036	QG51AA01	Intrauterino
		OXY TF LONG ACTING	Oxytetracycline	Soluzione iniettabile	Bovini, Suino		Uso intramuscolare	Bovini: carne 35 giorni (uso intramuscolare); latte 8 giorni (uso intramuscolare) Bovini (bovini da carne): carne 35 giorni (uso intramuscolare) Suino: carne 30 giorni (uso intramuscolare)	101436018 101436020 101436032	QJ01AA06	Sistemico
		OXYGAN 500 mgg POWDER FOR USE IN DRINKING WATER OXYGAN 500 mgg polvere per uso in acqua da bere	Oxytetracycline	Polvere per somministrazione in acqua da bere	Bovini (vitello), Ovino (agnello), Capra (capretto), Suino, Coniglio, Pollo (gallina ovaiola), Anatra, Tacchino, Pollo (pollo da carne)		Somministrazione in acqua da bere	Bovini (vitelli): carne 7 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Caprini: carne 7 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Caprini: carne 7 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Conigli: carne 1 giorni (somministrazione in acqua da bere, somministrazione in acqua da bere/latte) Ovini (agnelli): carne 3 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Pollo (broiler): carne 3 giorni (somministrazione in acqua da bere); uova 0 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino: carne 2 giorni (somministrazione in acqua da bere)	105445011 105445023	QJ01AA06	Sistemico
		PAN TERRAMICINA	Oxytetracycline	Soluzione iniettabile	Cavallo, Tacchino, Pollo (pollo da carne), Polli, Bovini	Cane, Gatto	Uso oftalmico; Uso intramuscolare; Uso endovenoso; Uso sottocutaneo; Uso cutaneo; Uso intrauterino	Bovini: carne 4 giorni (uso intrauterino); latte 12 ore (uso intrauterino) Equidi (cavallo): carne 20 giorni (uso cutaneo, uso endovenoso, uso intramuscolare, uso oftalmico, uso sottocutaneo) Pollo (broiler): carne 15 giorni (uso sottocutaneo) Pollo: carne 15 giorni (uso sottocutaneo) Uccelli (tacchino): carne 15 giorni (uso sottocutaneo)	100087016 100087028 100087030	QJ01AA06	Sistemico
		QALICICLINA	Oxytetracycline	Polvere per somministrazione in acqua da bere	Tacchino, Pollo (gallina ovaiola), Pollo (pollo da carne), Coniglio, Suini (da ingrasso), Bovino (vitello lattante)		Somministrazione in acqua da bere	Bovini (vitelli da latte): carne 20 giorni (somministrazione in acqua da bere) Conigli: carne 12 giorni (somministrazione in acqua da bere) Pollo (broiler): carne 8 giorni (somministrazione in acqua da bere) Pollo (galline ovaiole): uova 5 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino (suini da ingrasso): carne 18 giorni (somministrazione in acqua da bere) Uccelli (tacchino): carne 12 giorni (somministrazione in acqua da bere)	102654011 102654023	QJ01AA06	Sistemico
		TERRALON 20 LA 200 mgml soluzione iniettabile per bovini suini ovini e caprini	Oxytetracycline	Soluzione iniettabile	Bovini, Caprino, Ovino, Suino		Uso intramuscolare; Uso endovenoso	Bovini: carne 42 giorni (uso intramuscolare, uso endovenoso); latte 12 giorni (uso intramuscolare, uso endovenoso); organi 42 giorni (uso intramuscolare, uso endovenoso) Caprini: carne 42 giorni (uso intramuscolare, uso endovenoso); latte 12 giorni (uso intramuscolare, uso endovenoso); organi 42 giorni (uso intramuscolare, uso endovenoso) Ovini: carne 42 giorni (uso intramuscolare, uso endovenoso); latte 12 giorni (uso intramuscolare, uso endovenoso); organi 42 giorni (uso intramuscolare, uso endovenoso) Suino: carne 42 giorni (uso intramuscolare, uso endovenoso); organi 42 giorni (uso intramuscolare, uso endovenoso)	101584011 101584023	QJ01AA06	Sistemico
		TERRAMICINA 100	Oxytetracycline	Soluzione iniettabile	Bovini, Suino, Caprino, Cavallo, Ovino		Uso intramuscolare; Uso endovenoso	Bovini: carne 31 giorni (uso intramuscolare, uso endovenoso); latte 120 ore (uso intramuscolare, uso endovenoso) Caprini: carne 28 giorni (uso intramuscolare, uso endovenoso); latte 8 giorni (uso intramuscolare, uso endovenoso) Equidi (cavallo): carne 28 giorni (uso intramuscolare, uso endovenoso) Ovini: carne 19 giorni (uso intramuscolare, uso endovenoso); latte 96 ore (uso intramuscolare, uso endovenoso) Suino: carne 40 giorni (uso intramuscolare)	100230010 100230022 100230034 100230046	QJ01AA06	Sistemico
		TERRAMICINA Long Acting 200 mgml Soluzione acquosa iniettabile per bovini bufalini ovini caprini suini polli tacchini e conigli	Oxytetracycline	Sospensione iniettabile	Bovini, Bufalo, Ovino, Caprino, Suino, Polli, Tacchino, Coniglio		Uso intramuscolare	Bovini: carne 38 giorni (uso intramuscolare); latte 168 ore (uso intramuscolare) Bufali: carne 35 giorni (uso intramuscolare); latte 15 giorni (uso intramuscolare); latte 35 giorni (uso intramuscolare) Caprini: carne 35 giorni (uso intramuscolare); latte 15 giorni (uso intramuscolare) Conigli: carne 22 giorni (uso intramuscolare, uso sottocutaneo) Ovini: carne 21 giorni (uso intramuscolare); latte 156 ore (uso intramuscolare) Pollo: carne 21 giorni (uso intramuscolare, uso sottocutaneo) Suino: carne 20 giorni (uso intramuscolare) Uccelli (tacchino): carne 21 giorni (uso intramuscolare, uso sottocutaneo)	100088018 100088020 100088032 100088044	QJ01AA06	Sistemico
		Terramicina Spray 267 mgml per uso topico soluzione alcolica per bovini ovini cani gatti e per equidi non destinati alla produzione di alimenti	Oxytetracycline hydrochloride	Spray cutaneo, soluzione	Bovini, Ovino	Cane, Gatto	Uso cutaneo	Bovini: carne 0 giorni (spray); latte 0 ore (spray) Ovini: carne 0 giorni (spray); latte 0 ore (spray)	100156013 100156025	QD06AA03	Dermatologico
	oxitetracicliina	TREPOX	Oxytetracycline	Polvere orale	Suino, Tacchino, Pollo (pollo da carne), Coniglio		Somministrazione in acqua da bere/latte; Somministrazione in acqua da bere	Conigli: carne 9 giorni (somministrazione in acqua da bere) Pollo (broiler): carne 6 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino: carne 8 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Uccelli (tacchino): carne 6 giorni (somministrazione in acqua da bere)	105048019	QJ01AA06	Sistemico
TETRACICLINE	tetraciclina	CANDIOANTIBIOTICO	Menadione + Thiamine hydrochloride + TETRACYCLINE HYDROCHLORIDE PH. EUR. + TETRACYCLINE HYDROCHLORIDE PH. EUR. + Sulfaquinoxaline sodium	Polvere orale		Uccelli da gabbia e da voliera	Somministrazione con il mangime		102977016 102977028 102977030	QJ01RA	Sistemico
		UTERTAB Utertab 2000 mg intrauterine tablet for cattle	Tetracycline hydrochloride	Compressa intrauterina	Bovini (vacca in lattazione)		Uso intrauterino	Bovini (bovine /vacche in lattazione): carne 10 giorni (uso intrauterino); latte 96 ore (uso intrauterino)	105161018 105161020	QG51AA02	Intrauterino
		BIOCILLINA	Amoxicillin trihydrate + Cloxacillin hemibenzathine	Sospensione iniettabile	Bovini		Uso intramuscolare	Bovini: carne 35 giorni (uso intramuscolare); latte 60 ore (uso intramuscolare)	102003011 102003023	QJ01CR50	Sistemico
		BOVIX MICROCLOX EDC 600 mg Intramammary Suspension BOVIX MICROCLOX EDC 600 mg sospensione intramammaria	Cloxacillin	Sospensione intramammaria	Bovini (vacca da latte in asciutta)		Per uso intramammario	Non indicato nell'elenco ministeriale: vedi RCP	105790012 105790024	QJ51CF02	Intramammario

Categoria D - PRUDENZA

Classe di antibiotici	Molecola	Specialità veterinaria	Sostanze attive	Forma farmaceutica	Specie DPA	Specie non DPA	Vie di somministrazione	Tempi di attesa	Codice AIC	ATCvet	Uso (da ATCvet)
PENICILLINE ANTI-STAFILOCOCCICHE (PENICILLINE BETA-LATTAMASI RESISTENTI)	cloxacillina	Cloxadry 600 mg + 300 mg Sospensione intramammaria per bovine da latte in asciutta	Cloxacillin + Ampicillin	Sospensione intramammaria	Bovini (vacca da latte in asciutta)		Per uso intramammario	Bovini: carne 28 giorni (uso intramammario); latte 5 giorni (uso intramammario)	102593011	QJ51CR50	Intramammario
		CLOXALENE ASCIUTTA 100 MGML POMATA INTRAMAMMARIA PER BOVINE IN ASCIUTTA	Cloxacillin	Pomata intramammaria	Bovini (vacca in asciutta)		Per uso intramammario	Bovini (bovine/vacche in asciutta): carne 42 giorni (uso intramammario); carne 72 ore (uso intramammario); latte 72 ore (uso intramammario)	101729010 101729034 101729073	QJ51CF02	Intramammario
		CLOXALENE MAX 600 MG + 300 MG POMATA INTRAMAMMARIA PER BOVINE IN ASCIUTTA	Cloxacillin hemibenzathine + Ampicillin trihydrate	Pomata intramammaria	Bovini (vacca in asciutta)		Per uso intramammario	Bovini (bovine/vacche in asciutta): carne 8 giorni (uso intramammario); latte 0 mungiture (uso intramammario); latte 0 ore (uso intramammario)	102832019 102832021 102832033 102832045	QJ51CR50	Intramammario
		CLOXALENEPOMATA INTRAMAMMARIA PER BOVINE IN LATTAZIONE	Cloxacillin sodium	Pomata intramammaria	Bovini (vacca in lattazione)		Per uso intramammario	Bovini (bovine /vacche in lattazione): carne 10 giorni (uso intramammario); latte 192 ore (uso intramammario)	101720011 101720047	QJ51CF02	Intramammario
		IZOMAST pomata endomammaria per bovine in lattazione	Cloxacillin sodium + Amoxicillin sodium	Pomata intramammaria	Bovini (vacca in lattazione)		Per uso intramammario	Bovini (bovine /vacche in lattazione): carne 12 giorni (uso intramammario); latte 96 ore (uso intramammario)	102030018	QJ51RC26	Intramammario
		Orbenin Extra sospensione intramammaria per bovine in asciutta	Cloxacillin	Sospensione intramammaria	Bovini (vacca da latte in asciutta)		Per uso intramammario	Bovini (bovine/vacche in asciutta): carne 3 giorni (uso intramammario); latte 48 ore (uso intramammario) Ovini (ovine/pecore femm adulte): carne 28 giorni (uso intramammario); latte 8 giorni (uso intramammario)	101945018 101945020 101945032 101945044 101945057	QJ51CF02	Intramammario
		Orbenin Extra sospensione intramammaria per pecore in asciutta	Cloxacillin	Sospensione intramammaria	Bovini (vacca da latte in asciutta), Ovino (ovino per la produzione di latte)		Per uso intramammario	Bovini (bovine/vacche in asciutta): carne 3 giorni (uso intramammario); latte 48 ore (uso intramammario) Ovini (ovine/pecore femm adulte): carne 28 giorni (uso intramammario); latte 8 giorni (uso intramammario)	101945018 101945020 101945032 101945044 101945057	QJ51CF02	Intramammario
		Orbenin LA 200 mg intramammary suspension for lactating cattle and sheep	Cloxacillin sodium monohydrate	Sospensione intramammaria	Bovini (vacca da latte), Ovino		Per uso intramammario	Bovini: carne 7 giorni (uso intramammario); latte 96 ore (uso intramammario) Ovini: carne 7 giorni (uso intramammario)	104834015	QJ51CF02	Intramammario
		PermaWay 600 mg intramammary suspension for cattle	Cloxacillin hemibenzathine	Sospensione intramammaria	Bovini (vacca in asciutta)		Per uso intramammario	Bovini: carne 28 giorni (uso intramammario); latte 4 giorni (uso intramammario)	105478010 105478022 105478034	QJ51CF02	Intramammario
	dicloxacillina	CLOXALENE PLUS 953 mgml + 478 mgml sospensione iniettabile per bovini equini suini cani e gatti	Dicloxacillin + Ampicillin	Soluzione iniettabile	Bovini, Cavallo, Suino	Cane, Gatto	Uso intramuscolare	Bovini: carne 4 giorni (uso intramuscolare); latte 48 ore (uso intramuscolare) Equidi (cavallo): carne 14 giorni (uso intramuscolare) Suino: carne 3 giorni (uso intramuscolare)	101718056 101718068 101718082	QJ01CA51	Sistemico
		CLOXALENE PLUS pomata intramammaria per bovine in lattazione	Ampicillin sodium + Dicloxacillin sodium	Pomata intramammaria	Bovini		Per uso intramammario	Bovini (bovine /vacche in lattazione): carne 2 giorni (uso intramammario); latte 48 ore (uso intramammario, uso intramuscolare)	101718043 101718070 101718094 101718106	QJ51CR50	Intramammario
	nafcillina	Nessuna specialità veterinaria autorizzata in Italia (presente solo in associazione con antibiotici di categoria superiore: vedi Categoria C)									
PENICILLINE ANTI-STAFILOCOCCICHE (PENICILLINE BETA-LATTAMASI RESISTENTI)	oxacillina	Novocillin LC 1000 mg intramammary suspension for lactating cow	Oxacillin sodium	Sospensione intramammaria	Bovini (vacca da latte)		Per uso intramammario	Bovini: carne 6 giorni (uso intramammario); latte 144 ore (uso intramammario)	105630014 105630026 105630038	QJ51CF04	Intramammario
	benzilpenicillina benzatinica	Nessuna specialità veterinaria autorizzata in Italia (presente solo in associazione con antibiotici di categoria superiore: vedi Categoria C)									

Categoria D - PRUDENZA

Classe di antibiotici	Molecola	Specialità veterinaria	Sostanze attive	Forma farmaceutica	Specie DPA	Specie non DPA	Vie di somministrazione	Tempi di attesa	Codice AIC	ATCvet	Uso (da ATCvet)
PENICILLINE NATURALI A SPETTRO RISTRETTO (PENICILLINE SENSIBILI ALLE BETA-LATTAMASI)	fenossimetilpenicillina benzatinica	Nessuna specialità veterinaria autorizzata in Italia									
	benzilpenicillina	IZOASPERSORIO	Sulfaguanidine + Sulfanilamide + Chlortetracycline hydrochloride + Benzylpenicillin sodium	Polvere cutanea	Caprino, Bovini, Ovino, Suino	Cane, Cavallo Non DPA, Gatto	Uso cutaneo	Bovini (bovini da carne): carne 0 giorni (uso cutaneo) Bovini (bovini da latte): latte 0 giorni (uso cutaneo) Caprini: carne 0 giorni (uso cutaneo) Caprini (capre per la produzione di latte): latte 0 giorni (uso cutaneo) Ovini (ovini/pecore per prod carne): carne 0 giorni (uso cutaneo) Ovini (ovini/pecore per prod latte): latte 0 giorni (uso cutaneo) Suino (suini da ingrasso): carne 0 giorni (uso cutaneo)	102017011	QD06C	Dermatologico
	benzilpenicillina procaina	Bimprocil 300 mgml suspension for injection for cattle sheep and pigs	Benzylpenicillin procaine	Sospensione iniettabile	Bovini, Ovino, Suino		Uso intramuscolare	Bovini: carne 10 giorni (uso intramuscolare) Bovini: latte 108 ore (uso intramuscolare) Ovini: carne 4 giorni (uso intramuscolare) Suino: carne 7 giorni (uso intramuscolare)	105512014 105512026	QJ01CE09	Sistemico
		Carepen vet 600 mg intramammary suspension for lactating cows UBROPEN 600 mg sospensione intramammaria per vacche in lattazione	Benzylpenicillin (procaine) monohydrate	Sospensione intramammaria	Bovini (vacca in lattazione)		Per uso intramammario	Bovini (bovine /vacche in lattazione): carne 3 giorni (uso intramammario); latte 6 giorni (uso intramammario)	104713019 104713021 104713033 104713045 104713058	QJ51CE09	Intramammario
		DEPOCILLINA 300 mgml sospensione acquosa iniettabile per bovini ovini suini equini cani e gatti	Benzylpenicillin procaine	Sospensione iniettabile	Cavallo, Bovini, Ovino, Suino	Gatto, Cane	Uso intramuscolare; Uso sottocutaneo	Bovini: carne 5 giorni (uso intramuscolare); latte 264 ore (uso intramuscolare) Equidi (cavallo): carne 10 giorni (uso intramuscolare) Ovini: carne 4 giorni (uso intramuscolare); latte 156 ore (uso intramuscolare) Suino: carne 4 giorni (uso intramuscolare)	100044015 100044027 100044039 100044041	QJ01CE09	Sistemico
		PRIMOPEN 300 mgml suspension for injection for cattle pigs and horses	Benzylpenicillin (procaine) monohydrate	Sospensione iniettabile	Bovini, Cavallo, Suino		Uso intramuscolare	Bovini: carne 6 giorni (uso intramuscolare) Bovini: latte 4 giorni (uso intramuscolare); latte 96 ore (uso intramuscolare) Equidi (cavallo): carne 6 mesi (uso intramuscolare) Suino: carne 4 giorni (uso intramuscolare)	105444018 105444020 105444032 105444044 105444057 105444069 105444071	QJ01CE09	Sistemico
		Procactive 300 mgml Suspension for injection for cattle sheep and pigs	Benzylpenicillin (procaine) monohydrate	Sospensione iniettabile	Bovini, Ovino, Suino		Uso intramuscolare	Bovini: carne 6 giorni (basso dosaggio) (uso intramuscolare); carne 8 giorni (alto dosaggio) (uso intramuscolare); latte 96 ore (uso intramuscolare) Ovini: carne 4 giorni (basso dosaggio) (uso intramuscolare); carne 6 giorni (alto dosaggio) (uso intramuscolare); latte 156 ore (uso intramuscolare) Suino: carne 6 giorni (basso dosaggio) (uso intramuscolare); carne 8 giorni (alto dosaggio) (uso intramuscolare)	105178014 105178026	QJ01CE09	Sistemico
		Procapen 300 mgml Suspension for injection for cattle pigs and horses	Benzylpenicillin (procaine) monohydrate	Sospensione iniettabile	Bovini, Cavallo, Suino		Uso intramuscolare	Bovini: carne 14 giorni (uso intramuscolare); latte 6 giorni (uso intramuscolare) Bovini: latte 6 giorni (uso intramuscolare) Equidi (cavallo): carne 14 giorni (uso intramuscolare) Suino: carne 15 giorni (uso intramuscolare)	105339016 105339028 105339030 105339042 105339055 105339067 105339079	QJ01CE09	Sistemico
		PROCAPEN INJECTOR Procapen Injector 3g intramammary suspension for cattle	Benzylpenicillin (procaine) monohydrate	Sospensione intramammaria	Bovini (vacca da latte)		Per uso intramammario	Bovini: carne 5 giorni (uso intramammario); latte 6 giorni (uso intramammario)	104817010	QJ51CE09	Intramammario
		Procipen 300 mgml suspension for injection for cattle sheep and pigs	Benzylpenicillin procaine	Sospensione iniettabile	Bovini, Ovino, Suino		Uso intramuscolare	Non disponibile (specialità assente dall'elenco ministeriale)	Non presente nell'elenco ministeriale	QJ01CE09	Sistemico
		PRONTOCILL 300000 UIml sospensione iniettabile per bovini ovini caprini suini equini cani e gatti	Benzylpenicillin procaine	Soluzione iniettabile	Bovini, Caprino, Ovino, Suino, Cavallo	Cane, Gatto	Uso intramuscolare; Uso sottocutaneo	Bovini: carne 20 giorni (uso intramuscolare, uso sottocutaneo); latte 192 ore (uso intramuscolare, uso sottocutaneo) Caprini: carne 20 giorni (uso intramuscolare, uso sottocutaneo); latte 192 ore (uso intramuscolare, uso sottocutaneo) Equidi (cavallo): carne 20 giorni (uso intramuscolare, uso sottocutaneo) Ovini: carne 20 giorni (uso intramuscolare, uso sottocutaneo); latte 192 ore (uso intramuscolare, uso sottocutaneo) Suino: carne 20 giorni (uso intramuscolare, uso sottocutaneo)	103858015 103858027	QJ01CE09	Sistemico

Categoria D - PRUDENZA

Classe di antibiotici	Molecola	Specialità veterinaria	Sostanze attive	Forma farmaceutica	Specie DPA	Specie non DPA	Vie di somministrazione	Tempi di attesa	Codice AIC	ATCvet	Uso (da ATCvet)
PENICILLINE NATURALI A SPETTRO RISTRETTO (PENICILLINE SENSIBILI ALLE BET		TANEVEN Taneven 300 mgml suspension for injection for horses cattle sheep goats dogs and cats	Benzylpenicillin (procaine) monohydrate	Sospensione iniettabile	Bovini, Caprino, Ovino, Cavallo	Cane, Gatto	Uso sottocutaneo; Uso intramuscolare	Bovini: carne 10 giorni (uso intramuscolare, uso sottocutaneo) Bovini: latte 5 giorni (uso intramuscolare, uso sottocutaneo) Caprini: carne 10 giorni (uso intramuscolare, uso sottocutaneo); latte 5 giorni (uso intramuscolare, uso sottocutaneo) Equidi (cavallo): carne 10 giorni (uso intramuscolare, uso sottocutaneo) Ovini: carne 10 giorni (uso intramuscolare, uso sottocutaneo) Ovini (ovine/pecore femm adulte): latte 5 giorni (uso intramuscolare, uso sottocutaneo)	105454019	QJ01CE09	Sistemico
	penetamato iodidrato	Evomate RTU 400 mgml REVOZYN RTU	Penethamate hydriodide	Sospensione iniettabile	Bovini		Uso intramuscolare	Bovini (bovine /vacche in lattazione): carne 10 giorni (uso intramuscolare); latte 4 giorni (uso intramuscolare)	105116014	QJ01CE90	Sistemico
		Mamyzin 1 g3 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile per bovini suini e cani	Penethamate hydriodide	Polvere e solvente per sospensione iniettabile	Bovini, Suino	Cane	Uso intramuscolare	Bovini: carne 20 giorni (uso intramuscolare); latte 96 ore (uso intramuscolare) Suino: carne 20 giorni (uso intramuscolare)	101118014 101118026 101118038	QJ01CE90	Sistemico
		Penethaone 2363 mgml powder and solvent for suspension for injection for cattle	Penethamate hydriodide	Polvere e solvente per sospensione iniettabile	Bovini (vacca in lattazione)		Uso intramuscolare	Bovini: carne 4 giorni (uso intramuscolare); latte 60 ore (uso intramuscolare) Bovini (bovini da carne): carne 4 giorni (uso intramuscolare)	104774017 104774029 104774031 104774043 104774056 104774068	QJ01CE90	Sistemico
		PERMACYL Powder and solvent for suspension for injection for cattle	Penethamate hydriodide	Polvere e solvente per sospensione iniettabile	Bovini (vacca in lattazione)		Uso intramuscolare	Bovini (bovine /vacche in lattazione): carne 4 giorni (uso intramuscolare); latte 60 ore (uso intramuscolare)	104775010 104775022 104775034 104775046 104775059 104775061	QJ01CE90	Sistemico
		YODIMASPEN	Penethamate hydriodide + Water for injections	Sospensione iniettabile	Bovini		Uso intramuscolare	Bovini: carne 7 giorni (uso intramuscolare); latte 144 ore (uso intramuscolare)	103311015 103311027 103311039 103311041	QJ01CE90	Sistemico
	feneticillina	Nessuna specialità veterinaria autorizzata in Italia									
	fenossimetilpenicillina	DROPEN	Phenoxymethylpenicillin potassium	Premiscela per alimenti medicamentosi	Suino		Somministrazione con il mangime	Suino: carne 1 giorni (somministrazione con il mangime)	103019016	QJ01CE02	Sistemico
		PHENOCILLIN Phenocillin 800 mgg powder for use in drinking water for chickens	Phenoxymethylpenicillin potassium	Polvere per somministrazione in acqua da bere	Polli		Uso orale	Pollo (galline ovaiole): latte 0 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Pollo: carne 2 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte); uova 0 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte)	104846011 104846023 104846035 104846047 104846050 104846062	QJ01CE02	Sistemico
PENICILLINE NATURALI A SPETTRO RISTRETTO (PENICILLINE	fenossimetilpenicillina	PHENOXYPEN WSP 325 mgg polvere per soluzione orale per polli Phenoxypen WSP 325 mgg powder for use in drinking water for pigs and chickens	Phenoxymethylpenicillin potassium	Polvere per somministrazione in acqua da bere	Polli, Suino		Somministrazione in acqua da bere	Pollo: carne 2 giorni (somministrazione in acqua da bere); uova 0 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino: carne 4 giorni (somministrazione in acqua da bere)	103880011 103880023 103880035 103880047 103880050 103880062	QJ01CE02	Sistemico
POLIPEPTIDI CICLICI	bacitracina	BACIDOX BMP zinco bacitracina 50 gKg premiscela per alimenti medicamentosi per conigli	BACITRACIN ZINC	Premiscela per alimenti medicamentosi	Coniglio		Somministrazione con il mangime	Conigli: carne 1 giorni (somministrazione con il mangime)	103681019	QA07AA93	Intestinale
		BACIVET S BACIVET S 4200 IUG POWDER FOR USE IN DRINKING WATER RABBITS	BACITRACIN ZINC	Polvere per somministrazione in acqua da bere	Coniglio		Somministrazione in acqua da bere	Conigli: carne 2 giorni (somministrazione in acqua da bere)	104222017	QA07AA93	Intestinale
		Eradia 125 mgml oral suspension for dogs	Metronidazole	Sospensione orale		Cane	Uso orale		105131015 105131027	QJ01XD01	Sistemico
		METROBACTIN Metrobactin 250 mg tablets for cats and dogs	Metronidazole	Compressa		Cane, Gatto	Uso orale		104847013 104847025 104847037 104847049 104847052 104847064	QJ01XD01	Sistemico

Categoria D - PRUDENZA

Classe di antibiotici	Molecola	Specialità veterinaria	Sostanze attive	Forma farmaceutica	Specie DPA	Specie non DPA	Vie di somministrazione	Tempi di attesa	Codice AIC	ATCvet	Uso (da ATCvet)
NITROIMIDAZOLI	metronidazolo	METROBACTIN Metrobactin 500 mg tablets for cats and dogs	Metronidazole	Compressa		Cane, Gatto	Uso orale		104847013 104847025 104847037 104847049 104847052 104847064	QJ01XD01	Sistemico
		Metronidavet 250 mg compresse per cani e gatti Metronidavet 250 mg tablets for dogs and cats	Metronidazole	Compressa		Cane, Gatto	Uso orale		105505010 105505022 105505034 105505046 105505059 105505061	QJ01XD01, QP51AA01	Sistemico, Antiprotozoario
		Metronidavet 500 mg compresse per cani e gatti Metronidavet 500 mg tablets for dogs and cats	Metronidazole	Compressa		Cane, Gatto	Uso orale		105505010 105505022 105505034 105505046 105505059 105505061	QJ01XD01, QP51AA01	Sistemico, Antiprotozoario
		Metrotab vet Flavoured 1000 mg Tablets for dogs and cats	Metronidazole	Compressa		Cane	Uso orale		105507014 105507026 105507038 105507040 105507053 105507065 105507077 105507089 105507091	QJ01XD01	Sistemico
		Metrotab vet Flavoured 250 mg Tablets for dogs and cats	Metronidazole	Compressa		Cane, Gatto	Uso orale		105507014 105507026 105507038 105507040 105507053 105507065 105507077 105507089 105507091	QJ01XD01	Sistemico
		Metrotab vet Flavoured 500 mg Tablets for dogs and cats	Metronidazole	Compressa		Cane, Gatto	Uso orale		105507014 105507026 105507038 105507040 105507053 105507065 105507077 105507089 105507091	QJ01XD01	Sistemico
		METROVIS Metrovis 750 mg tablets for dogs	Metronidazole	Compressa		Cane	Uso orale		105248013 105248025 105248037 105248049 105248052 105248064 105248076 105248088 105248090 105248102 105248114 105248126 105248138 105248140 105248153 105248165 105248177 105248189	QJ01XD01	Sistemico

Categoria D - PRUDENZA

Classe di antibiotici	Molecola	Specialità veterinaria	Sostanze attive	Forma farmaceutica	Specie DPA	Specie non DPA	Vie di somministrazione	Tempi di attesa	Codice AIC	ATCvet	Uso (da ATCvet)
NITROIMIDAZOLI	metronidazolo	METROVIS Metrovis 250 mg tablets for dogs and cats	Metronidazole	Compressa		Cane, Gatto	Uso orale		105248013 105248025 105248037 105248049 105248052 105248064 105248076 105248088 105248090 105248102 105248114 105248126 105248138 105248140 105248153 105248165 105248177 105248189	QJ01XD01	Sistemico
		Metrovis 100 mg compresse per cani e gatti Metrovis 100 mg tablets for dogs and cats	Metronidazole	Compressa		Cane, Gatto	Uso orale		105248013 105248025 105248037 105248049 105248052 105248064 105248076 105248088 105248090 105248102 105248114 105248126 105248138 105248140 105248153 105248165 105248177 105248189	QJ01XD01	Sistemico
ANTIBATTERICI STEROIDEI	acido fusidico	Betafuse 1 mgg + 5 mgg gel for dogs	Betamethasone valerate + Fusidic acid hemihydrate	Gel		Cane	Uso cutaneo		104942014 104942026	QD07CC01	Dermatologico
		Isaderm vet Gel Isaderm vet gel per cani	Fusidic acid hemihydrate + Betamethasone valerate	Gel		Cane	Uso cutaneo		102881012 102881024	QD07CC01	Dermatologico
		ISATHAL 10mgg collirio sospensione per cani Isathal 10 mgg eye drops suspension for dogs	Fusidic acid + Fusidic acid	Collirio, sospensione		Cane	Uso oftalmico		102801014 102801026	QS01AA13	Oftalmico
DERIVATI NITROFURANICI	furaltadone	Nessuna specialità veterinaria autorizzata in Italia (presente solo in associazione con antibiotici di categoria superiore: vedi Categoria C)									
	furazolidone	DIMETRIN	Nicotinic acid + Thiamine hydrochloride + Pyridoxine hydrochloride + Dimetridazole + Furazolidone	Polvere orale		Uccelli da gabbia e da voliera	Somministrazione con il mangime		103458016 103458028 103458030	QP51AA	Antiprotozoario
DERIVATI NITROFURANICI	furazolidone	FURAZOLIDONE 2 + OSSITETRACICLINA 2 FORMEVET	Oxytetracycline + Furazolidone	Polvere per soluzione orale		Colombo, Uccelli da gabbia e da voliera	Somministrazione in acqua da bere		103449017	QJ01RA90	Sistemico
		SULFAZONE	Thiamine hydrochloride + Pyridoxine hydrochloride + Riboflavin + Menadione + Sulfaquinoxaline + Furazolidone	Polvere orale		Uccelli da gabbia e da voliera	Somministrazione con il mangime		103460010 103460022 103460034	QP51AG53	Antiprotozoario

Categoria C - ATTENZIONE

Classe di antibiotici	Molecola	Specialità veterinaria	Sostanze attive	Forma farmaceutica	Specie DPA	Specie non DPA	Vie di somministrazione	Tempi di attesa	Codice AIC	ATCvet	Uso (da ATCvet)
AMINOGLICOSIDI (TRANNE SPECTINOMICINA)	amikacina	AMIKAVET 125 mgml soluzione iniettabile per equidi non destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano NDPA	Amikacin	Soluzione iniettabile		Cavallo Non DPA	Uso endovenoso; Uso intramuscolare		101319085 101319097 101319109	QJ01GB06	Sistemico
	apramicina	APRAVET 100 GKG Apravet 100 gkg Premix for medicated feeding stuff	Apramycin sulfate	Premiscela per alimenti medicamentosi	Suino		Somministrazione con il mangime	Suino: carne 1 giorni (somministrazione con il mangime)	104551015 104551027 104551039	QA07AA92	Intestinale
		Apravet 552 000 IUg powder for use in drinking watermilk for pigs calves chickens and rabbits Apravet 552 UImg polvere per somministrazione in acqua da berelatte per suini vitelli polli e conigli	Apramycin sulfate	Polvere per somministrazione in acqua da bere/latte	Suino (suinetto), Coniglio, Bovini (preruminante), Pollo (pollo da carne)		Somministrazione in acqua da bere/latte	Bovini (vitelli): carne 28 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Conigli: carne 0 giorni (somministrazione in acqua da bere) Pollo: carne 0 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino: carne 0 giorni (somministrazione in acqua da bere)	104991017 104991029 104991031	QA07AA92	Intestinale
		APRAVET SC Apravet 100 000 IUg premix for medicated feeding stuff for pigs and rabbits	Apramycin sulfate	Premiscela per alimenti medicamentosi	Suino, Coniglio		Somministrazione con il mangime	Conigli: carne 1 giorni (somministrazione con il mangime) Suino: carne 21 giorni (somministrazione con il mangime)	104915018 104915020 104915032	QA07AA92	Intestinale
	diidrostreptomicina	BETABIOTIC	Betamethasone sodium phosphate + Benzylpenicillin procaine + Dihydrostreptomycin	Sospensione iniettabile	Bovini, Suino		Uso intramuscolare	Bovini: carne 74 giorni (uso intramuscolare); latte 12 giorni (uso intramuscolare) Suino: carne 74 giorni (uso intramuscolare)	100257017	QJ01RV01	Sistemico
		Combiotic 200000 UImI + 250 mgml sospensione iniettabile per bovini ovini suini cani e gatti	Dihydrostreptomycin + Benzylpenicillin procaine	Sospensione iniettabile	Bovini, Suino, Ovino	Gatto, Cane, Cavallo Non DPA	Uso intramuscolare	Bovini: carne 74 giorni (uso intramuscolare); latte 108 ore (uso intramuscolare) Bovini: latte 108 ore (uso intramuscolare) Ovini: carne 74 giorni (uso intramuscolare); latte 7 giorni (uso intramuscolare) Suino: carne 74 giorni (uso intramuscolare)	101291019 101291021 101291033 101291045 101291058	QJ01RA01	Sistemico
		CORMICINA sospensione iniettabile per bovini e suini	Betamethasone sodium phosphate + Dihydrostreptomycin + Benzylpenicillin procaine	Sospensione iniettabile	Bovini, Suino		Uso intramuscolare	Bovini: carne 74 giorni (uso intramuscolare); latte 8 giorni (uso intramuscolare) Suino: carne 44 giorni (uso intramuscolare)	104025010 104025022	QJ01RV01	Sistemico
		DEPOMICINA	Dihydrostreptomycin sulfate + Benzylpenicillin procaine	Sospensione iniettabile		Cane, Cavallo Non DPA, Gatto	Uso intramuscolare; Uso sottocutaneo		100208014 100208026 100208038 100208040	QJ01RA01	Sistemico
		DESACIN sospensione iniettabile per bovini e suini	Dexamethasone sodium phosphate + Dihydrostreptomycin + Benzylpenicillin procaine	Sospensione iniettabile	Bovini, Suino		Uso sottocutaneo; Uso intramuscolare	Bovini: carne 60 giorni (uso sottocutaneo, uso intramuscolare); latte 14 giorni (uso sottocutaneo, uso intramuscolare) Suino: carne 60 giorni (uso sottocutaneo, uso intramuscolare)	102010016 102010028	QJ01RV01	Sistemico
		FATROMICINA 1500000 UI polvere e solvente per sospensione iniettabile	Dihydrostreptomycin sulfate + Benzylpenicillin procaine + Benzylpenicillin sodium	Polvere e solvente per sospensione iniettabile	Bovini, Suino, Ovino	Cane	Uso intramuscolare	Bovini: carne 74 giorni (uso intramuscolare); latte 168 ore (uso intramuscolare) Ovini: carne 74 giorni (uso intramuscolare); latte 168 ore (uso intramuscolare) Suino: carne 74 giorni (uso intramuscolare)	101711048 101711051 101711063	QJ01RA01	Sistemico
		FATROMICINA 3000000 UI polvere e solvente per sospensione iniettabile	Dihydrostreptomycin sulfate + Benzylpenicillin procaine + Benzylpenicillin sodium	Polvere e solvente per sospensione iniettabile	Bovini, Suino, Ovino	Cane	Uso intramuscolare	Bovini: carne 74 giorni (uso intramuscolare); latte 168 ore (uso intramuscolare) Ovini: carne 74 giorni (uso intramuscolare); latte 168 ore (uso intramuscolare) Suino: carne 74 giorni (uso intramuscolare)	101711048 101711051 101711063	QJ01RA01	Sistemico
		FATROMICINA 6000000 UI polvere e solvente per sospensione iniettabile	Dihydrostreptomycin sulfate + Benzylpenicillin procaine + Benzylpenicillin sodium	Polvere e solvente per sospensione iniettabile	Bovini, Suino, Ovino	Cane	Uso intramuscolare	Bovini: carne 74 giorni (uso intramuscolare); latte 168 ore (uso intramuscolare) Ovini: carne 74 giorni (uso intramuscolare); latte 168 ore (uso intramuscolare) Suino: carne 74 giorni (uso intramuscolare)	101711048 101711051 101711063	QJ01RA01	Sistemico
		GELLIPEN PRONTO 250 mgml + 200000 UImI sospensione acquosa iniettabile per bovini suini ovini caprini equini non destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano cani e gatti	Dihydrostreptomycin sulfate + Benzylpenicillin procaine	Sospensione iniettabile	Bovini, Suino, Ovino, Caprino		Uso intramuscolare	Bovini: carne 74 giorni (uso intramuscolare); latte 7 giorni (uso intramuscolare) Caprini: carne 74 giorni (uso intramuscolare); latte 7 giorni (uso intramuscolare) Ovini: carne 74 giorni (uso intramuscolare); latte 7 giorni (uso intramuscolare) Suino: carne 74 giorni (uso intramuscolare)	102073018 102073020 102073032 102073069	QJ01RA01	Sistemico
		IZOTRICILLINA S CM 240000 UImI 240 mgml + 300 mgml sospensione iniettabile per bovini suini e ovini	Dihydrostreptomycin sulfate + Benzylpenicillin procaine	Sospensione iniettabile	Bovini, Ovino, Suino		Uso intramuscolare	Bovini: carne 45 giorni (uso intramuscolare); latte 72 ore (uso intramuscolare); organi 45 giorni (uso intramuscolare) Ovini: carne 74 giorni (uso intramuscolare); latte 8 giorni (uso intramuscolare); organi 74 giorni (uso intramuscolare) Suino: carne 60 giorni (uso intramuscolare); organi 60 giorni (uso intramuscolare)	104305014 104305026 104305038 104305040 104305053	QJ01RA01	Sistemico
		NAFPENZAL ASCIUTTA	Dihydrostreptomycin + Nafcillin + Benzylpenicillin procaine	Pomata intramammaria	Bovini, Ovino		Per uso intramammario	Bovini: carne 16 giorni (uso intramammario); latte 48 ore (uso intramammario) Ovini: carne 35 giorni (uso intramammario); latte 108 ore (uso intramammario)	100135019 100135021	QJ51RC22	Intramammario
		REPEN	Benzylpenicillin procaine + Dihydrostreptomycin	Sospensione iniettabile	Bovini, Caprino, Ovino, Suino	Cane, Cavallo Non DPA, Gatto	Uso intramuscolare	Bovini: carne 74 giorni (uso intramuscolare); latte 108 ore (uso intramuscolare) Caprini: carne 74 giorni (uso intramuscolare); latte 162 ore (uso intramuscolare) Ovini: carne 74 giorni (uso intramuscolare); latte 162 ore (uso intramuscolare) Suino: carne 74 giorni (uso intramuscolare)	101775017 101775029	QJ01RA01	Sistemico
		RUBROCILLINA FORTE VETERINARIA 250000 UImI + 100 mgml Sospensione iniettabile per cani e gatti	Benzathine benzylpenicillin + Dihydrostreptomycin sulfate	Soluzione iniettabile		Cane, Gatto	Uso intramuscolare		100071036 100071048	QJ01RA01	Sistemico
	framicetina	CANAURAL gocce auricolari sospensione per cani e gatti	Prednisolone + Framycetin sulfate + Nystatin + Diethanolamine fusidate	Gocce auricolari, soluzione		Gatto, Cane	Uso auricolare		101121010 101121022	QS02CA01	Auricolare

Categoria C - ATTENZIONE

Classe di antibiotici	Molecola	Specialità veterinaria	Sostanze attive	Forma farmaceutica	Specie DPA	Specie non DPA	Vie di somministrazione	Tempi di attesa	Codice AIC	ATCvet	Uso (da ATCvet)
AMINOGLICOSIDI (TRANNE SPECTINOMICINA)	framicetina	MamyzinA pomata intramammaria per bovine in asciutta	Framycetin sulfate + Penethamate hydriodide + Benethamine penicillin	Pomata intramammaria	Bovini (vacca)		Per uso intramammario	Bovini: carne 10 giorni (uso intramammario); latte 36 ore (uso intramammario)	101117012 101117024 101117036	QJ51RC22	Intramammario
	gentamicina	AAGENT 100 mgml soluzione iniettabile per vitelli e suinetti nel primo mese di vita	Gentamicin	Soluzione iniettabile	Bovini (vitello), Suino (suinetto)		Uso endovenoso; Uso intramuscolare	Bovini (vitelli): carne 103 giorni (uso intramuscolare, uso endovenoso); carne 192 giorni (uso intramuscolare, uso endovenoso) Suino: carne 146 giorni (uso intramuscolare, uso endovenoso); carne 66 giorni (uso intramuscolare, uso endovenoso)	101705010 101705022 101705034 101705046 101705059 101705061 101705073	QJ01GB03	Sistemico
		AAGENT 50 mgml soluzione iniettabile per vitelli e suinetti nel primo mese di vita	Gentamicin	Soluzione iniettabile	Bovini (vitello), Suino (lattonzolo)		Uso intramuscolare; Uso endovenoso	Bovini (vitelli): carne 103 giorni (uso intramuscolare, uso endovenoso); carne 192 giorni (uso intramuscolare, uso endovenoso) Suino: carne 146 giorni (uso intramuscolare, uso endovenoso); carne 66 giorni (uso intramuscolare, uso endovenoso)	101705010 101705022 101705034 101705046 101705059 101705061 101705073	QJ01GB03	Sistemico
		Easotic 111 mgml + 1505 IUml + 151 mgml Ear drops suspension	Hydrocortisone aceponate + Miconazole nitrate + Gentamicin sulfate	Gocce auricolari, sospensione		Cane	Uso auricolare		104055013	QS02CA03	Auricolare
		GANABEN PREMIX 50 mgg premiscela per alimenti medicamentosi per suini	Gentamicin	Premiscela per alimenti medicamentosi	Suino		Uso orale	Suino: carne 12 giorni (somministrazione con il mangime)	102965023 102965035 102965047 102965050 102965062 102965074 102965086	QA07AA91	Intestinale
		GANABEN PREMIX gentamicina premiscela per alimenti medicamentosi per suini	Gentamicin	Premiscela per alimenti medicamentosi	Suino		Somministrazione con il mangime	Suino: carne 12 giorni (somministrazione con il mangime)	102965023 102965035 102965047 102965050 102965062 102965074 102965086	QA07AA91	Intestinale
		GANABEN SP gentamicina polvere solubile per uso in acqua da bere per suini	Gentamicin	Polvere orale	Suino		Uso orale	Suino: carne 0 giorni (somministrazione in acqua da bere); carne 12 giorni (somministrazione in acqua da bere)	102964018 102964020	QA07AA91	Intestinale
		Mometamax Ultra 86 mgml + 26 mgml + 21 mgml Ear drops suspension	Gentamicin + Posaconazole + Mometasone furoate	Gocce auricolari, sospensione		Cane	Uso auricolare		105731018	QS02CA91	Auricolare
		OTOGENT	Econazole nitrate + Tetracaine hydrochloride + Flumetasone pivalate + Gentamicin sulfate	Gocce auricolari, soluzione		Cane, Gatto	Uso auricolare		102096017	QS02CA02	Auricolare
		OTOMAX EAR DROPS SUSPENSION OTOMAX GOCCE OTOLOGICHE	Gentamicin sulfate + Clotrimazole + Betamethasone valerate	Gocce auricolari, sospensione		Cane	Uso auricolare		102882014 102882026 102882038 102882040 102882053 102882065 102882077 102882089	QS02CA90	Auricolare
		SINTAGE	Amoxicillin trihydrate + Gentamicin sulfate	Premiscela per alimenti medicamentosi	Suino		Somministrazione con il mangime	Suino: carne 10 giorni (somministrazione con il mangime)	104239013	QJ01RA01	Sistemico
		SOLIGENTAL 3000 IUML EYE DROP SOLUTION	Gentamicin sulfate	Collirio, soluzione		Cane, Gatto	Uso oftalmico		102919014	QS01AA11	Oftalmico
		TRIACTIV	Gentamicin + Dexamethasone	Collirio, soluzione		Cane, Gatto	Uso oftalmico		101587018	QS01CA01	Oftalmico
	kanamicina	KANACILL FORTIUS	Kanamycin sulfate	Soluzione iniettabile	Bovini, Polli, Suino		Uso intramuscolare; Uso sottocutaneo	Bovini: carne 64 giorni (uso sottocutaneo); latte 108 ore (uso intramuscolare) Pollo: carne 37 giorni (uso intramuscolare, uso sottocutaneo) Suino: carne 64 giorni (uso intramuscolare, uso sottocutaneo)	101983043 101983056	QJ01GB04	Sistemico
		KANAMUCIL	Acetylcysteine + Kanamycin sulfate	Soluzione iniettabile	Bovini, Pollo (pollo da carne), Caprino, Ovino, Suino, Cavallo	Cane, Gatto	Uso endotracheobronchiale; Uso intramuscolare; Uso sottocutaneo; Uso intrauterino	Bovini: carne 29 giorni (uso intrauterino, uso intramuscolare, uso endotracheobronchiale); latte 11 mungiture (uso intrauterino, uso intramuscolare, uso endotracheobronchiale) Bovini: latte 11 mungiture (uso intrauterino, uso intramuscolare, uso endotracheobronchiale) Caprini: carne 29 giorni (uso intrauterino, uso intramuscolare, uso endotracheobronchiale); latte 11 mungiture (uso intrauterino, uso intramuscolare, uso endotracheobronchiale) Equidi (cavallo): carne 29 giorni (uso intrauterino, uso intramuscolare, uso endotracheobronchiale) Ovini: carne 29 giorni (uso intrauterino, uso intramuscolare, uso endotracheobronchiale); latte 11 mungiture (uso intrauterino, uso intramuscolare, uso endotracheobronchiale) Pollo (broiler): carne 22 giorni (uso intrauterino, uso intramuscolare, uso sottocutaneo, uso endotracheobronchiale) Suino: carne 29 giorni (uso intrauterino, uso intramuscolare, uso endotracheobronchiale)	102084011 102084023 102084035 102084047	QJ01RV01	Sistemico
		Ubrolexin intramammary suspension for lactating dairy cows Ubrolexin sospensione intramammaria per bovine in lattazione	Cefalexin monohydrate + KANAMYCIN MONOSULPHATE	Sospensione intramammaria	Bovini		Per uso intramammario	Bovini (bovine /vacche in lattazione): carne 10 giorni (uso intramammario); latte 5 giorni (uso intramammario)	104073010 104073022	QJ51RD01	Intramammario

Categoria C - ATTENZIONE

Classe di antibiotici	Molecola	Specialità veterinaria	Sostanze attive	Forma farmaceutica	Specie DPA	Specie non DPA	Vie di somministrazione	Tempi di attesa	Codice AIC	ATCvet	Uso (da ATCvet)
AMINOGLUCOSIDI (TRANNE SPECTINOMICINA)	neomicina	Albiotic 330 mg 100 mg Soluzione Intramammaria per bovine in lattazione Huvebiotic 330 mg100 mg Intramammary solution	Lincomycin hydrochloride + NEOMYCIN SULFATE	Soluzione intramammaria	Bovini		Per uso intramammario	Bovini (bovine /vacche in lattazione): carne 2 giorni (uso intramammario); latte 60 ore (uso intramammario)	105547018	QJ51RF03, QJ51RG01	Intramammario
		Multishield DC Intramammary Suspension for Cows	NEOMYCIN SULFATE + Penethamate hydriodide + Benzylpenicillin procaine	Sospensione intramammaria	Bovini		Per uso intramammario	Bovini (bovine/vacche in asciutta): carne 28 giorni (uso intramammario); latte 50 giorni dopo il trattamento se il periodo di asciutta Â¯ inferiore o uguale a 54 giorni (uso intramammario); latte 96 ore dopo il parto se il periodo di asciutta Â¯ superiore a 54 giorni (uso intramammario)	104379019 104379021	QJ51RC22	Intramammario
		NEODIARISTIN antidiarroico polvere uso orale per vitelli giovani suini	Nicotinamide + Riboflavin + Phthalylsulfathiazole + Sulfaguanidine + Streptomycin sulfate + NEOMYCIN SULFATE	Polvere orale	Bovini (vitello), Suino		Uso orale	Bovini (vitelli): carne 44 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Suino: carne 44 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte)	101719019 101719021 101719033	QA07AA99	Intestinale
		NEOIVEN 500 000 IUG POWDER FOR USE IN DRINKING WATERMILK REPLACER	NEOMYCIN SULFATE	Polvere per somministrazione in acqua da bere/latte	Bovini, Suino, Galloanseri		Uso orale	Bovini: carne 14 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Pollo (galline ovaiole): carne 14 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Pollo: carne 14 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Uccelli (anatre): carne 14 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Uccelli (oche): carne 14 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Uccelli (pernici/starne): carne 14 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Uccelli (quaglie): carne 14 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Uccelli (tacchino): carne 14 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte)	105173013 105173025	QA07AA01	Intestinale
		NEOMAY 500 000 IUG POWDER FOR USE IN DRINKING WATERMILK REPLACER NEOMAY 500000 UIG	Neomycin	Polvere per somministrazione in acqua da bere/latte	Bovini, Suino, Pollame		Uso orale	Bovini (vitelli): carne 14 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Pollo (galline ovaiole): uova 0 giorni (somministrazione in acqua da bere) Pollo: carne 14 giorni (somministrazione in acqua da bere, somministrazione in acqua da bere/latte) Suino: carne 3 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Suino (suini da ingrasso): carne 3 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Uccelli (anatre): carne 14 giorni (somministrazione in acqua da bere); uova 0 giorni (somministrazione in acqua da bere) Uccelli (oche): carne 14 giorni (somministrazione in acqua da bere); uova 0 giorni (somministrazione in acqua da bere, somministrazione in acqua da bere/latte) Uccelli (pernici/starne): carne 14 giorni (somministrazione in acqua da bere); uova 0 giorni (somministrazione in acqua da bere) Uccelli (quaglie): carne 14 giorni (somministrazione in acqua da bere, somministrazione in acqua da bere/latte); uova 0 giorni (somministrazione in acqua da bere, somministrazione con il mangime, somministrazione in acqua da bere/latte) Uccelli (tacchino): carne 14 giorni (somministrazione in acqua da bere); uova 0 giorni (somministrazione in acqua da bere)	104812019 104812021	QA07AA01	Intestinale
		NEOPEN	NEOMYCIN SULFATE + Benzylpenicillin procaine	Sospensione iniettabile	Bovini, Suino	Cane, Cavallo Non DPA, Gatto	Uso intramuscolare; Uso sottocutaneo	Bovini: carne 56 giorni (uso intramuscolare); latte 5 giorni (uso intramuscolare) Suino: carne 56 giorni (uso intramuscolare)	102221013 102221025 102221037 102221049 102221052 102221064 102221076 102221088	QJ01RA01	Sistemico
		NEOPURDOX 1000 MGG	NEOMYCIN SULFATE	Polvere per soluzione orale	Pollo (gallina ovaiola), Ovino (agnello), Tacchino, Polli, Bovini (vitello), Suino		Somministrazione in acqua da bere/latte; Somministrazione in acqua da bere	Bovini (vitelli): carne 14 giorni (somministrazione in acqua da bere) Ovini (agnelli): carne 14 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Pollo (galline ovaiole): carne 7 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte); uova 0 giorni (somministrazione in acqua da bere) Pollo: carne 7 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino: carne 14 giorni (somministrazione in acqua da bere) Uccelli (tacchino): carne 7 giorni (somministrazione in acqua da bere)	105387017	QA07AA01	Intestinale
		TRESADERM soluzione otodermatologica per cani e gatti	Dexamethasone + NEOMYCIN SULFATE + Tiabendazole	Gocce auricolari, soluzione		Cane, Gatto	Uso auricolare; Uso cutaneo		100199013	QD07CB	Dermatologico
	paromomicina	AMMINOFARMA 175 mgml soluzione iniettabile per bovini	Paromomycin sulfate	Soluzione iniettabile	Bovini		Uso intramuscolare	Bovini: carne 44 giorni (uso intramuscolare)	100252028 100252030 100252055	QJ01GB	Sistemico
		AMMINOFARMA 175 mgml soluzione iniettabile per cani e gatti	Paromomycin	Soluzione iniettabile		Cane, Gatto	Uso intramuscolare		100252016	QJ01GB92	Sistemico
		AMMINOFARMA L 20 200 mgml soluzione per uso orale per vitelli da latte suini polli tacchini e conigli	Paromomycin sulfate	Soluzione orale	Suino, Polli, Tacchino, Coniglio, Bovini (vitello)		Uso orale	Bovini (vitelli da latte): carne 44 giorni (uso orale) Conigli: carne 3 giorni (uso orale) Pollo (broiler): carne 2 giorni (uso orale) Pollo (galline ovaiole): uova 0 giorni (uso orale) Suino: carne 44 giorni (uso orale) Uccelli (tacchino): carne 2 giorni (uso orale)	102519016 102519028 102519030	QA07AA06	Intestinale
		AMMINOFARMA S 10 100 mgg polvere per uso orale per vitelli da latte e suini	Paromomycin sulfate	Polvere orale	Bovino (vitello lattante), Suino		Uso orale	Bovini (vitelli da latte): carne 20 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Suino: carne 3 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte)	102518014 102518026 102518038 102518040	QA07AA06	Intestinale
		GABBROVET 140 MGML SOLUTION FOR USE IN DRINKING WATERMILK FOR PRERUMINANT CATTLE AND PIGS	Paromomycin sulfate	Soluzione per somministrazione in acqua da bere/latte	Bovini (preruminante), Suino		Somministrazione in acqua da bere/latte; Somministrazione in acqua da bere	Bovini (bovini pre ruminanti): carne 110 giorni (alto dosaggio) (somministrazione in acqua da bere/latte); carne 20 giorni (basso dosaggio) (somministrazione in acqua da bere/latte) Bovini (vitelli): carne 110 giorni (alto dosaggio) (somministrazione in acqua da bere/latte); carne 20 giorni (basso dosaggio) (somministrazione in acqua da bere/latte) Suino: carne 3 giorni (somministrazione in acqua da bere)	105636017 105636029 105636031 105636043	QA07AA06	Intestinale

Categoria C - ATTENZIONE

Classe di antibiotici	Molecola	Specialità veterinaria	Sostanze attive	Forma farmaceutica	Specie DPA	Specie non DPA	Vie di somministrazione	Tempi di attesa	Codice AIC	ATCvet	Uso (da ATCvet)
AMINOGLICOSIDI (TRANNE SPECTINOMICINA)	paromomicina	GABBROVET MULTI 140 MGML SOLUTION FOR USE IN DRINKING WATER MILK FOR PRERUMINANT CATTLE AND PIGS	Paromomycin sulfate	Soluzione per somministrazione in acqua da bere/latte	Bovini (vitello), Suino		Uso orale	Bovini (bovini pre ruminanti): carne 110 giorni (alto dosaggio) (somministrazione in acqua da bere/latte); carne 20 giorni (basso dosaggio) (somministrazione in acqua da bere/latte) Bovini (vitelli): carne 110 giorni (alto dosaggio) (somministrazione in acqua da bere/latte); carne 20 giorni (basso dosaggio) (somministrazione in acqua da bere/latte) Suino: carne 3 giorni (somministrazione in acqua da bere)	105636017 105636029 105636031 105636043	QA07AA06	Intestinale
		GRABEN	Paromomycin sulfate	Soluzione iniettabile		Cane, Gatto	Uso intramuscolare		103977017 103977029	QJ01GB92	Sistemico
		Paramore 175 mgml soluzione iniettabile per bovini	Paromomycin sulfate	Soluzione iniettabile	Bovini		Uso intramuscolare	Bovini: carne 44 giorni (uso intramuscolare); organi 44 giorni (uso intramuscolare)	105531014	QJ01GB	Sistemico
		Paramore 200 mgml soluzione per uso orale per vitelli da latte suini polli tacchini e conigli	Paromomycin sulfate	Soluzione orale	Tacchino, Polli, Coniglio, Suino, Bovino (vitello lattante)		Uso orale	Bovini (vitelli da latte): carne 44 giorni (uso orale) Conigli: carne 3 giorni (uso orale) Pollo: carne 2 giorni (uso orale); uova 0 giorni (uso orale) Suino: carne 44 giorni (uso orale) Uccelli (tacchino): carne 2 giorni (uso orale)	104735016 104735028	QA07AA06	Intestinale
		PAROFOR Parofor 175 mgml Solution for injection	Paromomycin sulfate	Soluzione iniettabile	Suino		Uso intramuscolare	Non disponibile (specialità assente dall'elenco ministeriale)	Non presente nell'elenco ministeriale	QA07AA06	Intestinale
		Parofor 140 mgml Solution for use in drinking watermilk	Paromomycin sulfate	Soluzione per somministrazione in acqua da bere/latte	Suino, Bovini (preruminante)		Somministrazione in acqua da bere/latte	Bovini (vitelli): carne 20 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Suino: carne 3 giorni (somministrazione in acqua da bere)	104644012 104644024 104644036 104644048 104644051 104644063 104644075 104644087	QA07AA06	Intestinale
		Parofor 70000 IUg Powder for use in drinking watermilk	Paromomycin	Polvere per somministrazione in acqua da bere/latte	Suino, Bovini (preruminante)		Somministrazione in acqua da bere/latte	Bovini (vitelli): carne 20 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Suino: carne 3 giorni (somministrazione in acqua da bere)	104644012 104644024 104644036 104644048 104644051 104644063 104644075 104644087	QA07AA06	Intestinale
		PAROFOR CRYPTO 140000 UI PER BOVINI PRERUMINANTI Parofor crypto 140 000 IUml oral solution for preruminant cattle	Paromomycin	Soluzione orale	Bovini		Uso orale	Bovini (vitelli): carne 62 giorni (uso orale)	105337012 105337024 105337036 105337048	QA07AA06	Intestinale
		PAROFOR CRYPTO 140000 UI PER OVINI E CAPRINI Parofor crypto 140 000 IUml oral solution for sheep and goats	Paromomycin sulfate	Soluzione orale	Caprino, Ovino		Uso orale	Caprini: carne 24 giorni (uso orale) Ovini (agnelli): carne 24 giorni (uso orale)	105244014 105244026 105244038 105244040	QA07AA06	Intestinale
		Paromomicina Huvepharma 200 mgg premiscela per alimenti medicamentosi per suini polli da carne broiler conigli e tacchini	Paromomycin sulfate	Premiscela per alimenti medicamentosi	Tacchino, Pollo (pollo da carne), Coniglio, Suino		Somministrazione con il mangime	Conigli: carne 2 giorni (somministrazione con il mangime) Pollo (broiler): carne 11 giorni (somministrazione con il mangime) Suino: carne 5 giorni (somministrazione con il mangime) Uccelli (tacchino): carne 0 giorni (somministrazione con il mangime)	104526013 104526025 104526037	QA07AA06	Intestinale
		SUPRAMICINA 175 MGML	Paromomycin	Soluzione iniettabile	Bovini		Uso intramuscolare; Uso intrauterino	Bovini: carne 44 giorni (uso intramuscolare, uso intrauterino)	103938015 103938027 103938039	QJ01GB92	Sistemico
		SUPRAMICINA OS 200 mgml soluzione orale per vitelli da latte suini broilers e conigli	Paromomycin sulfate	Soluzione orale	Bovino (vitello lattante), Suino, Pollo (pollo da carne), Coniglio		Uso orale	Bovini (vitelli da latte): carne 44 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Conigli: carne 3 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Pollo (broiler): carne 2 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino: carne 44 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte)	103919015 103919027 103919039	QA07AA06	Intestinale
		VETERABOL Spray spray cutaneo sospensione per cani e gatti	Paromomycin sulfate + Prednisolone + Clostebol acetate	Spray cutaneo, sospensione		Cane, Gatto	Uso cutaneo		101539017	QD07XA02	Dermatologico
	streptomicina	IZOPENICILLINA	Streptomycin sulfate + Benzylpenicillin procaine	Sospensione intramammaria	Bovini (vacca in asciutta)		Per uso intramammario	Bovini (bovine/vacche in asciutta): carne 39 giorni (uso intramammario); latte 60 ore (uso intramammario)	102035033	QJ51RC22	Intramammario
		IZOPENICILLINA LATTAZIONE	Benzylpenicillin sodium + Streptomycin sulfate	Pomata intramammaria	Bovini (vacca in lattazione)		Per uso intramammario	Bovini (bovine /vacche in lattazione): carne 3 giorni (uso intramammario); latte 84 ore (uso intramammario)	102036011	QJ51RC22	Intramammario
		NEODIARISTIN antidiarroico polvere uso orale per vitelli giovani suini	Nicotinamide + Riboflavin + Phthalylsulfathiazole + Sulfaguanidine + Streptomycin sulfate + NEOMYCIN SULFATE	Polvere orale	Bovini (vitello), Suino		Uso orale	Bovini (vitelli): carne 44 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Suino: carne 44 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte)	101719019 101719021 101719033	QA07AA99	Intestinale
	tobramicina	Dropstil 3 mgml collirio per cani e gatti	Tobramycin	Collirio, soluzione		Cane, Gatto	Uso oftalmico		105279018	QS01AA12	Oftalmico
		Stilbiotic 3 mgml collirio soluzione per cani e gatti	Tobramycin	Collirio, soluzione		Cane, Gatto	Uso intraoculare		103686010	QS01AA12	Oftalmico

Categoria C - ATTENZIONE

Classe di antibiotici	Molecola	Specialità veterinaria	Sostanze attive	Forma farmaceutica	Specie DPA	Specie non DPA	Vie di somministrazione	Tempi di attesa	Codice AIC	ATCvet	Uso (da ATCvet)
AMINOPENICILLINE IN ASSOCIAZIONE CON INIBITORI DELLE BETA-LATTAMASI	amoxicillina + acido clavulanico	Bioclanic 250 mg + 625 mg compresse aromatizzate per gatti e cani Bioclanic 250 mg + 625 mg flavoured tablets for cats and dogs	Amoxicillin + Clavulanic acid	Compressa		Cane, Gatto	Uso orale		105779019 105779021 105779033 105779045 105779058 105779060	QJ01CR02	Sistemico
		Bioclanic 50 mg + 125 mg flavoured tablets for cats and dogs	Amoxicillin trihydrate + Potassium clavulanate, diluted (potassium clavulanate - cellulose, microcrystalline (1:1))	Compressa		Cane, Gatto	Uso orale		105779019 105779021 105779033 105779045 105779058 105779060	QJ01CR02	Sistemico
		Bioclanic 500 mg + 125 mg compresse aromatizzate per cani Bioclanic 500 mg + 125 mg flavoured tablets for dogs	Amoxicillin + Clavulanic acid	Compressa		Cane	Uso orale		105779019 105779021 105779033 105779045 105779058 105779060	QJ01CR02	Sistemico
		Clamaden 200 mg50 mg chewable tablets for cats and dogs	Amoxicillin trihydrate + Potassium clavulanate	Compressa masticabile		Cane, Gatto	Uso orale		Non presente nell'elenco ministeriale	QJ01CR02	Sistemico
		Clamaden 40 mg10 mg chewable tablets for cats and dogs	Potassium clavulanate + Amoxicillin trihydrate	Compressa masticabile		Cane, Gatto	Uso orale		Non presente nell'elenco ministeriale	QJ01CR02	Sistemico
		Clamaden 400 mg100 mg chewable tablets for dogs	Potassium clavulanate + Amoxicillin trihydrate	Compressa masticabile		Cane	Uso orale		Non presente nell'elenco ministeriale	QJ01CR02	Sistemico
		CLAVASEPTIN P 250 MG TABLETS FOR DOGS	Amoxicillin trihydrate + Potassium clavulanate	Compressa		Cane	Uso orale		103747010 103747022 103747034 103747046 103747059 103747061 103747073 103747085 103747097 103747109 103747111 103747123 103747135 103747147 103747150 103747162 103747174 103747186 103747198 103747200 103747212 103747224 103747236 103747248 103747251 103747263 103747275 103747287 103747299 103747301 103747313 103747325 103747337 103747349 103747352 103747364 103747376 103747388	QJ01CR02	Sistemico

Categoria C - ATTENZIONE

Classe di antibiotici	Molecola	Specialità veterinaria	Sostanze attive	Forma farmaceutica	Specie DPA	Specie non DPA	Vie di somministrazione	Tempi di attesa	Codice AIC	ATCvet	Uso (da ATCvet)
AMINOPENICILLINE IN ASSOCIAZIONE CON INIBITORI DELLE BETA-LATTAMASI	amoxicillina + acido clavulanico	CLAVASEPTIN P 50 MG TABLETS FOR DOGS AND CATS	Amoxicillin trihydrate + Potassium clavulanate	Compressa		Cane, Gatto	Uso orale		103747010 103747022 103747034 103747046 103747059 103747061 103747073 103747085 103747097 103747109 103747111 103747123 103747135 103747147 103747150 103747162 103747174 103747186 103747198 103747200 103747212 103747224 103747236 103747248 103747251 103747263 103747275 103747287 103747299 103747301 103747313 103747325 103747337 103747349 103747352 103747364 103747376 103747388	QJ01CR02	Sistemico
		CLAVASEPTIN P 500 MG TABLETS FOR DOGS	Amoxicillin trihydrate + Potassium clavulanate	Compressa		Cane	Uso orale		103747010 103747022 103747034 103747046 103747059 103747061 103747073 103747085 103747097 103747109 103747111 103747123 103747135 103747147 103747150 103747162 103747174 103747186 103747198 103747200 103747212 103747224 103747236 103747248 103747251 103747263 103747275 103747287 103747299 103747301 103747313 103747325 103747337 103747349 103747352 103747364 103747376 103747388	QJ01CR02	Sistemico

Categoria C - ATTENZIONE

Classe di antibiotici	Molecola	Specialità veterinaria	Sostanze attive	Forma farmaceutica	Specie DPA	Specie non DPA	Vie di somministrazione	Tempi di attesa	Codice AIC	ATCvet	Uso (da ATCvet)
AMINOPENICILLINE IN ASSOCIAZIONE CON INIBITORI DELLE BETA-LATTAMASI	amoxicillina + acido clavulanico	CLAVASEPTIN P 625 MG TABLETS FOR DOGS AND CATS	Amoxicillin trihydrate + Potassium clavulanate	Compressa		Cane, Gatto	Uso orale		103747010 103747022 103747034 103747046 103747059 103747061 103747073 103747085 103747097 103747109 103747111 103747123 103747135 103747147 103747150 103747162 103747174 103747186 103747198 103747200 103747212 103747224 103747236 103747248 103747251 103747263 103747275 103747287 103747299 103747301 103747313 103747325 103747337 103747349 103747352 103747364 103747376 103747388	QJ01CR02	Sistemico
		CLAVASEPTIN P 750 MG TABLETS FOR DOGS	Amoxicillin trihydrate + Potassium clavulanate	Compressa		Cane	Uso orale		103747010 103747022 103747034 103747046 103747059 103747061 103747073 103747085 103747097 103747109 103747111 103747123 103747135 103747147 103747150 103747162 103747174 103747186 103747198 103747200 103747212 103747224 103747236 103747248 103747251 103747263 103747275 103747287 103747299 103747301 103747313 103747325 103747337 103747349 103747352 103747364 103747376 103747388	QJ01CR02	Sistemico

Categoria C - ATTENZIONE

Classe di antibiotici	Molecola	Specialità veterinaria	Sostanze attive	Forma farmaceutica	Specie DPA	Specie non DPA	Vie di somministrazione	Tempi di attesa	Codice AIC	ATCvet	Uso (da ATCvet)
AMINOPENICILLINE IN ASSOCIAZIONE CON INIBITORI DELLE BETA-LATTAMASI	amoxicillina + acido clavulanico	CLAVOBAY Synuclav 200 mg 50 mg Tablets for Dogs	Potassium clavulanate + Amoxicillin trihydrate	Compressa		Cane	Uso orale		103674014 103674026 103674038 103674040 103674053 103674065 103674077 103674089 103674091 103674103 103674115	QJ01CR02	Sistemico
		Clavobay 50 mg compresse per cani e gatti Synuclav 40 mg 10 mg Tablets for Dogs and Cats	Potassium clavulanate + Amoxicillin trihydrate	Compressa		Cane, Gatto	Uso orale		103674014 103674026 103674038 103674040 103674053 103674065 103674077 103674089 103674091 103674103 103674115	QJ01CR02	Sistemico
		CLAVOBAY 500 MG COMPRESSE PALATABILI PER CANI Synuclav 400 mg 100 mg Tablets for Dogs	Potassium clavulanate + Amoxicillin trihydrate	Compressa		Cane	Uso orale		103955011 103955023 103955035 103955047	QJ01CR02	Sistemico
		Clavudale 200 mg50 mg tablets for dogs Spectrabactin Vet 200 mg50 mg compresse per cani	Amoxicillin + Clavulanic acid	Compressa		Cane	Uso orale		105491017 105491029 105491031 105491043 105491056 105491068 105491070 105491082 105491094	QJ01CR02	Sistemico
		Clavudale 40 mg10 mg tablets for cats and dogs Spectrabactin Vet 40 mg10 mg compresse per gatti e cani	Amoxicillin + Potassium clavulanate	Compressa		Cane, Gatto	Uso orale		105491017 105491029 105491031 105491043 105491056 105491068 105491070 105491082 105491094	QJ01CR02	Sistemico
		Clavudale 400 mg100 mg tablets for dogs Spectrabactin Vet 400 mg100 mg Compresse per cani	Amoxicillin + Clavulanic acid	Compressa		Cane	Uso orale		105491017 105491029 105491031 105491043 105491056 105491068 105491070 105491082 105491094	QJ01CR02	Sistemico
		Clavusan 250 mg + 625 mg compresse per cani e gatti Clavusan 250 mg + 625 mg tablets for dogs and cats	Potassium clavulanate + Amoxicillin trihydrate	Compressa		Cane, Gatto	Uso orale		105685010 105685046 105685061 105685097 105685111 105685147	QJ01CR02	Sistemico
		Clavusan 50 mg + 125 mg compresse per cani e gatti Clavusan 50 mg + 125 mg tablets for dogs and cats	Amoxicillin trihydrate + Potassium clavulanate	Compressa		Cane, Gatto	Uso orale		105685010 105685046 105685061 105685097 105685111 105685147	QJ01CR02	Sistemico
		Clavusan 500 mg + 125 mg compresse per cani Clavusan 500 mg + 125 mg tablets for dogs	Potassium clavulanate + Amoxicillin trihydrate	Compressa		Cane	Uso orale		105685010 105685046 105685061 105685097 105685111 105685147	QJ01CR02	Sistemico
		Combiclav Intramammary Suspension for Lactating Cows NOROCLAV SOSPENSIONE MAMMARIA PER BOVINE IN LATTAZIONE	Amoxicillin trihydrate + Potassium clavulanate + Prednisolone	Sospensione intramammaria	Bovini		Per uso intramammario	Bovini (bovine /vacche in lattazione): carne 7 giorni (uso intramammario); latte 84 ore (uso intramammario)	105163012 105163024 105163036 105163048	QJ51RV01	Intramammario

Categoria C - ATTENZIONE

Classe di antibiotici	Molecola	Specialità veterinaria	Sostanze attive	Forma farmaceutica	Specie DPA	Specie non DPA	Vie di somministrazione	Tempi di attesa	Codice AIC	ATCvet	Uso (da ATCvet)
AMINOPENICILLINE IN ASSOCIAZIONE CON INIBITORI DELLE BETA-LATTAMASI	amoxicillina + acido clavulanico	Cylanic 250 mg + 625 mg tablets for dogs and cats	Amoxicillin trihydrate + Potassium clavulanate	Compressa		Cane, Gatto	Uso orale		105501011 105501023 105501035 105501047 105501050 105501062 105501074 105501086 105501098	QJ01CR02	Sistemico
		Cylanic 50 mg + 125 mg tablets for dogs and cats	Amoxicillin trihydrate + Potassium clavulanate	Compressa		Cane, Gatto	Uso orale		105501011 105501023 105501035 105501047 105501050 105501062 105501074 105501086 105501098	QJ01CR02	Sistemico
		Cylanic 500 mg + 125 mg tablets for dogs	Amoxicillin trihydrate + Potassium clavulanate	Compressa		Cane	Uso orale		105501011 105501023 105501035 105501047 105501050 105501062 105501074 105501086 105501098	QJ01CR02	Sistemico
		INTRAMAR Lacto 200 mg + 50 mg + 10 mg sospensione intramammaria per bovini Intramar Lacto 200 mg + 50 mg + 10mg Intramammary suspension	Prednisolone + Amoxicillin trihydrate + Potassium clavulanate	Sospensione intramammaria	Bovini (vacca in lattazione)		Per uso intramammario	Bovini (bovine /vacche in lattazione): carne 7 giorni (uso intramammario); latte 84 ore (uso intramammario)	105794010 105794022	QJ51RV01	Intramammario
		KESIUM 200 MG 50 MG CHEWABLE TABLETS FOR DOGS	Amoxicillin trihydrate + Potassium clavulanate	Compressa masticabile		Cane	Uso orale		104319013 104319025 104319037 104319049 104319052 104319064 104319076 104319088 104319090 104319102 104319114 104319126 104319138 104319140 104319153 104319165 104319177 104319189 104319191 104319203 104319215 104319227 104319239 104319241	QJ01CR02	Sistemico

Categoria C - ATTENZIONE

Classe di antibiotici	Molecola	Specialità veterinaria	Sostanze attive	Forma farmaceutica	Specie DPA	Specie non DPA	Vie di somministrazione	Tempi di attesa	Codice AIC	ATCvet	Uso (da ATCvet)
AMINOPENICILLINE IN ASSOCIAZIONE CON INIBITORI DELLE BETA-LATTAMASI	amoxicillina + acido clavulanico	KESIUM 40 MG 10 MG CHEWABLE TABLETS FOR CATS AND DOGS	Amoxicillin trihydrate + Potassium clavulanate	Compressa masticabile		Cane, Gatto	Uso orale		104319013 104319025 104319037 104319049 104319052 104319064 104319076 104319088 104319090 104319102 104319114 104319126 104319138 104319140 104319153 104319165 104319177 104319189 104319191 104319203 104319215 104319227 104319239 104319241	QJ01CR02	Sistemico
		KESIUM 400 MG 100 MG CHEWABLE TABLETS FOR DOGS	Amoxicillin trihydrate + Potassium clavulanate	Compressa masticabile		Cane	Uso orale		104319013 104319025 104319037 104319049 104319052 104319064 104319076 104319088 104319090 104319102 104319114 104319126 104319138 104319140 104319153 104319165 104319177 104319189 104319191 104319203 104319215 104319227 104319239 104319241	QJ01CR02	Sistemico
		KESIUM 50 MG 125 MG CHEWABLE TABLETS FOR CATS AND DOGS	Amoxicillin trihydrate + Potassium clavulanate	Compressa masticabile		Cane, Gatto	Uso orale		104319013 104319025 104319037 104319049 104319052 104319064 104319076 104319088 104319090 104319102 104319114 104319126 104319138 104319140 104319153 104319165 104319177 104319189 104319191 104319203 104319215 104319227 104319239 104319241	QJ01CR02	Sistemico

Categoria C - ATTENZIONE

Classe di antibiotici	Molecola	Specialità veterinaria	Sostanze attive	Forma farmaceutica	Specie DPA	Specie non DPA	Vie di somministrazione	Tempi di attesa	Codice AIC	ATCvet	Uso (da ATCvet)
AMINOPENICILLINE IN ASSOCIAZIONE CON INIBITORI DELLE BETA-LATTAMASI	amoxicillina + acido clavulanico	KESIUM 500 MG 125 MG CHEWABLE TABLETS FOR DOGS	Amoxicillin trihydrate + Potassium clavulanate	Compressa masticabile		Cane	Uso orale		104319013 104319025 104319037 104319049 104319052 104319064 104319076 104319088 104319090 104319102 104319114 104319126 104319138 104319140 104319153 104319165 104319177 104319189 104319191 104319203 104319215 104319227 104319239 104319241	QJ01CR02	Sistemico
		KONCLAV 200 mg + 50 mg compresse per cani	Clavulanic acid + Amoxicillin	Compressa		Cane	Uso orale		104617131 104617143 104617156 104617168 104617170 104617182	QJ01CR02	Sistemico
		KONCLAV 40 mg + 10 mg compresse per cani	Clavulanic acid + Amoxicillin	Compressa		Cane	Uso orale		104617131 104617143 104617156 104617168 104617170 104617182	QJ01CR02	Sistemico
		KONCLAV 400 mg + 100 mg compresse per cani	Clavulanic acid + Amoxicillin	Compressa		Cane	Uso orale		104617131 104617143 104617156 104617168 104617170 104617182	QJ01CR02	Sistemico
		NICILAN 200 mg50 mg tablets for dogs	Potassium clavulanate + Amoxicillin trihydrate	Compressa		Cane	Uso orale		104274016 104274028 104274030 104274042 104274055 104274067 104274079 104274081 104274093 104274105 104274117 104274129 104274131 104274143 104274156 104274168	QJ01CR02	Sistemico
		NICILAN 40 mg10 mg tablets for dogs and cats	Potassium clavulanate + Amoxicillin trihydrate	Compressa		Cane, Gatto	Uso orale		104274016 104274028 104274030 104274042 104274055 104274067 104274079 104274081 104274093 104274105 104274117 104274129 104274131 104274143 104274156 104274168	QJ01CR02	Sistemico

Categoria C - ATTENZIONE

Classe di antibiotici	Molecola	Specialità veterinaria	Sostanze attive	Forma farmaceutica	Specie DPA	Specie non DPA	Vie di somministrazione	Tempi di attesa	Codice AIC	ATCvet	Uso (da ATCvet)
AMINOPENICILLINE IN ASSOCIAZIONE CON INIBITORI DELLE BETA-LATTAMASI	amoxicillina + acido clavulanico	NICILAN 400 mg100 mg tablets for dogs	Potassium clavulanate + Amoxicillin trihydrate	Compressa		Cane	Uso orale		104274016 104274028 104274030 104274042 104274055 104274067 104274079 104274081 104274093 104274105 104274117 104274129 104274131 104274143 104274156 104274168	QJ01CR02	Sistemico
		Nisamox 250 mg Tablets for Dogs Nisamox 250 mg compresse per cani e gatti	Potassium clavulanate + Amoxicillin trihydrate	Compressa		Cane	Uso orale		103672010 103672022 103672034 103672046 103672059 103672061 103672073 103672085 103672097 103672109	QJ01CR02	Sistemico
		Nisamox 40 mg10 mg Tablets for Dogs and Cats Nisamox 50 mg compresse per cani e gatti	Potassium clavulanate + Amoxicillin trihydrate	Compressa		Cane, Gatto	Uso orale		103672010 103672022 103672034 103672046 103672059 103672061 103672073 103672085 103672097 103672109	QJ01CR02	Sistemico
		Nisamox 500 mg Compresse Palatabili per Cani Nisamox Palatable Tablets 500mg	Amoxicillin trihydrate + Potassium clavulanate	Compressa		Cane	Uso orale		103956013 103956025 103956037 103956049	QJ01CR02	Sistemico
		Nisinject 140 mgml + 35 mgml sospensione iniettabile Nisinject 140mgml + 35 mgml suspension for injection	Amoxicillin trihydrate + Potassium clavulanate	Sospensione iniettabile	Bovini	Cane	Uso intramuscolare; Uso sottocutaneo	Bovini: carne 42 giorni (uso intramuscolare); latte 60 ore (uso intramuscolare)	103680017 103680029	QJ01CR02	Sistemico
		NOROCLAV INJECTION Synuclav 140 mgml + 35 mgml Suspension for Injection	Amoxicillin trihydrate + Potassium clavulanate	Sospensione iniettabile	Bovini	Cane	Uso intramuscolare; Uso sottocutaneo	Bovini: carne 42 giorni (uso intramuscolare); latte 60 ore (uso intramuscolare)	103678013 103678025	QJ01CR02	Sistemico
		Strenzen 500125mgg Powder for use in drinking water	Clavulanic acid + Amoxicillin	Polvere per somministrazione in acqua da bere	Suino		Somministrazione in acqua da bere	Suino: carne 1 giorni (somministrazione in acqua da bere)	104369018 104369020	QJ01CR02	Sistemico
		Synulox 40 mgml + 10 mgml powder for oral suspension for dogs and cats Synulox Palatable Drops 40 mgml + 10 mgml polvere per sospensione orale per cani e gatti	Potassium clavulanate + Amoxicillin trihydrate	Polvere per sospensione orale		Cane, Gatto	Uso orale		100021017 100021029 100021031 100021043 100021056 100021068 100021070 100021082	QJ01CR02	Sistemico
		Synulox Lactating Cow Intramammary suspension Synulox sospensione intramammaria	Amoxicillin trihydrate + Potassium clavulanate + Prednisolone	Sospensione intramammaria	Bovini		Per uso intramammario	Bovini: carne 7 giorni (uso intramammario); latte 84 ore (uso intramammario)	102475011	QJ51RV01	Intramammario
		SYNULOX Palatable Tablets 250 mg compresse appetibili per cani e gatti Synulox 250 mg tablets for dogs and cats	Potassium clavulanate + Amoxicillin trihydrate	Compressa		Cane, Gatto	Uso orale		100021017 100021029 100021031 100021043 100021056 100021068 100021070 100021082	QJ01CR02	Sistemico
		SYNULOX Palatable Tablets 50 mg compresse appetibili per cani e gatti Synulox 50 mg tablets for dogs and cats	Potassium clavulanate + Amoxicillin trihydrate	Compressa		Cane, Gatto	Uso orale		100021017 100021029 100021031 100021043 100021056 100021068 100021070 100021082	QJ01CR02	Sistemico

Categoria C - ATTENZIONE

Classe di antibiotici	Molecola	Specialità veterinaria	Sostanze attive	Forma farmaceutica	Specie DPA	Specie non DPA	Vie di somministrazione	Tempi di attesa	Codice AIC	ATCvet	Uso (da ATCvet)
AMINOPENICILLINE IN ASSOCIAZIONE CON INIBITORI DELLE BETA-LATTAMASI	amoxicillina + acido clavulanico	SYNULOX Palatable Tablets 500 mg compresse appetibili per cani e gatti Synulox 500 mg tablets for dogs	Potassium clavulanate + Amoxicillin trihydrate	Compressa		Cane	Uso orale		100021017 100021029 100021031 100021043 100021056 100021068 100021070 100021082	QJ01CR02	Sistemico
		Synulox sospensione iniettabile 140 mgml + 35 mgml per suini bovini cani e gatti	Amoxicillin + Clavulanic acid	Sospensione iniettabile	Bovini, Suino	Cane, Gatto	Uso intramuscolare; Uso sottocutaneo	Bovini: carne 28 giorni (uso intramuscolare) Bovini (bovini da carne): carne 28 giorni (uso sottocutaneo) Bovini (bovini da latte): latte 120 ore (uso intramuscolare) Suino: carne 19 giorni (uso intramuscolare)	100023011 100023023 100023035 100023047 100023050 100023062	QJ01CR02	Sistemico
		Twinox 200 mg50 mg chewable tablets for cats and dogs	Amoxicillin trihydrate + Potassium clavulanate	Compressa masticabile		Cane, Gatto	Uso orale		105545014 105545026 105545038 105545040 105545053 105545065 105545077 105545089 105545091 105545103 105545115	QJ01CR02	Sistemico
		Twinox 40 mg10 mg chewable tablets for cats and dogs	Amoxicillin trihydrate + Potassium clavulanate	Compressa masticabile		Cane, Gatto	Uso orale		105545014 105545026 105545038 105545040 105545053 105545065 105545077 105545089 105545091 105545103 105545115	QJ01CR02	Sistemico
		Twinox 400 mg100 mg chewable tablets for dogs	Amoxicillin trihydrate + Potassium clavulanate	Compressa masticabile		Cane	Uso orale		105545014 105545026 105545038 105545040 105545053 105545065 105545077 105545089 105545091 105545103 105545115	QJ01CR02	Sistemico
	ampicillina + sulbactam	Nessuna specialità veterinaria autorizzata in Italia									
AMFENICOLI	cloramfenicolo	Cefenicol Cefenicol CA 5 mgml eye drops solution for dogs and cats	Chloramphenicol	Collirio, soluzione		Cane, Gatto	Uso oftalmico		105839017	QS01AA01	Oftalmico
		Cefenidex CADEX 2 mgml + 1 mgml eye drops solution for dogs and cats	Dexamethasone sodium phosphate + Chloramphenicol	Collirio, soluzione		Cane, Gatto	Uso oftalmico		105840019	QS01CA01	Oftalmico
	nicolo	Alphaflorosol 100 mgml solution for use in drinking water for chickens and pigs	Florfenicol	Soluzione per somministrazione in acqua da bere	Suino, Pollo (gallina)		Somministrazione in acqua da bere	Pollo: carne 8 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte); organi 8 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Suino: carne 23 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte); organi 23 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte)	105175018 105175020	QJ01BA90	Sistemico

Categoria C - ATTENZIONE

Classe di antibiotici	Molecola	Specialità veterinaria	Sostanze attive	Forma farmaceutica	Specie DPA	Specie non DPA	Vie di somministrazione	Tempi di attesa	Codice AIC	ATCvet	Uso (da ATCvet)
AMFENICOLI	florfe	ALPHAFLOROVET Alphaflorovet 20 mgg Premix for Medicated Feeding Stuff for Pigs	Florfenicol	Premiscela per alimenti medicamentosi	Suino		Uso orale	Suino: carne 16 giorni (somministrazione con il mangime)	105245017	QJ01BA90	Sistemico
	florfenicolo	AMPHEN 200 mgg granulato per uso in acqua da bere per suini Amphen 200 mgg granules for use in drinking water for pigs	Florfenicol	Granulato per uso in acqua da bere	Suino		Somministrazione in acqua da bere	Suino: carne 20 giorni (somministrazione in acqua da bere, somministrazione in acqua da bere/latte)	104505019 104505021 104505033 105272013 105272025	QJ01BA90	Sistemico
		AMPHEN 200 mgg granulato per uso in acqua da bere per suini Amphen 200 mgg Granuals for Use in Drinking Water for Pigs	Florfenicol	Granulato per uso in acqua da bere	Suino		Somministrazione in acqua da bere	Suino: carne 20 giorni (somministrazione in acqua da bere, somministrazione in acqua da bere/latte)	104505019 104505021 104505033 105272013 105272025	QJ01BA90	Sistemico
		AMPHEN 200 MGML SUSPENSION FOR USE IN DRINKING WATER FOR PIGS AMPHEN 200 mgml sospensione per uso in acqua da bere per suini	Florfenicol	Sospensione per somministrazione in acqua da bere	Suino		Somministrazione in acqua da bere	Suino: carne 20 giorni (uso orale)	105726018	QJ01BA90	Sistemico
		AQUAFLOR 500 MGG Aquaflor 500 mg premix for medicated feeding stuff	Florfenicol	Premiscela per alimenti medicamentosi	Trota iridea		Somministrazione con il mangime	Pesci (trota): carne 135 gradi giorno (somministrazione con il mangime)	104542016	QJ01BA90	Sistemico
		Belaflor 200 mgml solution for use in drinking water for chickens and pigs Belaflor 200 mgml soluzione per uso in acqua da bere per polli e suini	Florfenicol	Soluzione per somministrazione in acqua da bere	Pollo (pollo da carne), Pollo (pollastra), Suino		Somministrazione in acqua da bere	Pollo: carne 8 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino: carne 23 giorni (somministrazione in acqua da bere)	105690010 105690022	QJ01BA90	Sistemico
		CADOREX CADOREX 300 mgml Solution for injection for cattle pigs and sheep	Florfenicol	Soluzione iniettabile	Bovini, Ovino, Suino		Uso intramuscolare; Uso sottocutaneo	Bovini: carne 30 giorni (uso intramuscolare); carne 44 giorni (uso sottocutaneo) Ovini: carne 39 giorni (uso intramuscolare) Suino: carne 18 giorni (uso intramuscolare)	104955012 104955036	QJ01BA90	Sistemico
		CADOREX 100 mgml SOLUTION FOR USE IN DRINKING WATER FOR PIGS AND CHICKENS	Florfenicol	Soluzione per somministrazione in acqua da bere	Suino, Polli		Somministrazione in acqua da bere	Pollo: carne 3 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino: carne 20 giorni (somministrazione in acqua da bere)	105887018 105887020	QJ01BA90	Sistemico
		EFFE 70 300 mgml soluzione iniettabile per bovini ovini e suini	Florfenicol	Soluzione iniettabile	Bovini, Ovino, Suino		Uso intramuscolare; Uso sottocutaneo	Bovini: carne 30 giorni (uso intramuscolare); carne 44 giorni (uso sottocutaneo) Ovini: carne 39 giorni (uso intramuscolare) Suino: carne 18 giorni (uso intramuscolare)	105293017 105293029 105293031	QJ01BA90	Sistemico
		FLORDOFEN 300 mgml Soluzione iniettabile per bovini e suini Flordofen 300 mgml solution for injection for cattle and pigs	Florfenicol	Soluzione iniettabile	Suini (da ingrasso), Bovini		Uso intramuscolare; Uso sottocutaneo	Bovini: carne 30 giorni (uso intramuscolare); carne 44 giorni (uso sottocutaneo) Suino: carne 18 giorni (uso intramuscolare)	104588013 104588025 104588037 104588049	QJ01BA90	Sistemico
		Florfeksyl 300 mgml solution for injection for cattle sheep and pigs Florfeksyl 300 mgml soluzione iniettabile per bovini ovini e suini	Florfenicol	Soluzione iniettabile	Bovini, Ovino, Suino		Uso intramuscolare; Uso sottocutaneo	Bovini: carne 30 giorni (uso intramuscolare); carne 44 giorni (uso sottocutaneo) Ovini: carne 39 giorni (uso intramuscolare) Suino: carne 18 giorni (uso intramuscolare)	105645016 105645028	QJ01BA90	Sistemico
		FLORFEN	Florfenicol	Soluzione iniettabile	Bovini, Suino		Uso intramuscolare	Bovini: carne 30 giorni (uso intramuscolare) Suino: carne 18 giorni (uso intramuscolare)	104367014	QJ01BA90	Sistemico
		Florfenikel 300 mgml solution for injection for cattle and pigs	Florfenicol	Soluzione iniettabile	Bovini, Suino		Uso intramuscolare	Bovini: carne 34 giorni (uso intramuscolare) Suino: carne 18 giorni (uso intramuscolare)	104334014 104334026 104334038 104334040	QJ01BA90	Sistemico
		FLORFENIS 300 mgml solution for injection for cattle sheep and pigs SYVAFLOR	Florfenicol	Soluzione iniettabile	Bovini, Suino, Ovino		Uso intramuscolare; Uso sottocutaneo	Bovini: carne 30 giorni (uso intramuscolare); carne 44 giorni (uso sottocutaneo) Ovini: carne 39 giorni (uso intramuscolare) Suino: carne 18 giorni (uso intramuscolare)	105471015 105471027 105471039 105471041	QJ01BA90	Sistemico
		FLORFLU FlorFlu 300165 mgml solution for injection for cattle	Flunixin meglumine + Florfenicol	Soluzione iniettabile	Bovini		Uso sottocutaneo	Bovini: carne 46 giorni (uso sottocutaneo)	105488011 105488023	QJ01BA99	Sistemico
		Florgane 300 mg mL sospensione iniettabile per bovini e suini Florgane 300 mgml Suspension for Injection for Cattle and Pigs	Florfenicol	Sospensione iniettabile	Bovini, Suino		Uso intramuscolare	Bovini: carne 37 giorni (uso intramuscolare) Suino: carne 22 giorni (uso intramuscolare)	104155015 104155027 104155039 104155041 104155054 104155066 104155078 104155080	QJ01BA90	Sistemico
		FLORINJECT FLORINJECT 300 mgml solution for injection for cattle and pigs	Florfenicol	Soluzione iniettabile	Bovini, Suino		Uso intramuscolare; Uso sottocutaneo	Bovini: carne 30 giorni (uso intramuscolare); carne 44 giorni (uso sottocutaneo) Suino: carne 18 giorni (uso intramuscolare)	104547017	QJ01BA90	Sistemico
		FLORKEM 300 MGML SOLUTION FOR INJECTION FOR CATTLE AND PIGS	Florfenicol	Soluzione iniettabile	Bovini, Suino		Uso intramuscolare	Bovini: carne 37 giorni (uso intramuscolare) Suino: carne 18 giorni (uso intramuscolare)	104089014 104089026 104089038 104089040 104089053 104089065	QJ01BA90	Sistemico

Categoria C - ATTENZIONE

Classe di antibiotici	Molecola	Specialità veterinaria	Sostanze attive	Forma farmaceutica	Specie DPA	Specie non DPA	Vie di somministrazione	Tempi di attesa	Codice AIC	ATCvet	Uso (da ATCvet)
AMFENICOLI	florfenicolo	FLORON 300 MGML SOLUTION FOR INJECTION FOR CATTLE AND PIGS FLORON SOLUZIONE INIETTABILE	Florfenicol	Soluzione iniettabile	Bovini, Suino		Uso intramuscolare; Uso sottocutaneo	Bovini: carne 30 giorni (uso intramuscolare); carne 44 giorni (uso sottocutaneo) Suino: carne 18 giorni (uso intramuscolare)	104757012 104757024 104757036	QJ01BA90	Sistemico
		FLORON 40 MGG Floron 40 mgg Premix for Medicated Feeding Stuff for Swine	Florfenicol	Premiscela per alimenti medicamentosi	Suini (da ingrasso)		Somministrazione con il mangime	Suino (suini da ingrasso): carne 14 giorni (uso orale)	104192012 104192024 104192036 104192048	QJ01BA90	Sistemico
		Flortek 300 mgml solution for injection for cattle sheep and pigs KFlor 300 mgml soluzione iniettabile per bovini ovini e suini	Florfenicol	Soluzione iniettabile	Bovini, Ovino, Suino		Uso intramuscolare; Uso sottocutaneo	Bovini: carne 30 giorni (uso intramuscolare); carne 44 giorni (uso sottocutaneo) Ovini: carne 39 giorni (uso intramuscolare) Suino: carne 18 giorni (uso intramuscolare)	105642019 105642021	QJ01BA90	Sistemico
		FLORTEK 40 mgg premix for medicated feeding stuff for pigs KFLOR 40 mgg premiscela per alimenti medicamentosi per suini	Florfenicol	Premiscela per alimenti medicamentosi	Suini (da ingrasso)		Somministrazione con il mangime	Suino (suini da ingrasso): carne 14 giorni (somministrazione con il mangime)	105560015	QJ01BA90	Sistemico
		FLORTEKXIN 300165 MGML SOLUTION FOR INJECTION FOR CATTLE Flortekxin 300 mgml + 165 mgml soluzione iniettabile per bovini	Florfenicol + Flunixin	Soluzione iniettabile	Bovini		Uso sottocutaneo	Bovini: carne 46 giorni (uso sottocutaneo)	105753014 105753026	QJ01BA99	Sistemico
		FLORVETOL 300 mgmL Solution for injection for cattle FLORVETOL bovini soluzione iniettabile	Florfenicol	Soluzione iniettabile	Bovini		Uso intramuscolare; Uso sottocutaneo	Bovini: carne 30 giorni (uso intramuscolare); carne 44 giorni (uso sottocutaneo)	103780019 103780021 103780033 103780045 103780058	QJ01BA90	Sistemico
		Florvetol 300 mgmL solution for injection for pigs Florvetol Suini iniettabile	Florfenicol	Soluzione iniettabile	Suino		Uso intramuscolare	Suino: carne 18 giorni (uso intramuscolare)	103779017 103779029 103779031 103779043 103779056	QJ01BA90	Sistemico
		FLOXYME 50 mgml soluzione per uso in acqua da bere Floxyme 50 mgml solution for use in drinking water	Florfenicol	Soluzione per somministrazione in acqua da bere	Suino		Somministrazione in acqua da bere	Suino: carne 20 giorni (somministrazione in acqua da bere)	104445010 104445022	QJ01BA	Sistemico
		Introflor Vet 300 mgml solution for injection for cattle sheep and pigs	Florfenicol	Soluzione iniettabile	Bovini, Ovino, Suino		Uso intramuscolare; Uso sottocutaneo	Bovini: carne 30 giorni (uso intramuscolare); carne 44 giorni (uso sottocutaneo) Ovini: carne 39 giorni (uso intramuscolare) Suino: carne 18 giorni (uso intramuscolare)	105966016	QJ01BA90	Sistemico
		MYCOFLOR 200 mgml solution for use in drinking water for pigs	Florfenicol	Soluzione per somministrazione in acqua da bere	Suino		Somministrazione in acqua da bere	Suino: carne 23 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte)	104868017 104868029	QJ01BA90	Sistemico
		MYCOFLOR 300 mgml solution for injection for cattle and pigs Mycoflor 300 mgml soluzione iniettabile per bovini e suini	Florfenicol	Soluzione iniettabile	Bovini, Suino		Uso intramuscolare	Bovini: carne 34 giorni (uso intramuscolare) Suino (suini da ingrasso): carne 18 giorni (uso intramuscolare)	104333012 104333024 104333036 104333048	QJ01BA90	Sistemico
		Neptra 167 mgml florfenicol + 167 mgml terbinafine hydrochloride + 22 mgml mometasone furoate Ear drops solution in singledose container	Florfenicol + Terbinafine hydrochloride + Mometasone furoate	Gocce auricolari, soluzione in contenitore monodose		Cane	Uso auricolare		105458018 105458020 105458032 105458044	QS02CA91	Auricolare
		NIFENCOL 100 mgml soluzione per uso in acqua da bere per suini Nifencol 100 mgml solution for use in drinking water for pigs	Florfenicol	Soluzione per somministrazione in acqua da bere	Suino		Somministrazione in acqua da bere	Suino: carne 20 giorni (somministrazione in acqua da bere)	104816018 104816020 104816032	QJ01BA90	Sistemico
		Norfenicol 300 mgml Solution for Injection for Cattle and Pigs Norfenicol 300 mgml soluzione iniettabile per Bovini e Suini	Florfenicol	Soluzione iniettabile	Bovini, Suino		Uso intramuscolare; Uso sottocutaneo	Bovini: carne 39 giorni (uso intramuscolare); carne 44 giorni (uso sottocutaneo) Bovini (bovini da carne): carne 44 giorni (uso sottocutaneo) Suino: carne 22 giorni (uso intramuscolare)	104385012 104385024 104385036 104385048 104385051 104385063 104385075 104385087	QJ01BA90	Sistemico
		NUFLOR 300 MGML SOLUZIONE INIETTABILE NUFLOR 300 mgml solution for injection for cattle and sheep	Florfenicol	Soluzione iniettabile	Bovini, Ovino		Uso intramuscolare; Uso sottocutaneo	Bovini: carne 30 giorni (uso intramuscolare); carne 44 giorni (uso sottocutaneo) Ovini: carne 39 giorni (uso intramuscolare)	101595015 101595039 101595041	QJ01BA90	Sistemico
		NUFLOR 40 MGG Nuflor 40 mgg Premix for Medicated Feeding Stuff for Swine	Florfenicol	Premiscela per alimenti medicamentosi	Suino		Uso orale	Suino (suini da ingrasso): carne 14 giorni (somministrazione con il mangime)	103912010 103912022	QJ01BA90	Sistemico
		Nuflor Minidose 450 mgml solution for injection for cattle	Florfenicol	Soluzione iniettabile	Bovini		Uso sottocutaneo; Uso intramuscolare	Bovini: carne 37 giorni (uso intramuscolare); carne 64 giorni (uso sottocutaneo)	104002011 104002023 104002035	QJ01BA90	Sistemico

Categoria C - ATTENZIONE

Classe di antibiotici	Molecola	Specialità veterinaria	Sostanze attive	Forma farmaceutica	Specie DPA	Specie non DPA	Vie di somministrazione	Tempi di attesa	Codice AIC	ATCvet	Uso (da ATCvet)
AMFENICOLI	florfenicolo	NUFLOR SUINI INIETTABILE NUFLOR Swine 300 mgml Solution for injection	Florfenicol	Soluzione iniettabile	Suino		Uso intramuscolare	Suino: carne 18 giorni (uso intramuscolare)	103258012 103258024 103258036 103258048 103258051	QJ01BA90	Sistemico
		Osurnia 10 mg10 mg1 mg Ear gel	Terbinafine + Florfenicol + Betamethasone acetate	Gel auricolare		Cane	Uso auricolare		104813011 104813023 104813035 104813047	QS02CA90	Auricolare
		RESFLOR 300165 MGML SOLUTION FOR INJECTION FOR CATTLE RESFLOR 300165 mgml soluzione iniettabile per bovini	Florfenicol + Flunixin meglumine	Soluzione iniettabile	Bovini		Uso sottocutaneo	Bovini: carne 46 giorni (uso sottocutaneo)	103876013 103876025	QJ01BA99	Sistemico
		SELECTAN 300 mgml solution for injection for cattle and pigs	Florfenicol	Soluzione iniettabile	Bovini, Suino		Uso intramuscolare	Bovini: carne 30 giorni (uso intramuscolare) Suino: carne 18 giorni (uso intramuscolare)	103902019 103902021 103902033 103902045 103902058 103902060 103902072 103902084	QJ01BA90	Sistemico
		Shotaflor 300 mgml solution for injection for cattle	Florfenicol	Soluzione iniettabile	Bovini		Uso sottocutaneo; Uso intramuscolare	Bovini: carne 30 giorni (uso intramuscolare); carne 44 giorni (uso sottocutaneo); organi 30 giorni (uso intramuscolare); organi 44 giorni (uso sottocutaneo)	104064011 104064023 104064035	QJ01BA90	Sistemico
		Shotaflor 300 mgml solution for injection for pigs	Florfenicol	Soluzione iniettabile	Suino		Uso intramuscolare	Suino: carne 18 giorni (uso intramuscolare); organi 18 giorni (uso intramuscolare)	104065014 104065026 104065038	QJ01BA90	Sistemico
		Spiroflunix 300 mgml + 165 mgml solution for injection for cattle Spiroflunix 300 mgml + 165 mgml soluzione iniettabile per bovini	Florfenicol + Flunixin meglumine	Soluzione iniettabile	Bovini		Uso sottocutaneo	Bovini: carne 46 giorni (uso sottocutaneo)	105752012 105752024	QJ01BA99	Sistemico
		Zeleris 400 mgml florfenicol + 5 mgml meloxicam Solution for injection	Florfenicol + Meloxicam	Soluzione iniettabile	Bovini		Uso sottocutaneo	Bovini: carne 56 giorni (uso sottocutaneo)	105120012 105120024 105120036	QJ01BA99	Sistemico
	tiamfenicolo	CHEMITAF	Thiamphenicol	Soluzione orale	Pollo (pollo da carne)		Somministrazione in acqua da bere	Pollo (broiler): carne 4 giorni (somministrazione in acqua da bere)	104162019 104162021 104162033	QJ01BA02	Sistemico
		DENFUS SPRAY spray cutaneo per bovini	Thiamphenicol	Spray cutaneo, soluzione	Bovini		Uso cutaneo	Bovini: carne 0 giorni (uso cutaneo); latte 0 ore (uso cutaneo)	102411030	QD06AX	Dermatologico
		FLUIMASTIN 810 mg5 g pomata intramammaria per bovine in lattazione e in asciutta	Thiamphenicol glycinate acetylcysteine	Pomata intramammaria	Bovini (vacca in asciutta), Bovini (vacca in lattazione)		Per uso intramammario	Bovini (bovine /vacche in lattazione): carne 16 giorni (uso intramammario); latte 144 ore (uso intramammario); latte 168 ore (uso intramammario) Bovini (bovine/vacche in asciutta): carne 16 giorni (uso intramammario); latte 144 ore (uso intramammario); latte 168 ore (uso intramammario)	100255037 100255049 100255052	QJ51BA02	Intramammario
		TAF 25 250 mgml soluzione orale per uso in acqua da bere per polli da carne tacchini anatre e oche	Thiamphenicol	Soluzione orale	Oca, Suino, Tacchino, Pollo (pollo da carne), Anatra		Somministrazione con il mangime; Somministrazione in acqua da bere	Pollo (broiler): carne 4 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino: carne 6 giorni (somministrazione in acqua da bere) Uccelli (anatre): carne 4 giorni (somministrazione in acqua da bere) Uccelli (oche): carne 4 giorni (somministrazione con il mangime, somministrazione in acqua da bere) Uccelli (tacchino): carne 6 giorni (somministrazione in acqua da bere)	103552016 103552028 103552030	QJ01BA02	Sistemico
		TAF SPRAY 285 MGG CUTANEOUS SPRAY SOLUTION	Thiamphenicol	Spray cutaneo, soluzione	Bovini, Suino, Coniglio, Equide, Ovino, Caprino	Visone	Uso cutaneo	Non disponibile (specialità assente dall'elenco ministeriale)	Non presente nell'elenco ministeriale	QD06AX	Dermatologico
		TIRSAN OS	Thiamphenicol	Soluzione orale	Pollo (pollo da carne), Suino, Bovino (vitello lattante)		Somministrazione in acqua da bere/latte	Bovini (vitelli da latte): carne 35 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Pollo (broiler): carne 6 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Suino: carne 5 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte)	103444016 103444028 103444030 103444042	QJ01BA02	Sistemico
		TIRSAN POLVERE	Thiamphenicol	Polvere orale	Pollo (pollo da carne), Suino		Somministrazione con il mangime	Pollo (broiler): carne 8 giorni (somministrazione con il mangime) Suino: carne 5 giorni (somministrazione con il mangime)	102805013 102805025	QJ01BA02	Sistemico
		URFAMUCOL INIETTABILE liofilizzato e solvente per soluzione iniettabile per bovini e tacchini	Acetylcysteine + Thiamphenicol glycinate acetylcysteine	Liofilizzato e solvente per soluzione iniettabile	Bovini, Tacchino		Uso intramuscolare	Bovini: carne 20 giorni (uso intramuscolare); latte 168 ore (uso intramuscolare) Bovini: carne 20 giorni (uso intrauterino); latte 168 ore (uso intrauterino) Equidi (cavallo): carne 20 giorni (uso intramuscolare) Uccelli (tacchino): carne 15 giorni (uso intramuscolare)	100032010 100032022 100032034 100032046	QJ01BA52	Sistemico
		URFAMUCOL INIETTABILE liofilizzato e solvente per soluzione iniettabile per equini	Acetylcysteine + Thiamphenicol glycinate acetylcysteine	Liofilizzato e solvente per soluzione iniettabile	Cavallo		Uso intramuscolare	Bovini: carne 20 giorni (uso intramuscolare); latte 168 ore (uso intramuscolare) Bovini: carne 20 giorni (uso intrauterino); latte 168 ore (uso intrauterino) Equidi (cavallo): carne 20 giorni (uso intramuscolare) Uccelli (tacchino): carne 15 giorni (uso intramuscolare)	100032010 100032022 100032034 100032046	QJ01BA52	Sistemico
		URFAMUCOL INTRAUTERINO liofilizzato e solvente per irrigazioni intrauterine in bovine	Acetylcysteine + Thiamphenicol glycinate acetylcysteine	Soluzione intrauterina	Bovini		Uso intrauterino	Bovini: carne 20 giorni (uso intramuscolare); latte 168 ore (uso intramuscolare) Bovini: carne 20 giorni (uso intrauterino); latte 168 ore (uso intrauterino) Equidi (cavallo): carne 20 giorni (uso intramuscolare) Uccelli (tacchino): carne 15 giorni (uso intramuscolare)	100032010 100032022 100032034 100032046	QJ01BA52	Sistemico
		URFAMYCIN VET 250 mgml soluzione iniettabile per bovini caprini e suini	Thiamphenicol	Soluzione iniettabile	Bovini, Caprino, Suino		Uso intramuscolare; Uso endovenoso	Bovini: carne 10 giorni (uso intramuscolare, uso endovenoso); latte 120 ore (uso intramuscolare, uso endovenoso) Caprini: carne 16 giorni (uso intramuscolare, uso endovenoso); latte 120 ore (uso intramuscolare, uso endovenoso) Suino: carne 13 giorni (uso intramuscolare, uso endovenoso)	100385018 100385020 100385032 100385044	QJ01BA02	Sistemico

Categoria C - ATTENZIONE

Classe di antibiotici	Molecola	Specialità veterinaria	Sostanze attive	Forma farmaceutica	Specie DPA	Specie non DPA	Vie di somministrazione	Tempi di attesa	Codice AIC	ATCvet	Uso (da ATCvet)
MACROLIDI	eritromicina	DAIMERITRO 200 mgml + 50 mgml soluzione iniettabile ed orale per bovini suini polli escluse le ovaiole	Sulfamonomethoxine sodium + Erythromycin	Soluzione iniettabile	Polli, Bovini, Suino		Somministrazione in acqua da bere; Uso intramuscolare; Uso endovenoso	Bovini: carne 4 giorni (uso intramuscolare, uso endovenoso); latte 48 ore (uso intramuscolare, uso endovenoso) Pollo: carne 17 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino: carne 4 giorni (uso intramuscolare)	102006018 102006020	QJ01RA91	Sistemico
	eritromicina	Eritromicina 15 Chemifarma 150 mgg polvere orale per uso in acqua da bere per polli da carne tacchini e galline ovaiole	Erythromycin	Polvere per somministrazione in acqua da bere	Pollo (pollo da carne), Tacchino, Pollo (gallina ovaiola)		Somministrazione in acqua da bere	Pollo (broiler): carne 2 giorni (somministrazione in acqua da bere) Pollo (galline ovaiole): uova 5 giorni (somministrazione in acqua da bere) Uccelli (tacchino): carne 6 giorni (somministrazione in acqua da bere)	102937012 102937024 102937036	QJ01FA01	Sistemico
		Eritromicina 20 Chemifarma 200 mgg polvere orale per uso in acqua da bere per polli da carne tacchini e galline ovaiole	Erythromycin	Polvere orale	Pollo (pollo da carne), Pollo (gallina ovaiola), Tacchino		Uso orale	Pollo (broiler): carne 2 giorni (somministrazione in acqua da bere) Pollo (galline ovaiole): uova 5 giorni (somministrazione in acqua da bere) Uccelli (tacchino): carne 6 giorni (somministrazione in acqua da bere)	102936010 102936034 102936046	QJ01FA01	Sistemico
		ERITROMICINA 20 UNIONE COMMERCIALE LOMBARDA	Erythromycin	Polvere per somministrazione in acqua da bere	Pollo (gallina ovaiola), Polli		Somministrazione in acqua da bere	Pollo (galline ovaiole): uova 8 giorni (somministrazione in acqua da bere) Pollo: carne 8 giorni (somministrazione in acqua da bere)	102960010 102960022	QJ01FA01	Sistemico
		ERITROMICINA Doxal 150 mgg polvere orale per uso in acqua da bere per polli da carne e galline ovaiole	Erythromycin	Polvere per somministrazione in acqua da bere	Pollo (pollo da carne), Pollo (gallina ovaiola)		Somministrazione in acqua da bere	Pollo (broiler): carne 2 giorni (somministrazione in acqua da bere) Pollo (galline ovaiole): carne 5 giorni (somministrazione in acqua da bere); uova 5 giorni (somministrazione in acqua da bere)	102939016 102939028 102939030 102939042	QJ01FA01	Sistemico
		ERITROMICINA Doxal 200 mgg polvere orale per uso in acqua da bere per polli da carne broilers e galline ovaiole	Erythromycin	Polvere per somministrazione in acqua da bere	Pollo (pollo da carne), Pollo (gallina ovaiola)		Somministrazione in acqua da bere	Pollo (broiler): carne 2 giorni (somministrazione in acqua da bere) Pollo (galline ovaiole): carne 5 giorni (somministrazione in acqua da bere); uova 5 giorni (somministrazione in acqua da bere)	102939016 102939028 102939030 102939042	QJ01FA01	Sistemico
		Erytromycina 200 200 mgg premiscela per alimenti medicamentosi per polli da carne e galline ovaiole	Erythromycin	Premiscela per alimenti medicamentosi	Pollo (gallina ovaiola), Pollo (pollo da carne)		Somministrazione con il mangime	Pollo (broiler): carne 6 giorni (somministrazione con il mangime) Pollo (galline ovaiole): uova 5 giorni (somministrazione con il mangime)	102938040 102938065	QJ01FA01	Sistemico
	gamitromicina	Zactran 150 mgml Solution for injection cattle pigs	Gamithromycin	Soluzione iniettabile	Bovini, Suino		Uso intramuscolare; Uso sottocutaneo	Bovini: carne 64 giorni (uso sottocutaneo) Ovini: carne 29 giorni (uso sottocutaneo) Suino: carne 16 giorni (uso intramuscolare)	104011010 104011022 104011034 104011046 104011059 104011061 104011073	QJ01FA95	Sistemico
		Zactran 150 mgml Solution for injection cattle pigs sheep	Gamithromycin	Soluzione iniettabile	Bovini, Ovino, Suino		Uso intramuscolare; Uso sottocutaneo	Bovini: carne 64 giorni (uso sottocutaneo) Ovini: carne 29 giorni (uso sottocutaneo) Suino: carne 16 giorni (uso intramuscolare)	104011010 104011022 104011034 104011046 104011059 104011061 104011073	QJ01FA95	Sistemico
	oleandomicina	Nessuna specialità veterinaria autorizzata in Italia									
	spiramicina	FURAMIX	Spiramycin + Furazolidone	Polvere orale		Uccelli da gabbia e da voliera	Somministrazione con il mangime		103461012 103461024 103461036	QJ01RA91	Sistemico
		SPIRAMICINA 2 + FURALTADONE 2 FORMEVET	Spiramycin + Furaltadone	Polvere per soluzione orale		Colombo, Uccelli da gabbia e da voliera	Somministrazione in acqua da bere		103452013	QJ01RA91	Sistemico
		Spiramicina 20 Chemifarma 820000 UIg polvere solubile per uso in acqua da bere o in alimento liquido per polli da carne suini vitelli da latte	Spiramycin	Polvere per somministrazione in acqua da bere/latte	Bovino (vitello lattante), Pollo (pollo da carne), Suino		Somministrazione in acqua da bere/latte; Somministrazione in acqua da bere	Bovini (vitelli da latte): carne 31 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Pollo (broiler): carne 15 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino: carne 7 giorni (somministrazione in acqua da bere)	103409013 103409025 103409037	QJ01FA02	Sistemico
		Spiramicina 20 liquido Chemifarma 820000 UIml soluzione per uso in acqua da bere per suini e broilers	Spiramycin	Soluzione orale	Suino, Pollo (pollo da carne)		Uso orale	Pollo (broiler): carne 11 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino: carne 20 giorni (somministrazione in acqua da bere)	103405015 103405027 103405039	QJ01FA02	Sistemico
		SPIRAMICINA 20 UNIONE COMMERCIALE LOMBARDA 200mg g polvere per soluzione orale per vitelli da latte polli da carne escluso galline che producono uova destinate al consumo umano suini	Spiramycin	Polvere per soluzione orale	Bovini (vitello), Pollo (pollo da carne), Suino		Uso orale	Bovini (vitelli da latte): carne 31 giorni (somministrazione in acqua da bere) Bovini (vitelli): carne 31 giorni (somministrazione in acqua da bere) Pollo (broiler): carne 15 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino: carne 7 giorni (somministrazione in acqua da bere)	103398018 103398020 103398032	QJ01FA02	Sistemico
		SPIRAMICINA 5 Liquido CHEMIFARMA per Uccelli da gabbia e da voliera e Colombi viaggiatori	Spiramycin	Soluzione orale		Uccelli da gabbia e da voliera, Colombo	Uso orale		103425017 103425029 103425031	QJ01FA02	Sistemico
		SPIRAMIN 600000 UIml soluzione iniettabile per bovini	Spiramycin	Soluzione iniettabile	Bovini		Uso intramuscolare	Bovini: carne 62 giorni (uso intramuscolare); latte 14 giorni (uso intramuscolare)	101325013 101325025 101325037	QJ01FA02	Sistemico
		SPIRAVET 20 600000 UIml soluzione iniettabile per bovini	Spiramycin	Soluzione iniettabile	Bovini		Uso intramuscolare	Bovini: carne 75 giorni (uso intramuscolare); latte 27 mungiture (uso intramuscolare)	101537049 101537052 101537064	QJ01FA02	Sistemico

Categoria C - ATTENZIONE

Classe di antibiotici	Molecola	Specialità veterinaria	Sostanze attive	Forma farmaceutica	Specie DPA	Specie non DPA	Vie di somministrazione	Tempi di attesa	Codice AIC	ATCvet	Uso (da ATCvet)
MACROLIDI	spiramicina	SPIRAVET 200 Liquido 200 mgml soluzione orale per uso in acqua da bere per vitelli da latte suini e broilers	Spiramycin	Soluzione orale	Bovino (vitello lattante), Suino, Pollo (pollo da carne)		Uso orale	Bovini (vitelli da latte): carne 38 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Pollo (broiler): carne 15 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Suino: carne 20 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte)	102427010 102427022 102427034	QJ01FA02	Sistemico
		SPIRAZINA polvere per soluzione orale per vitelli da latte	Sulfadimidine + Spiramycin	Polvere orale	Bovino (vitello lattante)		Uso orale	Bovini (vitelli da latte): carne 48 giorni (uso orale)	102700010 102700022 102700034 102700046	QJ01RA91	Sistemico
		SPIROXAN 1500000 UI + 250 mg compresse per cani e gatti	Metronidazole + Spiramycin	Compressa		Cane, Gatto	Uso orale		104380011 104380023	QJ01RA91	Sistemico
		SPIROXAN 750000 UI + 125 mg compresse per cani e gatti	Metronidazole + Spiramycin	Compressa		Cane, Gatto	Uso orale		104380011 104380023	QJ01RA91	Sistemico
		SPIZOBACTIN Spizobactin 750000 IU 125 mg chewable tablets for dogs	Metronidazole + Spiramycin	Compressa masticabile		Cane	Uso orale		105057018 105057020 105057032	QJ01RA04	Sistemico
		SPIZOBACTIN Spizobactin 1500000 IU 250 mg chewable tablets for dogs	Metronidazole + Spiramycin	Compressa masticabile		Cane	Uso orale		105057018 105057020 105057032	QJ01RA04	Sistemico
		Spizobactin 3000000 IU 500 mg chewable tablets for dogs	Metronidazole + Spiramycin	Compressa masticabile		Cane	Uso orale		105057018 105057020 105057032	QJ01RA04	Sistemico
		Stomorgyl 10 750000 UI125 mg compresse per cani e gatti	Metronidazole + Spiramycin	Compressa		Cane, Gatto	Uso orale		101332017 101332029 101332031	QJ01RA04	Sistemico
		Stomorgyl 2 150000 UI25 mg compresse per cani e gatti	Metronidazole + Spiramycin	Compressa		Cane, Gatto	Uso orale		101332017 101332029 101332031	QJ01RA04	Sistemico
		Stomorgyl 20 1500000 UI250 mg compresse per cani e gatti	Spiramycin + Metronidazole	Compressa		Cane, Gatto	Uso orale		101332017 101332029 101332031	QJ01RA04	Sistemico
		Tetraciclina 20 Spiramicina 10 CHEMIFARMA 200 mgg + 100 mgg polvere per soluzione orale per uccelli da gabbia e da voliera	Spiramycin + Tetracycline	Polvere orale		Uccelli da gabbia e da voliera	Somministrazione in acqua da bere		102906017 102906029	QJ01RA90	Sistemico
		TETRASPIRAL	Oxytetracycline + Nicotinic acid + Spiramycin + Thiamine hydrochloride + Pyridoxine hydrochloride + Riboflavin	Polvere orale		Uccelli da gabbia e da voliera	Somministrazione con il mangime		103462014 103462026 103462038	QJ01RA90	Sistemico
	tildipirosina	Zuprevo 180 mgml Solution for injection	Tildipirosin	Soluzione iniettabile	Bovini		Uso sottocutaneo	Bovini: carne 47 giorni (uso sottocutaneo) Suino: carne 9 giorni (uso intramuscolare)	104280019 104280021 104280033 104280045 104280058 104280060 104280072 104280084	QJ01FA96	Sistemico
		Zuprevo 40 mgml Solution for injection	Tildipirosin	Soluzione iniettabile	Suino		Uso intramuscolare	Bovini: carne 47 giorni (uso sottocutaneo) Suino: carne 9 giorni (uso intramuscolare)	104280019 104280021 104280033 104280045 104280058 104280060 104280072 104280084	QJ01FA96	Sistemico
	tilmicosina	HYMATIL 300 HYMATIL 300 mgml Solution for injection for cattle	Tilmicosin	Soluzione iniettabile	Bovini, Ovino		Uso sottocutaneo	Bovini (bovini da carne): carne 70 giorni (uso sottocutaneo) Bovini (bovini da latte): latte 36 giorni (uso sottocutaneo) Ovini: carne 42 giorni (uso sottocutaneo) Ovini (ovini/pecore per prod latte): latte 18 giorni (uso sottocutaneo)	104125012 104125024 104125036	QJ01FA91	Sistemico
		MICLOZAN 200 Premix 200 mgg premiscela per alimenti medicamentosi per suini e conigli	Tilmicosin	Premiscela per alimenti medicamentosi	Coniglio, Suino		Uso orale	Conigli: carne 4 giorni (uso orale) Suino (suini da ingrasso): carne 21 giorni (uso orale) Suino: carne 21 giorni (uso orale)	104086018 104086020	QJ01FA91	Sistemico
		MICLOZAN 300 Iniettabile 300 mgml soluzione iniettabile per bovini e ovini	Tilmicosin	Soluzione iniettabile	Bovini, Ovino		Uso sottocutaneo	Bovini: carne 70 giorni (uso sottocutaneo); latte 36 giorni (uso sottocutaneo) Ovini: carne 42 giorni (uso sottocutaneo); latte 18 giorni (uso sottocutaneo)	104235015 104235027 104235039 104235041 104235054	QJ01FA91	Sistemico
		MICOTIL 300 300 mgml soluzione iniettabile per bovini e ovini	Tilmicosin	Soluzione iniettabile	Ovino, Bovini		Uso sottocutaneo	Bovini: carne 70 giorni (uso sottocutaneo); latte 36 giorni (uso sottocutaneo) Bovini: carne 70 giorni (uso sottocutaneo) Bovini (bovini da carne): carne 70 giorni (uso sottocutaneo) Bovini (bovini da latte): latte 36 giorni (uso sottocutaneo) Ovini: carne 42 giorni (uso sottocutaneo); latte 18 giorni (uso sottocutaneo)	101150011 101150035 101150047	QJ01FA91	Sistemico
		Pulmotil AC 250 mgmL concentrate for oral solution for use in drinking water or milk replacer for chickens turkeys pigs and calves	Tilmicosin	Concentrato per soluzione orale	Polli, Tacchino, Suino, Bovini (preruminante)		Uso orale	Bovini (vitelli): carne 42 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Pollo: carne 12 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Suino: carne 14 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Uccelli (tacchino): carne 19 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte)	102570013 102570025	QJ01FA91	Sistemico

Categoria C - ATTENZIONE

Classe di antibiotici	Molecola	Specialità veterinaria	Sostanze attive	Forma farmaceutica	Specie DPA	Specie non DPA	Vie di somministrazione	Tempi di attesa	Codice AIC	ATCvet	Uso (da ATCvet)
MACROLIDI	tilmicosina	Pulmotil G200 Premix for medicated feeding stuff	Tilmicosin	Premiscela per alimenti medicamentosi	Coniglio, Suino		Uso orale	Conigli: carne 4 giorni (somministrazione con il mangime) Suino: carne 21 giorni (somministrazione con il mangime)	102723018 102723020	QJ01FA91	Sistemico
		TILDOSIN 250 mgml soluzione per uso nellacqua da bere o nel latte ricostituito per bovini suini polli e tacchini Tildosin 250 mgml Solution for Use in Drinking Water or Milk Replacer for Cattle Pigs Chickens and Turkeys	Tilmicosin	Soluzione per somministrazione in acqua da bere	Polli, Suino, Tacchino, Bovini		Uso orale	Bovini (vitelli): carne 42 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Pollo (broiler): carne 12 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino: carne 14 giorni (somministrazione in acqua da bere) Uccelli (tacchino): carne 19 giorni (somministrazione in acqua da bere)	105096010 105096022	QJ01FA91	Sistemico
		Tilkomay 300 mgml + 90 mgml solution for injection Tilkomay 300 mgml + 90 mgml soluzione iniettabile	Tilmicosin + Ketoprofen	Soluzione iniettabile	Bovini (vitello)		Uso sottocutaneo	Bovini (vitelli): carne 93 giorni (uso sottocutaneo)	105151017 105151029 105151031	QJ01FA99	Sistemico
		TILMICOSIN CALIER 250 mgml Concentrate for Oral Solution for use in drinking water or milk replacer TILMICOSINA CALIER 250 mgml soluzione per somministrazione in acqua da berelatte	Tilmicosin phosphate	Soluzione per somministrazione in acqua da bere/latte	Polli, Tacchino, Suino, Bovini (preruminante)		Somministrazione in acqua da bere/latte	Bovini (vitelli): carne 42 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Pollo: carne 12 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Suino: carne 14 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Uccelli (tacchino): carne 19 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte)	105346011 105346023	QJ01FA91	Sistemico
		Tilmicosol 250 mgml Solution for Use in Drinking WaterMilk Tilmicosol 250 mgml soluzione per uso in acqua da bere latte	Tilmicosin	Soluzione per somministrazione in acqua da bere/latte	Pollo (gallina), Suino, Bovini, Tacchino		Somministrazione in acqua da bere/latte	Bovini (vitelli): carne 42 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Pollo: carne 12 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino: carne 14 giorni (somministrazione in acqua da bere) Uccelli (tacchino): carne 19 giorni (somministrazione in acqua da bere)	105217018 105217020 105217032 105217044	QJ01FA91	Sistemico
		TILMINJECT 300 mgml solution for injection for cattle and ovine TILMINJECT 300 mgml soluzione iniettabile per bovini e ovini	Tilmicosin	Soluzione iniettabile	Bovini, Ovino		Uso sottocutaneo	Bovini: carne 70 giorni (uso sottocutaneo); latte 36 giorni (uso sottocutaneo); organi 70 giorni (uso sottocutaneo) Ovini: carne 42 giorni (uso sottocutaneo); latte 18 giorni (uso sottocutaneo); organi 42 giorni (uso sottocutaneo)	105294019 105294021	QJ01FA91	Sistemico
		TILMIPRIL 300 MG TILMIPRIL 300 mgml Solution for injection for cattle	Tilmicosin	Soluzione iniettabile	Bovini, Ovino		Uso sottocutaneo	Bovini: carne 70 giorni (uso sottocutaneo); latte 36 giorni (uso sottocutaneo) Bovini: latte 36 giorni (uso sottocutaneo) Bovini (bovini da carne): carne 70 giorni (uso sottocutaneo) Ovini: carne 42 giorni (uso sottocutaneo); latte 18 giorni (uso sottocutaneo) Ovini (ovine/pecore femm adulte): latte 18 giorni (uso sottocutaneo)	104126014 104126026 104126038	QJ01FA91	Sistemico
		TILMISONE 300 mgml Solution for injection for cattle Tilmisone 300 mgml soluzione iniettabile per bovini e ovini	Tilmicosin	Soluzione iniettabile	Bovini, Ovino		Uso sottocutaneo	Bovini: carne 70 giorni (uso sottocutaneo); latte 36 giorni (uso sottocutaneo) Ovini: carne 42 giorni (uso sottocutaneo); latte 18 giorni (uso sottocutaneo)	104127016 104127028 104127030	QJ01FA91	Sistemico
		Tilmovet 100 gkg Premix Premix for medicated feeding stuff Tilmovet 100 gkg premiscela per mangimi medicati per suini e conigli	Tilmicosin	Premiscela per alimenti medicamentosi	Suino, Coniglio		Somministrazione con il mangime	Conigli: carne 4 giorni (somministrazione con il mangime) Suino (suini da ingrasso): carne 21 giorni (somministrazione con il mangime)	103990014 103990026	QJ01FA91	Sistemico
		TILMOVET 100mgg granuli per suini Tilmovet 100 mgg Granules	Tilmicosin	Granulato	Suino		Uso orale	Suino: carne 21 giorni (somministrazione con il mangime) Suino (suini da ingrasso): carne 21 giorni (somministrazione con il mangime)	104139011 104139023	QJ01FA91	Sistemico
		Tilmovet 200 gkg Premix for medicated feeding stuff Tilmovet 200 gkg premiscela per mangimi medicati per suini e conigli	Tilmicosin	Premiscela per alimenti medicamentosi	Suino, Coniglio		Somministrazione con il mangime	Conigli: carne 4 giorni (somministrazione con il mangime) Suino (suini da ingrasso): carne 21 giorni (somministrazione con il mangime)	103989012 103989024 103989036	QJ01FA91	Sistemico
		Tilmovet 250 mgml Concentrate for oral solution Tilmovet 250 mgml concentrato per soluzione orale per suini polli tacchini e bovini	Tilmicosin	Concentrato per soluzione orale	Suino, Tacchino, Polli, Bovini (vitello)		Uso orale	Bovini (vitelli): carne 42 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Pollo: carne 12 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino: carne 14 giorni (somministrazione in acqua da bere) Uccelli (tacchino): carne 19 giorni (somministrazione in acqua da bere)	103959019 103959021	QJ01FA91	Sistemico
		Tilmovet 300 mgml Solution for Injection for cattle and sheep Tilmovet 300 mgml soluzione iniettabile per bovini e ovini	Tilmicosin	Soluzione iniettabile	Bovini, Ovino		Uso sottocutaneo	Bovini: carne 70 giorni (uso sottocutaneo); latte 36 giorni (uso sottocutaneo); organi 70 giorni (uso sottocutaneo) Ovini: carne 42 giorni (uso sottocutaneo); latte 18 giorni (uso sottocutaneo); organi 42 giorni (uso sottocutaneo)	105193015 105193027	QJ01FA91	Sistemico
		Tilmovet 40 gkg Premix Premix for medicated feeding stuff Tilmovet 40 gkg premiscela per mangimi medicati per suini e conigli	Tilmicosin	Premiscela per alimenti medicamentosi	Suino, Coniglio		Somministrazione con il mangime	Conigli: carne 4 giorni (somministrazione con il mangime) Suino: carne 21 giorni (somministrazione con il mangime) Suino (suini da ingrasso): carne 21 giorni (somministrazione con il mangime)	104000017 104000029	QJ01FA91	Sistemico
	tromicina	Chanaxin 100 mgml Solution for injection	Tulathromycin	Soluzione iniettabile	Bovini, Ovino, Suino		Uso intramuscolare; Uso sottocutaneo	Non disponibile (specialità assente dall'elenco ministeriale)	Non presente nell'elenco ministeriale	QJ01FA94	Sistemico
		DAXTON 100 mgml solution for injection for cattle pigs and sheep	Tulathromycin	Soluzione iniettabile	Bovini, Suino, Ovino		Uso sottocutaneo; Uso intramuscolare	Bovini: carne 22 giorni (uso sottocutaneo) Ovini (ovine/pecore femm adulte): carne 16 giorni (uso intramuscolare) Suino: carne 13 giorni (uso intramuscolare)	105758027 105758039	QJ01FA94	Sistemico
		DORAXX 100 mgml soluzione iniettabile per bovini suini e ovini Doraxx 100 mgml solution for injection for cattle pigs and sheep	Tulathromycin	Soluzione iniettabile	Bovini, Suino, Ovino		Uso sottocutaneo; Uso intramuscolare	Bovini: carne 22 giorni (uso sottocutaneo) Ovini: carne 16 giorni (uso intramuscolare) Suino: carne 13 giorni (uso intramuscolare)	105510010 105510022	QJ01FA94	Sistemico

Categoria C - ATTENZIONE

Classe di antibiotici	Molecola	Specialità veterinaria	Sostanze attive	Forma farmaceutica	Specie DPA	Specie non DPA	Vie di somministrazione	Tempi di attesa	Codice AIC	ATCvet	Uso (da ATCvet)
MACROLIDI	tula	Draxxin 100 mgml Solution for injection cattle	Tulathromycin	Soluzione iniettabile	Bovini		Uso sottocutaneo	Bovini: carne 22 giorni (uso sottocutaneo) Ovini: carne 16 giorni (uso intramuscolare) Suino: carne 13 giorni (uso intramuscolare)	103619019 103619021 103619033 103619045 103619058 103619060 103619072 103619084	QJ01FA94	Sistemico
		Draxxin 100 mgml Solution for injection cattle pig sheep	Tulathromycin	Soluzione iniettabile	Bovini, Ovino, Suino		Uso intramuscolare; Uso sottocutaneo	Bovini: carne 22 giorni (uso sottocutaneo) Ovini: carne 16 giorni (uso intramuscolare) Suino: carne 13 giorni (uso intramuscolare)	103619019 103619021 103619033 103619045 103619058 103619060 103619072 103619084	QJ01FA94	Sistemico
		Draxxin 25 mg ml Solution for injection pig	Tulathromycin	Soluzione iniettabile	Suino		Uso intramuscolare	Bovini: carne 22 giorni (uso sottocutaneo) Ovini: carne 16 giorni (uso intramuscolare) Suino: carne 13 giorni (uso intramuscolare)	103619019 103619021 103619033 103619045 103619058 103619060 103619072 103619084	QJ01FA94	Sistemico
		DRAXXIN PLUS DRAXXIN PLUS 100 MGML + 120 MGML	Ketoprofen + Tulathromycin	Soluzione iniettabile	Bovini		Uso sottocutaneo	Bovini: carne 50 giorni (uso sottocutaneo)	105408013 105408025 105408037	QJ01FA99	Sistemico
		Forespix 100 mgml soluzione iniettabile per bovini suini e ovini Forespix 100mgml Solution for injection	Tulathromycin	Soluzione iniettabile	Bovini, Suino, Ovino		Uso sottocutaneo; Uso intramuscolare	Bovini: carne 22 giorni (uso sottocutaneo) Ovini: carne 16 giorni (uso intramuscolare) Suino: carne 13 giorni (uso intramuscolare)	105477018 105477020 105477032	QJ01FA94	Sistemico
		Huvexxin 100 mgml solution for injection for cattle pigs and sheep	Tulathromycin	Soluzione iniettabile	Ovino, Suino, Bovini		Uso intramuscolare; Uso sottocutaneo	Bovini: carne 22 giorni (uso intramuscolare) Ovini: carne 16 giorni (uso intramuscolare) Suino: carne 13 giorni (uso intramuscolare)	105648012 105648024 105648036 105648048	QJ01FA94	Sistemico
		Huvexxin 25 mgml solution for injection for pigs Huvexxin 25 mgml soluzione iniettabile per suini	Tulathromycin	Soluzione iniettabile	Suino		Uso intramuscolare	Bovini: carne 22 giorni (uso intramuscolare) Ovini: carne 16 giorni (uso intramuscolare) Suino: carne 13 giorni (uso intramuscolare)	105648012 105648024 105648036 105648048	QJ01FA94	Sistemico
	tulatromicina	Increxxa 100 mgml Solution for injection cattle pigs sheep	Tulathromycin	Soluzione iniettabile	Bovini, Ovino, Suino		Uso intramuscolare; Uso sottocutaneo	Bovini: carne 22 giorni (uso sottocutaneo) Ovini: carne 16 giorni (uso intramuscolare) Suino: carne 13 giorni (uso intramuscolare)	105557019 105557021 105557033 105557045 105557058 105557060 105557072 105557084	QJ01FA94	Sistemico
		Increxxa 25 mgml Solution for injection pigs	Tulathromycin	Soluzione iniettabile	Suino		Uso intramuscolare	Bovini: carne 22 giorni (uso sottocutaneo) Ovini: carne 16 giorni (uso intramuscolare) Suino: carne 13 giorni (uso intramuscolare)	105557019 105557021 105557033 105557045 105557058 105557060 105557072 105557084	QJ01FA94	Sistemico
		Latroxin 100 mgml solution for injection for cattle pigs and sheeps Latroxin 100 mgml soluzione iniettabile per bovini suini e ovini	Tulathromycin	Soluzione iniettabile	Bovini, Suino, Ovino		Uso sottocutaneo; Uso intramuscolare	Bovini: carne 22 giorni (uso sottocutaneo) Ovini: carne 16 giorni (uso intramuscolare) Suino: carne 13 giorni (uso intramuscolare)	105928016 105928028	QJ01FA94	Sistemico
		Lydaxx 100 mgml Solution for injection cattle pigs sheep	Tulathromycin	Soluzione iniettabile	Bovini, Ovino, Suino		Uso sottocutaneo; Uso intramuscolare	Bovini: carne 22 giorni (uso sottocutaneo) Ovini: carne 16 giorni (uso intramuscolare) Suino: carne 13 giorni (uso intramuscolare)	105570028 105570030 105570042 105570055	QJ01FA94	Sistemico
		MACROSYN 100 MGML SOLUTION FOR INJECTION FOR CATTLE PIGS AND SHEEP Macrosyn 100 mgml soluzione iniettabile per bovini suini e ovini	Tulathromycin	Soluzione iniettabile	Ovino, Suino, Bovini		Uso intramuscolare; Uso sottocutaneo	Bovini: carne 22 giorni (uso sottocutaneo) Ovini: carne 16 giorni (uso intramuscolare) Suino: carne 13 giorni (uso intramuscolare)	105434017 105434029 105434031 105434043	QJ01FA94	Sistemico
		Rexxolide 100 mgml Solution for injection	Tulathromycin	Soluzione iniettabile	Bovini, Ovino, Suino		Uso intramuscolare; Uso sottocutaneo	Bovini: carne 22 giorni (uso sottocutaneo) Ovini: carne 16 giorni (uso intramuscolare) Suino: carne 13 giorni (uso intramuscolare)	105594016 105594028 105594030	QJ01FA94	Sistemico
		TROMAXX 25 MGML TROXXAN 25 mgml SOLUTION FOR INJECTION FOR PIGS	Tulathromycin	Soluzione iniettabile	Suino		Uso intramuscolare	Suino: carne 13 giorni (uso intramuscolare)	105573012	QJ01FA94	Sistemico

Categoria C - ATTENZIONE

Classe di antibiotici	Molecola	Specialità veterinaria	Sostanze attive	Forma farmaceutica	Specie DPA	Specie non DPA	Vie di somministrazione	Tempi di attesa	Codice AIC	ATCvet	Uso (da ATCvet)
MACROLIDI	tulatromicina	TROXXAN Troxxan100 mgml solution for injection for cattle pigs and sheeps	Tulathromycin	Soluzione iniettabile	Bovini, Suino, Ovino		Uso sottocutaneo; Uso intramuscolare	Bovini: carne 22 giorni (uso sottocutaneo) Ovini: carne 16 giorni (uso intramuscolare) Suino: carne 13 giorni (uso intramuscolare)	105509018 105509020	QJ01FA94	Sistemico
		Tulaject 100 mgml solution for injection for cattle pigs and sheep	Tulathromycin	Soluzione iniettabile	Bovini, Suino, Ovino		Uso sottocutaneo; Uso intramuscolare	Bovini: carne 22 giorni (uso sottocutaneo) Ovini: carne 16 giorni (uso intramuscolare) Suino: carne 13 giorni (uso intramuscolare)	105465013 105465025 105465037	QJ01FA94	Sistemico
		Tulaven 100 mgml Solution for injection cattle pig sheep	Tulathromycin	Soluzione iniettabile	Bovini, Ovino, Suino		Uso sottocutaneo; Uso intramuscolare	Bovini: carne 22 giorni (uso sottocutaneo) Ovini: carne 16 giorni (uso intramuscolare) Suino: carne 13 giorni (uso intramuscolare)	105502013 105502025 105502037 105502049 105502052 105502064 105502076 105502088	QJ01FA94	Sistemico
		Tulaven 25 mgml Solution for injection	Tulathromycin	Soluzione iniettabile	Suino		Uso intramuscolare	Bovini: carne 22 giorni (uso sottocutaneo) Ovini: carne 16 giorni (uso intramuscolare) Suino: carne 13 giorni (uso intramuscolare)	105502013 105502025 105502037 105502049 105502052 105502064 105502076 105502088	QJ01FA94	Sistemico
		Tulaxa 100 mgml solution for injection for cattle pigs and sheep Tulaxa 100 mgml soluzione iniettabile per bovini suini e ovini	Tulathromycin	Soluzione iniettabile	Ovino, Suino, Bovini		Uso intramuscolare; Uso sottocutaneo	Bovini: carne 22 giorni (uso sottocutaneo); organi 22 giorni (uso sottocutaneo) Ovini: carne 16 giorni (uso intramuscolare); organi 16 giorni (uso intramuscolare) Suino: carne 13 giorni (uso intramuscolare); organi 13 giorni (uso intramuscolare)	105212017 105212029 105212031 105212043 105212056 105212068	QJ01FA94	Sistemico
		Tulaxa 25 mgml solution for injection for pigs Tulaxa 25 mgml soluzione iniettabile per suini	Tulathromycin	Soluzione iniettabile	Suino		Uso intramuscolare	Bovini: carne 22 giorni (uso sottocutaneo); organi 22 giorni (uso sottocutaneo) Ovini: carne 16 giorni (uso intramuscolare); organi 16 giorni (uso intramuscolare) Suino: carne 13 giorni (uso intramuscolare); organi 13 giorni (uso intramuscolare)	105212017 105212029 105212031 105212043 105212056 105212068	QJ01FA94	Sistemico
		Tulieve 100 mgml solution for injection for cattle pigs and sheep	Tulathromycin	Soluzione iniettabile	Bovini, Ovino, Suino		Uso sottocutaneo; Uso intramuscolare	Bovini: carne 22 giorni (uso sottocutaneo) Ovini: carne 16 giorni (uso intramuscolare) Suino: carne 13 giorni (uso intramuscolare)	105380012 105380024 105380036 105380048 105380051 105380063 105380075 105380087 105380099	QJ01FA94	Sistemico
		Tulinovet 100 mgml Solution for injection	Tulathromycin	Soluzione iniettabile	Bovini, Ovino, Suino		Uso intramuscolare; Uso sottocutaneo	Bovini: carne 22 giorni (uso sottocutaneo) Ovini: carne 16 giorni (uso intramuscolare, uso sottocutaneo) Suino: carne 13 giorni (uso intramuscolare)	105538019 105538021 105538033 105538045	QJ01FA94	Sistemico
		Tulissin 100 mgml Solution for injection cattle	Tulathromycin	Soluzione iniettabile	Bovini		Uso sottocutaneo	Bovini: carne 22 giorni (uso sottocutaneo) Ovini: carne 16 giorni (uso intramuscolare) Suino: carne 13 giorni (uso intramuscolare)	105514018 105514020 105514032 105514044 105514057 105514069 105514071 105514083 105514095 105514107 105514119 105514121	QJ01FA94	Sistemico
		Tulissin 100 mgml Solution for injection cattle pigs sheep	Tulathromycin	Soluzione iniettabile	Bovini, Ovino, Suino		Uso intramuscolare; Uso sottocutaneo	Bovini: carne 22 giorni (uso sottocutaneo) Ovini: carne 16 giorni (uso intramuscolare) Suino: carne 13 giorni (uso intramuscolare)	105514018 105514020 105514032 105514044 105514057 105514069 105514071 105514083 105514095 105514107 105514119 105514121	QJ01FA94	Sistemico

Categoria C - ATTENZIONE

Classe di antibiotici	Molecola	Specialità veterinaria	Sostanze attive	Forma farmaceutica	Specie DPA	Specie non DPA	Vie di somministrazione	Tempi di attesa	Codice AIC	ATCvet	Uso (da ATCvet)
MACROLIDI	tulatromicina	Tulissin 25 mgml Solution for injection pigs	Tulathromycin	Soluzione iniettabile	Suino		Uso intramuscolare	Bovini: carne 22 giorni (uso sottocutaneo) Ovini: carne 16 giorni (uso intramuscolare) Suino: carne 13 giorni (uso intramuscolare)	105514018 105514020 105514032 105514044 105514057 105514069 105514071 105514083 105514095 105514107 105514119 105514121	QJ01FA94	Sistemico
		Tullavis 100 mgml solution for injection for cattle pigs and sheep	Tulathromycin	Soluzione iniettabile	Ovino, Suino, Bovini		Uso intramuscolare; Uso sottocutaneo	Bovini: carne 22 giorni (uso sottocutaneo) Ovini (ovini/pecore per prod carne): carne 16 giorni (uso intramuscolare) Suino: carne 13 giorni (uso intramuscolare)	105436012 105436024 105436036 105436048	QJ01FA94	Sistemico
		TULLAVIS 25 MGML Tullavis 25 mgml solution for injection for pigs	Tulathromycin	Soluzione iniettabile	Suino		Uso intramuscolare	Suino: carne 13 giorni (uso intramuscolare)	105437014 105437026 105437038	QJ01FA94	Sistemico
		Tuloxxin 100 mgml solution for injection for cattle pigs and sheep Tuloxxin 100 mgml soluzione iniettabile per bovini suini e ovini	Tulathromycin	Soluzione iniettabile	Ovino, Suino, Bovini		Uso intramuscolare; Uso sottocutaneo	Bovini: carne 22 giorni (uso sottocutaneo) Ovini: carne 16 giorni (uso intramuscolare) Suino: carne 13 giorni (uso intramuscolare); organi 13 giorni (uso intramuscolare)	105211015 105211027 105211039 105211041 105211054 105211066	QJ01FA94	Sistemico
		Tuloxxin 25 mgml solution for injection for pigs Tuloxxin 25 mgml soluzione iniettabile per bovini suini e ovini	Tulathromycin	Soluzione iniettabile	Suino		Uso intramuscolare	Bovini: carne 22 giorni (uso sottocutaneo) Ovini: carne 16 giorni (uso intramuscolare) Suino: carne 13 giorni (uso intramuscolare); organi 13 giorni (uso intramuscolare)	105211015 105211027 105211039 105211041 105211054 105211066	QJ01FA94	Sistemico
	tilosina	AXENTYL 200 mgml soluzione iniettabile per bovini ovini caprini e suini TYLMASIN 200 MGML SOLUTION FOR INJECTION FOR CATTLE SHEEP GOATS AND PIGS	Tylosin	Soluzione iniettabile	Bovini, Suino, Ovino, Caprino		Uso intramuscolare; Uso endovenoso	Bovini: carne 28 giorni (uso intramuscolare, uso endovenoso); latte 108 ore (uso intramuscolare, uso endovenoso) Caprini: carne 42 giorni (uso intramuscolare); latte 108 ore (uso intramuscolare) Ovini: carne 42 giorni (uso intramuscolare); latte 108 ore (uso intramuscolare) Suino: carne 16 giorni (uso intramuscolare)	104457015 104457027	QJ01FA90	Sistemico
		Bilovet 200 mgml Solution for Injection for Cattle and Pigs	Tylosin	Soluzione iniettabile	Bovini, Suino		Uso intramuscolare	Bovini: carne 28 giorni (uso intramuscolare) Bovini: latte 5 giorni (uso intramuscolare) Suino: carne 16 giorni (uso intramuscolare)	104706015	QJ01FA90	Sistemico
		DOPHATYLJECT 200 000 IUML SOLUTION FOR INJECTION FOR CATTLE SHEEP GOATS AND PIGS Dophatylject 200 000 UIml soluzione iniettabile per bovini ovini caprini e suini	Tylosin	Soluzione iniettabile	Bovini, Suino, Ovino, Caprino		Uso intramuscolare; Uso endovenoso	Bovini: carne 28 giorni (uso intramuscolare, uso endovenoso); latte 108 ore (uso intramuscolare, uso endovenoso) Caprini: carne 42 giorni (uso intramuscolare); latte 108 ore (uso intramuscolare) Ovini: carne 42 giorni (uso intramuscolare); latte 108 ore (uso intramuscolare) Suino: carne 16 giorni (uso intramuscolare)	105774018 105774020	QJ01FA90	Sistemico
		Pharmasin 1 gg granules for use in drinking water for pigs chickens turkeys and calves TYLMASIN 1GG GRANULATO PER SOLUZIONE ORALE	Tylosin tartrate	Granulato per uso in acqua da bere	Suino, Polli, Bovini (vitello), Tacchino		Somministrazione in acqua da bere	Bovini (vitelli): carne 12 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Pollo (galline ovaiole): uova 0 giorni (somministrazione in acqua da bere) Pollo: carne 1 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino: carne 1 giorni (somministrazione in acqua da bere) Uccelli (tacchino): carne 2 giorni (somministrazione in acqua da bere); uova 0 giorni (somministrazione in acqua da bere)	104368016 104368028	QJ01FA90	Sistemico
		Pharmasin 100 000 IUg Premix for medicated feeding stuff for pigs broilers and pullets TYLMASIN 100 MGG PREMISCELA PER ALIMENTI MEDICAMENTOSI	Tylosin	Premiscela per alimenti medicamentosi	Suino, Polli		Somministrazione con il mangime	Pollo: carne 1 giorni (uso orale) Pollo: carne 1 giorni (uso orale) Suino: carne 0 giorni (uso orale)	104018039 104018041	QJ01FA90	Sistemico
		Pharmasin 20 000 IUg Oral Granules for pigs Tylmasin 20000 Ulg granulato per uso orale per suini	Tylosin phosphate	Granulato	Suino		Uso orale	Suino: carne 1 giorni (uso orale); organi 1 giorni (uso orale)	104015019 104015021	QJ01FA90	Sistemico
		PHARMASIN 200 MGML SOLUTION FOR INJECTION FOR CATTLE SHEEP GOATS AND PIGS PHARMASIN 200 MGML SOLUZIONE INIETTABILE	Tylosin	Soluzione iniettabile	Bovini, Suino, Ovino, Caprino		Uso intramuscolare; Uso endovenoso	Bovini: carne 28 giorni (uso endovenoso, uso intramuscolare) Bovini: latte 108 ore (uso endovenoso, uso intramuscolare) Caprini: carne 42 giorni (uso intramuscolare); latte 108 ore (uso intramuscolare) Ovini: carne 42 giorni (uso intramuscolare) Ovini (ovine/pecore femm adulte): latte 108 ore (uso intramuscolare) Suino: carne 16 giorni (uso intramuscolare)	104456013 104456025	QJ01FA90	Sistemico
		Pharmasin 250 000 IUg Oral Granules for pigs TYLMASIN 250MGG GRANULATO PER USO ORALE PER SUINI	Tylosin phosphate	Granulato	Suino		Uso orale	Suino: carne 0 giorni (somministrazione con il mangime)	104176019 104176021	QJ01FA90	Sistemico
		PURTYL 11 g polvere solubile ad uso orale per polli da carne galline ovaiole vitelli suini e tacchini	Tylosin tartrate	Polvere orale	Bovini (vitello), Suino, Tacchino, Pollo (gallina ovaiola), Pollo (pollo da carne)		Somministrazione in acqua da bere/latte; Somministrazione in acqua da bere	Bovini (vitelli): carne 11 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Pollo (broiler): carne 0 giorni (somministrazione in acqua da bere) Pollo (galline ovaiole): uova 0 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino: carne 0 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Uccelli (tacchino): carne 3 giorni (somministrazione in acqua da bere)	103868016 103868028 103868030 103868042	QJ01FA90	Sistemico
		SUPRATIL 200 mgml soluzione iniettabile per bovini e suini	Tylosin	Soluzione iniettabile	Bovini, Suino		Uso intramuscolare	Bovini: carne 28 giorni (uso intramuscolare); latte 108 ore (uso intramuscolare) Suino: carne 16 giorni (uso intramuscolare)	103789018 103789020 103789032	QJ01FA90	Sistemico
		TILJET 20 200mgml soluzione iniettabile per bovini suini cani	Tylosin	Soluzione iniettabile	Bovini, Suino	Cane	Uso intramuscolare	Bovini: carne 14 giorni (uso intramuscolare); latte 180 ore (uso intramuscolare) Suino: carne 16 giorni (uso intramuscolare)	101566014 101566038	QJ01FA90	Sistemico

Categoria C - ATTENZIONE

Classe di antibiotici	Molecola	Specialità veterinaria	Sostanze attive	Forma farmaceutica	Specie DPA	Specie non DPA	Vie di somministrazione	Tempi di attesa	Codice AIC	ATCvet	Uso (da ATCvet)
MACROLIDI	tilosina	TILOSINA 15 LIQUIDA UNIONE COMMERCIALE LOMBARDA	Tylosin	Soluzione orale	Pollo (pollo da carne), Bovino (vitello lattante)		Somministrazione in acqua da bere	Bovini (vitelli da latte): carne 24 giorni (somministrazione in acqua da bere) Pollo (broiler): carne 12 giorni (somministrazione in acqua da bere)	103383016 103383028	QJ01FA90	Sistemico
		Tilosina 20 Chemifarma SpA 200 mgg polvere per uso in acqua da bere per suini broiler vitelli da latte e galline ovaiole	Tylosin	Polvere orale	Suino, Pollo (pollo da carne), Pollo (gallina ovaiola), Bovini (vitello)		Uso orale	Bovini (vitelli da latte): carne 24 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Bovini (vitelli): carne 24 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Pollo (broiler): carne 0 giorni (somministrazione in acqua da bere) Pollo (galline ovaiole): uova 0 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino: carne 1 giorni (somministrazione in acqua da bere)	103419014 103419026 103419038 103419040 103419053	QJ01FA90	Sistemico
		TILOSINA 20 LIQUIDA TREI 200 mgg soluzione orale per vitelli da latte polli da carne e suini	Tylosin	Soluzione orale	Suino, Bovino (vitello lattante), Pollo (pollo da carne)		Somministrazione in acqua da bere/latte; Somministrazione in acqua da bere	Bovini (vitelli da latte): carne 24 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Pollo (broiler): carne 1 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino: carne 16 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte)	103417010 103417022 103417034	QJ01FA90	Sistemico
		Tilosina 20 liquido Chemifarma 200 mgml soluzione uso orale per suini broilers e vitelli da latte	Tylosin	Soluzione orale	Bovino (vitello lattante), Pollo (pollo da carne), Suino		Somministrazione in acqua da bere/latte; Somministrazione in acqua da bere	Bovini (vitelli da latte): carne 24 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Pollo (broiler): carne 1 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino: carne 1 giorni (somministrazione in acqua da bere)	103385011 103385023	QJ01FA90	Sistemico
		Tilosina 24 liquida Chemifarma SpA 200 mgml soluzione ad uso orale per broiler tacchini e galline ovaiole	Tylosin	Soluzione per somministrazione in acqua da bere	Polli, Tacchino		Uso orale	Pollo (broiler): carne 0 giorni (somministrazione in acqua da bere) Pollo (galline ovaiole): uova 0 giorni (somministrazione in acqua da bere) Uccelli (tacchino): carne 2 giorni (somministrazione in acqua da bere)	102714019 102714021 102714033 102714045	QJ01FA90	Sistemico
		TYLAN 200 200 mgml soluzione iniettabile per bovini e suini	Tylosin	Soluzione iniettabile	Bovini, Suino		Uso intramuscolare	Bovini: carne 28 giorni (uso intramuscolare); latte 108 ore (uso intramuscolare) Bovini: carne 28 giorni (uso intramuscolare) Suino: carne 16 giorni (uso intramuscolare)	100121033 100121045	QJ01FA90	Sistemico
		TYLAN SOLUBILE polvere per soluzione orale per polli da carne e galline ovaiole tacchini suini e vitelli	Tylosin tartrate	Soluzione orale	Bovini (vitello)		Uso orale	Bovini (vitelli): carne 11 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte, uso orale) Pollo (galline ovaiole): carne 0 giorni (somministrazione in acqua da bere); uova 0 giorni (somministrazione in acqua da bere) Pollo: carne 0 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino: carne 0 giorni (somministrazione in acqua da bere) Uccelli (tacchino): carne 3 giorni (somministrazione in acqua da bere)	100108012 100108024	QJ01FA90	Sistemico
		Tylan Sulfa G100 Premix premiscela per alimenti medicamentosi per suini	Tylosin + Sulfadimidine	Premiscela per alimenti medicamentosi	Suino		Somministrazione con il mangime	Bovini (vitelli): carne 11 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte, uso orale) Pollo (galline ovaiole): carne 0 giorni (somministrazione in acqua da bere); uova 0 giorni (somministrazione in acqua da bere) Pollo: carne 0 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino: carne 0 giorni (somministrazione in acqua da bere) Uccelli (tacchino): carne 3 giorni (somministrazione in acqua da bere)	100108012 100108024	QJ01RA91	Sistemico
		TYLMASIN 250 MGG PREMISCELA PER ALIMENTI MEDICAMENTOSI Tylmasin 250 000 IUg premix for medicated feeding stuff for pigs and chickens	Tylosin phosphate	Premiscela per alimenti medicamentosi	Suino, Polli		Somministrazione con il mangime	Pollo (galline ovaiole): uova 0 giorni (somministrazione con il mangime) Pollo: carne 0 giorni (somministrazione con il mangime) Suino: carne 0 giorni (somministrazione con il mangime)	104818012 104818024 104818036	QJ01FA90	Sistemico
		TYLOGRAN 1000 mgg granulato per somministrazione in acqua da berelatte per bovini vitelli suini polli e tacchini TYLOGRAN 1000 mgg granules for use in drinking watermilk for cattle calves pigs chickens and turkeys	Tylosin tartrate	Granulato per uso in acqua da bere	Suino, Polli, Bovini (vitello), Tacchino		Somministrazione in acqua da bere; Uso orale	Bovini (vitelli): carne 12 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Pollo: carne 1 giorni (somministrazione in acqua da bere); uova 0 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino: carne 1 giorni (somministrazione in acqua da bere) Uccelli (tacchino): carne 2 giorni (somministrazione in acqua da bere); uova 0 giorni (somministrazione in acqua da bere)	104792015 104792027 104792039 104792041 104792054 104792066 104792078 104792080	QJ01FA90	Sistemico
		Tylosin 200 premix 200 mgg premiscela per alimenti medicamentosi per polli da carne e suini	Tylosin	Premiscela per alimenti medicamentosi	Pollo (pollo da carne), Suino		Somministrazione con il mangime	Pollo (broiler): carne 12 giorni (somministrazione con il mangime) Suino: carne 16 giorni (somministrazione con il mangime)	103387015 103387027 103387039 103387041	QJ01FA90	Sistemico
		TYLOVET 1GG GRANULATO PER SOLUZIONE ORALE	Tylosin tartrate	Granulato	Tacchino, Pollo (gallina ovaiola), Polli, Bovini (vitello), Suino		Uso orale	Bovini (vitelli): carne 11 giorni (uso orale) Pollo (galline ovaiole): uova 0 giorni (uso orale) Pollo: carne 0 giorni (uso orale) Suino: carne 0 giorni (uso orale) Uccelli (tacchino): carne 3 giorni (uso orale)	104670017 104670029	QJ01FA90	Sistemico
		TYLUCYL 200 MGML SOLUTION FOR INJECTION FOR CATTLE AND PIGS	Tylosin	Soluzione iniettabile	Bovini, Suino		Uso intramuscolare; Uso endovenoso	Bovini: carne 28 giorni (uso intramuscolare, uso endovenoso) Bovini: latte 108 ore (uso intramuscolare, uso endovenoso) Suino: carne 16 giorni (uso intramuscolare)	104872015 104872027 104872039	QJ01FA90	Sistemico
		VETIL	Tylosin	Soluzione iniettabile	Bovini, Suino	Cane	Uso intramuscolare	Bovini: carne 35 giorni (uso intramuscolare); latte 168 ore (uso intramuscolare) Suino: carne 16 giorni (uso intramuscolare)	101787012 101787024 101787036	QJ01FA90	Sistemico
		ZOOTYL 945 000 IUg powder for use in drinking water for pigs chickens and turkeys ZOOTYL 945 000 UIg polvere per uso in acqua da bere per suini polli e tacchini	Tylosin tartrate	Polvere per soluzione orale	Tacchino, Pollo (gallina), Pollo (pollo da carne), Suino		Uso orale	Pollo: carne 0 giorni (somministrazione in acqua da bere); uova 0 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino: carne 0 giorni (somministrazione in acqua da bere) Uccelli (tacchino): carne 1 giorni (somministrazione in acqua da bere); uova 0 giorni (somministrazione in acqua da bere)	105319014 105319026	QJ01FA90	Sistemico
	tilvalosina	Aivlosin 425 mgg Oral powder pigs	Tylvalosin	Polvere orale	Suino		Somministrazione con il mangime	Pollo (broiler): carne 2 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Pollo (galline ovaiole): uova 0 giorni (somministrazione in acqua da bere, somministrazione in acqua da bere/latte) Pollo: carne 2 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino: carne 1 giorni (somministrazione in acqua da bere); carne 2 giorni (somministrazione con il mangime, somministrazione in acqua da bere) Uccelli (fagiani): carne 2 giorni (somministrazione in acqua da bere) Uccelli (tacchino): carne 2 giorni (somministrazione in acqua da bere, somministrazione in acqua da bere/latte)	103150013 103150025 103150090 103150102 103150126 103150138 103150140 103150177 103150189 103150191	QJ01FA92	Sistemico

Categoria C - ATTENZIONE

Classe di antibiotici	Molecola	Specialità veterinaria	Sostanze attive	Forma farmaceutica	Specie DPA	Specie non DPA	Vie di somministrazione	Tempi di attesa	Codice AIC	ATCvet	Uso (da ATCvet)
MACROLIDI	tilvalosina	Aivlosin 425 mgg Premix for medicated feeding stuff pigs	Tylvalosin	Premiscela per alimenti medicamentosi	Suino		Somministrazione con il mangime	Pollo (broiler): carne 2 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Pollo (galline ovaiole): uova 0 giorni (somministrazione in acqua da bere, somministrazione in acqua da bere/latte) Pollo: carne 2 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino: carne 1 giorni (somministrazione in acqua da bere); carne 2 giorni (somministrazione con il mangime, somministrazione in acqua da bere) Uccelli (fagiani): carne 2 giorni (somministrazione in acqua da bere) Uccelli (tacchino): carne 2 giorni (somministrazione in acqua da bere, somministrazione in acqua da bere/latte)	103150013 103150025 103150090 103150102 103150126 103150138 103150140 103150177 103150189 103150191	QJ01FA92	Sistemico
		Aivlosin 625 mgg Granules chickens and turkeys	Tylvalosin	Granulato per uso in acqua da bere	Tacchino, Polli		Somministrazione in acqua da bere	Pollo (broiler): carne 2 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Pollo (galline ovaiole): uova 0 giorni (somministrazione in acqua da bere, somministrazione in acqua da bere/latte) Pollo: carne 2 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino: carne 1 giorni (somministrazione in acqua da bere); carne 2 giorni (somministrazione con il mangime, somministrazione in acqua da bere) Uccelli (fagiani): carne 2 giorni (somministrazione in acqua da bere) Uccelli (tacchino): carne 2 giorni (somministrazione in acqua da bere, somministrazione in acqua da bere/latte)	103150013 103150025 103150090 103150102 103150126 103150138 103150140 103150177 103150189 103150191	QJ01FA92	Sistemico
		Aivlosin 625 mgg Granules pheasants	Tylvalosin	Granulato per uso in acqua da bere	Fagiano		Somministrazione in acqua da bere	Pollo (broiler): carne 2 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Pollo (galline ovaiole): uova 0 giorni (somministrazione in acqua da bere, somministrazione in acqua da bere/latte) Pollo: carne 2 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino: carne 1 giorni (somministrazione in acqua da bere); carne 2 giorni (somministrazione con il mangime, somministrazione in acqua da bere) Uccelli (fagiani): carne 2 giorni (somministrazione in acqua da bere) Uccelli (tacchino): carne 2 giorni (somministrazione in acqua da bere, somministrazione in acqua da bere/latte)	103150013 103150025 103150090 103150102 103150126 103150138 103150140 103150177 103150189 103150191	QJ01FA92	Sistemico
		Aivlosin 625 mgg Granules pigs	Tylvalosin	Granulato per uso in acqua da bere	Suino		Somministrazione in acqua da bere	Pollo (broiler): carne 2 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Pollo (galline ovaiole): uova 0 giorni (somministrazione in acqua da bere, somministrazione in acqua da bere/latte) Pollo: carne 2 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino: carne 1 giorni (somministrazione in acqua da bere); carne 2 giorni (somministrazione con il mangime, somministrazione in acqua da bere) Uccelli (fagiani): carne 2 giorni (somministrazione in acqua da bere) Uccelli (tacchino): carne 2 giorni (somministrazione in acqua da bere, somministrazione in acqua da bere/latte)	103150013 103150025 103150090 103150102 103150126 103150138 103150140 103150177 103150189 103150191	QJ01FA92	Sistemico
CEFALOSPORINE DI PRIMA E SECONDA GENERAZIONE E CEFAMICINE	cefacetrile	CEFAXIMINL pomata intramammaria per bovine e bufale in lattazione	Rifaximin + Cefacetrile sodium	Pomata intramammaria	Bovini (vacca), Bufalo (bufala)		Per uso intramammario	Bovini (bovine /vacche in lattazione): carne 5 giorni (uso intramammario); latte 144 ore (uso intramammario); latte 72 ore (uso intramammario) Bufali: carne 5 giorni (uso intramammario); latte 144 ore (uso intramammario); latte 72 ore (uso intramammario)	101715011 101715047 101715050 101715074	QJ51RD34	Intramammario
		CEFAXIMINL spray intramammario per bovine e bufale in lattazione	Rifaximin + Cefacetrile sodium	Emulsione intramammaria	Bovini (vacca in lattazione), Bufalo (bufala)		Per uso intramammario	Bovini (bovine /vacche in lattazione): carne 5 giorni (uso intramammario); latte 144 ore (uso intramammario); latte 72 ore (uso intramammario) Bufali: carne 5 giorni (uso intramammario); latte 144 ore (uso intramammario); latte 72 ore (uso intramammario)	101715011 101715047 101715050 101715074	QJ51RD34	Intramammario
	cefadroxil	Cefacure tabs 1000 mg compresse per cani e gatti	Cefadroxil	Compressa		Cane, Gatto	Uso orale		101917019 101917021 101917033 101917045 101917058 101917060 101917072 101917084 101917096	QJ01DB05	Sistemico
		Cefacure tabs 20 mg compresse per cani e gatti	Cefadroxil	Compressa		Cane, Gatto	Uso orale		101917019 101917021 101917033 101917045 101917058 101917060 101917072 101917084 101917096	QJ01DB05	Sistemico
		Cefacure tabs 200 mg compresse per cani e gatti	Cefadroxil	Compressa		Cane, Gatto	Uso orale		101917019 101917021 101917033 101917045 101917058 101917060 101917072 101917084 101917096	QJ01DB05	Sistemico

Categoria C - ATTENZIONE

Classe di antibiotici	Molecola	Specialità veterinaria	Sostanze attive	Forma farmaceutica	Specie DPA	Specie non DPA	Vie di somministrazione	Tempi di attesa	Codice AIC	ATCvet	Uso (da ATCvet)
CEFALOSPORINE DI PRIMA E SECONDA GENERAZIONE E CEFAMICINE	cefadroxil	Cefacure tabs 50 mg compresse per cani e gatti	Cefadroxil	Compressa		Cane, Gatto	Uso orale		101917019 101917021 101917033 101917045 101917058 101917060 101917072 101917084 101917096	QJ01DB05	Sistemico
		UNACEF 1000 mg compresse divisibili aromatizzate per cani e gatti	Cefadroxil monohydrate	Compressa		Cane, Gatto	Uso orale		104879010 104879022 104879034 104879046	QJ01DB05	Sistemico
		UNACEF 200 mg compresse divisibili aromatizzate per cani e gatti	Cefadroxil monohydrate	Compressa		Cane, Gatto	Uso orale		104879010 104879022 104879034 104879046	QJ01DB05	Sistemico
	cefalexina	Biocefavet 375 mg chewable tablets for cats and dogs Biocefavet 375 mg compresse masticabili per cani e gatti	Cefalexin monohydrate	Compressa masticabile		Cane, Gatto	Uso orale		105815017 105815029 105815031 105815043 105815056 105815068 105815070 105815082 105815094 105815106 105815118 105815120 105815132 105815144 105815157 105815169	QJ01DB01	Sistemico
		Biocefavet 50 mg chewable tablets for cats and dogs Biocefavet 50 mg compresse masticabili per cani e gatti	Cefalexin monohydrate	Compressa masticabile		Cane, Gatto	Uso orale		105815017 105815029 105815031 105815043 105815056 105815068 105815070 105815082 105815094 105815106 105815118 105815120 105815132 105815144 105815157 105815169	QJ01DB01	Sistemico
		Biocefavet 75 mg chewable tablets for cats and dogs Biocefavet 75 mg compresse masticabili per cani e gatti	Cefalexin monohydrate	Compressa masticabile		Cane, Gatto	Uso orale		105815017 105815029 105815031 105815043 105815056 105815068 105815070 105815082 105815094 105815106 105815118 105815120 105815132 105815144 105815157 105815169	QJ01DB01	Sistemico

Categoria C - ATTENZIONE

Classe di antibiotici	Molecola	Specialità veterinaria	Sostanze attive	Forma farmaceutica	Specie DPA	Specie non DPA	Vie di somministrazione	Tempi di attesa	Codice AIC	ATCvet	Uso (da ATCvet)
CEFALOSPORINE DI PRIMA E SECONDA GENERAZIONE E CEFAMICINE	cefalexina	Biocefavet 750 mg chewable tablets for dogs Biocefavet 750 mg compresse masticabili per cani	Cefalexin monohydrate	Compressa masticabile		Cane	Uso orale		105815017 105815029 105815031 105815043 105815056 105815068 105815070 105815082 105815094 105815106 105815118 105815120 105815132 105815144 105815157 105815169	QJ01DB01	Sistemico
		Cefabactin 1000 mg compresse per cani Cefabactin 1000 mg tablets for dogs and cats	Cefalexin monohydrate	Compressa		Cane	Uso orale		104940010 104940022 104940034 104940046 104940059 104940061 104940073 104940085	QJ01DB01	Sistemico
		Cefabactin 250 mg compresse per cani e gatti Cefabactin 250 mg tablets for dogs and cats	Cefalexin monohydrate	Compressa		Gatto, Cane	Uso orale		104940010 104940022 104940034 104940046 104940059 104940061 104940073 104940085	QJ01DB01	Sistemico
		Cefabactin 50 mg compresse per cani e gatti Cefabactin 50 mg tablets for dogs and cats	Cefalexin monohydrate	Compressa		Cane, Gatto	Uso orale		104940010 104940022 104940034 104940046 104940059 104940061 104940073 104940085	QJ01DB01	Sistemico
		Cefabactin 500 mg compresse per cani Cefabactin 500 mg tablets for dogs and cats	Cefalexin monohydrate	Compressa		Cane	Uso orale		104940010 104940022 104940034 104940046 104940059 104940061 104940073 104940085	QJ01DB01	Sistemico
		CEFASEPTIN 300 MG TABLETS FOR DOGS Cefaseptin 300 mg compresse per cani	Cefalexin monohydrate	Compressa		Cane	Uso orale		104819014 104819026 104819038 104819040 104819053 104819065 104819077 104819089 104819091	QJ01DB01	Sistemico
		CEFASEPTIN 75 MG TABLETS FOR DOGS AND CATS Cefaseptin 75 mg compresse per cani e gatti	Cefalexin monohydrate	Compressa		Cane, Gatto	Uso orale		104819014 104819026 104819038 104819040 104819053 104819065 104819077 104819089 104819091	QJ01DB01	Sistemico
		CEFASEPTIN 750 MG TABLETS FOR DOGS Cefaseptin 750 mg compresse per cani	Cefalexin monohydrate	Compressa		Cane	Uso orale		104819014 104819026 104819038 104819040 104819053 104819065 104819077 104819089 104819091	QJ01DB01	Sistemico
		ICFVET 1000 mg compresse per cani	Cefalexin	Compressa		Cane	Uso orale		103501019 103501021 103501033 103501045 103501058	QJ01DB01	Sistemico

Categoria C - ATTENZIONE

Classe di antibiotici	Molecola	Specialità veterinaria	Sostanze attive	Forma farmaceutica	Specie DPA	Specie non DPA	Vie di somministrazione	Tempi di attesa	Codice AIC	ATCvet	Uso (da ATCvet)
CEFALOSPORINE DI PRIMA E SECONDA GENERAZIONE E CEFAMICINE	cefalexina	ICFVET 500 mg compresse per cani	Cefalexin	Compressa		Cane	Uso orale		103501019 103501021 103501033 103501045 103501058	QJ01DB01	Sistemico
		ICFVET granulare per uso orale per cani fino a 20 Kg e gatti	Cefalexin monohydrate	Polvere per sospensione orale		Gatto, Cane	Uso orale		103501019 103501021 103501033 103501045 103501058	QJ01DB01	Sistemico
		Lexylan 180 mgml Suspension for injection	Cefalexin	Sospensione iniettabile	Bovini	Cane, Gatto	Uso intramuscolare; Uso sottocutaneo	Bovini: carne 12 giorni (uso intramuscolare); latte 0 ore (uso intramuscolare)	105858017 105858029	QJ01DB01	Sistemico
		RILEXINE 200 MGG ORAL PASTE	Cefalexin	Pasta per uso orale		Cane	Uso orale		102729011 102729023 102729035	QJ01D	Sistemico
		RILEXINE 200 T	Cefalexin	Sospensione intramammaria	Bovini (vacca in lattazione)		Per uso intramammario	Bovini (bovine /vacche in lattazione): carne 6 giorni (uso intramammario); latte 48 ore (uso intramammario); organi 6 giorni (uso intramammario)	101944015 101944027 101944039	QJ51DB01	Intramammario
		RILEXINE 500 HL ASCIUTTA sospensione intramammaria per vacche da latte	Cefalexin	Sospensione intramammaria	Bovini (vacca da latte in asciutta)		Per uso intramammario	Bovini: carne 4 giorni (uso intramammario); latte 12 ore dopo il parto se il periodo di asciutta Ã¯ maggiore a 42 giorni (uso intramammario); latte 42 giorni dopo il trattamento se il periodo di asciutta Ã¯ inferiore a 42 giorni (uso intramammario); organi 4 giorni (uso intramammario)	101943013 101943025 101943037 101943049 101943052	QJ51DB01	Intramammario
		RILEXINE APPETIBILE 300 mg compresse per cani e gatti	Cefalexin	Compressa		Cane, Gatto	Uso orale		103759015 103759027 103759039 103759041 103759054 103759066 103759078 103759080 103759092	QJ01DB01	Sistemico
		RILEXINE APPETIBILE 600 mg compresse per cani e gatti	Cefalexin	Compressa		Cane, Gatto	Uso orale		103759015 103759027 103759039 103759041 103759054 103759066 103759078 103759080 103759092	QJ01DB01	Sistemico
		RILEXINE APPETIBILE 75 mg compresse per cani e gatti	Cefalexin	Compressa		Cane, Gatto	Uso orale		103759015 103759027 103759039 103759041 103759054 103759066 103759078 103759080 103759092	QJ01DB01	Sistemico
		RILEXINE DC 375 MG INTRAMAMMARY SUSPENSION FOR DRY COWS	Cephalexin benzathine	Sospensione intramammaria	Bovini (vacca in asciutta)		Per uso intramammario	Bovini (bovine/vacche in asciutta): carne 4 giorni (uso intramammario); latte 12 ore dopo il parto se il periodo di asciutta Ã¯ maggiore a 42 giorni (uso intramammario); latte 43 giorni dopo il trattamento se il periodo di asciutta Ã¯ inferiore a 42 giorni (uso intramammario)	105611014 105611026 105611038	QJ51DB01	Intramammario
		Therios 300 mg palatable tablets for dogs	Cefalexin monohydrate	Compressa		Cane	Uso orale		104316017 104316029 104316031 104316043 104316056	QJ01DB01	Sistemico
		THERIOS 75 MG CHEWABLE TABLETS FOR CATS	Cefalexin monohydrate	Compressa masticabile		Gatto	Uso orale		104347012 104347024 104347036 104347048 104347051	QJ01DB01	Sistemico
		Therios 750 mg palatable tablets for dogs	Cefalexin monohydrate	Compressa		Cane	Uso orale		104316017 104316029 104316031 104316043 104316056	QJ01DB01	Sistemico
		Tsefalen 1000 mg compresse rivestite con film per cani Tsefalen 1000 mg filmcoated tablets for dogs	Cefalexin	Compressa rivestita con film		Cane	Uso orale		104441011 104441023 104441035 104441047	QJ01DB01	Sistemico
		Tsefalen 500 mg compresse rivestite con film per cani Tsefalen 500 mg filmcoated tablets for dogs	Cefalexin	Compressa rivestita con film		Cane	Uso orale		104441011 104441023 104441035 104441047	QJ01DB01	Sistemico

Categoria C - ATTENZIONE

Classe di antibiotici	Molecola	Specialità veterinaria	Sostanze attive	Forma farmaceutica	Specie DPA	Specie non DPA	Vie di somministrazione	Tempi di attesa	Codice AIC	ATCvet	Uso (da ATCvet)
CEFALOSPORINE DI PRIMA E SECONDA GENERAZIONE E CEFAMICINE	cefalexina	Tsefalen 50mgml Powder for Oral Suspension for Dogs up to 20kg and Cats Tsefalen 50mgml polvere per sospensione orale per cani fino a 20 kg e per gatti	Cefalexin	Polvere per sospensione orale		Gatto, Cane	Uso orale		104441011 104441023 104441035 104441047	QJ01DB01	Sistemico
		Ubrolexin intramammary suspension for lactating dairy cows Ubrolexin sospensione intramammaria per bovine in lattazione	Cefalexin monohydrate + KANAMYCIN MONOSULPHATE	Sospensione intramammaria	Bovini		Per uso intramammario	Bovini (bovine /vacche in lattazione): carne 10 giorni (uso intramammario); latte 5 giorni (uso intramammario)	104073010 104073022	QJ51RD01	Intramammario
	cefalonio	Arentor DC 250 mg Intramammary Suspension for Dry Cows Arentor DC 250 mg sospensione intramammaria per bovine in asciutta	Cefalonium dihydrate	Sospensione intramammaria	Bovini		Per uso intramammario	Bovini (bovine/vacche in asciutta): carne 21 giorni (uso intramammario); latte 58 giorni dopo il trattamento se il periodo di asciutta Â¯ inferiore o uguale a 54 giorni (uso intramammario); latte 96 ore dopo il parto se il periodo di asciutta Â¯ superiore a 54 giorni (uso intramammario)	105182012 105182024	QJ51DB90	Intramammario
		Cepravin 250 mg pomata intramammaria per bovine vacche da latte in asciutta	Cefalonium	Pomata intramammaria	Bovini (vacca in asciutta)		Per uso intramammario	Bovini (bovine/vacche in asciutta): carne 2 giorni (uso intramammario); latte 51 giorni (uso intramammario)	101350015 101350027 101350039 101350041 101350054	QJ51DA90	Intramammario
		Cepritect 250 mg Intramammary Suspension for Dry Cows Cepritect 250 mg Sospensione intramammaria per bovine in asciutta	Cefalonium dihydrate	Sospensione intramammaria	Bovini		Per uso intramammario	Bovini (bovine/vacche in asciutta): carne 21 giorni (uso intramammario); latte 58 giorni dopo il trattamento se il periodo di asciutta Â¯ inferiore o uguale a 54 giorni (uso intramammario); latte 96 ore dopo il parto se il periodo di asciutta Â¯ superiore a 54 giorni (uso intramammario)	105086019 105086021 105086033	QJ51DB90	Intramammario
		MASTOUT 250 mg pomata intramammaria per bovine in asciutta	Cefalonium	Pomata intramammaria	Bovini (vacca in asciutta)		Per uso intramammario	Bovini (bovine/vacche in asciutta): carne 2 giorni (uso intramammario); latte 14 mungiture (uso intramammario)	104842012 104842024 104842036	QJ51DB90	Intramammario
	cefalotina	Nessuna specialità veterinaria autorizzata in Italia									
	cefapirina	BIMACURE 500 MG INTRAUTERINE SUSPENSION FOR CATTLE Bimacure 500 mg sospensione intrauterina per vacche	Cefapirin benzathine	Sospensione intrauterina	Bovini		Uso intrauterino	Bovini: carne 2 giorni (uso intrauterino); latte 0 giorni (uso intrauterino)	105464010	QG51AA05	Intrauterino
		CEFASAFE 300 mg sospensione intramammaria per vacche da latte in asciutta Cefa Safe 300 mg Intramammary Suspension for dairy cows at dryingoff	Cefapirin benzathine	Sospensione intramammaria	Bovini (vacca da latte in asciutta)		Per uso intramammario	Bovini (bovine/vacche in asciutta): carne 14 giorni (uso intramammario); latte 33 giorni (uso intramammario)	105548010 105548022	QJ51DB08	Intramammario
		CEFATRON 1 g4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per bovini	Cefapirin sodium + Cefapirin sodium + Cefapirin sodium	Polvere e solvente per soluzione iniettabile	Bovini		Uso sottocutaneo; Uso endovenoso; Uso intramuscolare	Bovini: carne 20 giorni (uso intramuscolare, uso endovenoso, uso sottocutaneo); latte 192 ore (uso intramuscolare, uso endovenoso, uso sottocutaneo) Bovini (bovine /vacche in lattazione): carne 10 giorni (uso intramammario); latte 96 ore (uso intramammario) Bovini: latte 192 ore (uso intramuscolare, uso endovenoso, uso sottocutaneo) Bovini (bovine/vacche in asciutta): carne 8 giorni (uso intramammario); latte 0 ore (uso intramammario)	101714020 101714032 101714044 101714057 101714071 101714095 101714107 101714119 101714145 101714184 101714210 101714222 101714234 101714246	QJ01DB08	Sistemico
		CEFATRON 10 g40 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per bovini	Cefapirin sodium + Cefapirin sodium + Cefapirin sodium	Polvere e solvente per soluzione iniettabile	Bovini		Uso sottocutaneo; Uso endovenoso; Uso intramuscolare	Bovini: carne 20 giorni (uso intramuscolare, uso endovenoso, uso sottocutaneo); latte 192 ore (uso intramuscolare, uso endovenoso, uso sottocutaneo) Bovini (bovine /vacche in lattazione): carne 10 giorni (uso intramammario); latte 96 ore (uso intramammario) Bovini: latte 192 ore (uso intramuscolare, uso endovenoso, uso sottocutaneo) Bovini (bovine/vacche in asciutta): carne 8 giorni (uso intramammario); latte 0 ore (uso intramammario)	101714020 101714032 101714044 101714057 101714071 101714095 101714107 101714119 101714145 101714184 101714210 101714222 101714234 101714246	QJ01DB08	Sistemico

Categoria C - ATTENZIONE

Classe di antibiotici	Molecola	Specialità veterinaria	Sostanze attive	Forma farmaceutica	Specie DPA	Specie non DPA	Vie di somministrazione	Tempi di attesa	Codice AIC	ATCvet	Uso (da ATCvet)
CEFALOSPORINE DI PRIMA E SECONDA GENERAZIONE E CEFAMICINE	cefapirina	CEFATRON 2 g8 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per bovini	Cefapirin sodium	Polvere e solvente per soluzione iniettabile	Bovini		Uso sottocutaneo; Uso endovenoso; Uso intramuscolare	Bovini: carne 20 giorni (uso intramuscolare, uso endovenoso, uso sottocutaneo); latte 192 ore (uso intramuscolare, uso endovenoso, uso sottocutaneo) Bovini (bovine /vacche in lattazione): carne 10 giorni (uso intramammario); latte 96 ore (uso intramammario) Bovini: latte 192 ore (uso intramuscolare, uso endovenoso, uso sottocutaneo) Bovini (bovine/vacche in asciutta): carne 8 giorni (uso intramammario); latte 0 ore (uso intramammario)	101714020 101714032 101714044 101714057 101714071 101714095 101714107 101714119 101714145 101714184 101714210 101714222 101714234 101714246	QJ01DB08	Sistemico
		CEFATRON 5 g20 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per bovini	Cefapirin sodium + Cefapirin sodium + Cefapirin sodium	Polvere e solvente per soluzione iniettabile	Bovini		Uso sottocutaneo; Uso endovenoso; Uso intramuscolare	Bovini: carne 20 giorni (uso intramuscolare, uso endovenoso, uso sottocutaneo); latte 192 ore (uso intramuscolare, uso endovenoso, uso sottocutaneo) Bovini (bovine /vacche in lattazione): carne 10 giorni (uso intramammario); latte 96 ore (uso intramammario) Bovini: latte 192 ore (uso intramuscolare, uso endovenoso, uso sottocutaneo) Bovini (bovine/vacche in asciutta): carne 8 giorni (uso intramammario); latte 0 ore (uso intramammario)	101714020 101714032 101714044 101714057 101714071 101714095 101714107 101714119 101714145 101714184 101714210 101714222 101714234 101714246	QJ01DB08	Sistemico
		CEFATRON ASCIUTTA 300 mg pomata intramammaria per bovine in asciutta	Cefapirin benzathine	Soluzione intramammaria	Bovini		Per uso intramammario	Bovini: carne 20 giorni (uso intramuscolare, uso endovenoso, uso sottocutaneo); latte 192 ore (uso intramuscolare, uso endovenoso, uso sottocutaneo) Bovini (bovine /vacche in lattazione): carne 10 giorni (uso intramammario); latte 96 ore (uso intramammario) Bovini: latte 192 ore (uso intramuscolare, uso endovenoso, uso sottocutaneo) Bovini (bovine/vacche in asciutta): carne 8 giorni (uso intramammario); latte 0 ore (uso intramammario)	101714020 101714032 101714044 101714057 101714071 101714095 101714107 101714119 101714145 101714184 101714210 101714222 101714234 101714246	QJ51DA30	Intramammario
		CEFATRON L pomata intramammaria per bovine in lattazione	Cefapirin sodium	Pomata intramammaria	Bovini (vacca in lattazione)		Per uso intramammario	Bovini: carne 20 giorni (uso intramuscolare, uso endovenoso, uso sottocutaneo); latte 192 ore (uso intramuscolare, uso endovenoso, uso sottocutaneo) Bovini (bovine /vacche in lattazione): carne 10 giorni (uso intramammario); latte 96 ore (uso intramammario) Bovini: latte 192 ore (uso intramuscolare, uso endovenoso, uso sottocutaneo) Bovini (bovine/vacche in asciutta): carne 8 giorni (uso intramammario); latte 0 ore (uso intramammario)	101714020 101714032 101714044 101714057 101714071 101714095 101714107 101714119 101714145 101714184 101714210 101714222 101714234 101714246	QJ51DA30	Intramammario
		MASTIPLAN LC 300 mg20 mg cefapirinaprednisolone sospensione intramammaria per bovine in lattazione Mastiplan LC 300mg20mg CefapirinPrednisolone intramammary suspension for lactating cows	Prednisolone + Cefapirin	Sospensione intramammaria	Bovini (vacca in lattazione)		Per uso intramammario	Bovini: carne 4 giorni (uso intramammario); latte 132 ore (uso intramammario)	103818011 103818023	QJ51RV01	Intramammario
		METRICURE sospensione per uso endocervicale per vacche	Cefapirin	Sospensione intrauterina	Bovini		Uso intrauterino	Bovini: carne 24 ore (uso intrauterino); latte 0 ore (uso intrauterino)	101965010 101965022	QG51AA05	Intrauterino
	cefazolina	CEFOVET A 250 mg Sospensione intramammaria per bovini ovini capre	Cefazolin	Sospensione intramammaria	Ovino, Caprino, Bovini		Per uso intramammario	Bovini: carne 0 giorni (uso intramammario); latte 0 mungiture (uso intramammario) Bovini (bovine/vacche in asciutta): carne 0 giorni (uso intramammario); latte 0 mungiture (uso intramammario) Caprini: carne 0 giorni (uso intramammario); latte 0 mungiture (uso intramammario) Caprini (capre in asciutta): carne 0 giorni (uso intramammario); latte 0 mungiture (uso intramammario) Ovini: carne 0 giorni (uso intramammario); latte 0 mungiture (uso intramammario) Ovini (pecore in asciutta): carne 0 giorni (uso intramammario); latte 0 mungiture (uso intramammario)	101961011 101961023 101961035 101961047	QJ51DA04	Intramammario
		CEFOVET L 300 mg sospensione intramammaria per bovini	Cefazolin	Pomata intramammaria	Bovini		Per uso intramammario	Bovini (bovini da latte): carne 24 ore (uso intramammario); latte 6 giorni (uso intramammario)	102405014 102405026 102405038	QJ51DA04	Intramammario

Categoria C - ATTENZIONE

Classe di antibiotici	Molecola	Specialità veterinaria	Sostanze attive	Forma farmaceutica	Specie DPA	Specie non DPA	Vie di somministrazione	Tempi di attesa	Codice AIC	ATCvet	Uso (da ATCvet)
LINCOSAMIDI	clindamicina	ANTIROBE Capsule da 150 mg per cani	Clindamycin	Capsula rigida		Cane	Uso orale		102386012 102386024 102386036 102386048 102386051 102386063 102386075 102386087 102386099 102386101 102386113 102386125 102386137 102386149	QJ01FF01	Sistemico
		ANTIROBE Capsule da 25 mg per cani e gatti	Clindamycin	Capsula rigida		Cane, Gatto	Uso orale		102386012 102386024 102386036 102386048 102386051 102386063 102386075 102386087 102386099 102386101 102386113 102386125 102386137 102386149	QJ01FF01	Sistemico
		ANTIROBE Capsule da 300 mg per cani	Clindamycin	Capsula rigida		Cane	Uso orale		102386012 102386024 102386036 102386048 102386051 102386063 102386075 102386087 102386099 102386101 102386113 102386125 102386137 102386149	QJ01FF01	Sistemico
		ANTIROBE Capsule da 75 mg per cani e gatti	Clindamycin	Capsula rigida		Cane, Gatto	Uso orale		102386012 102386024 102386036 102386048 102386051 102386063 102386075 102386087 102386099 102386101 102386113 102386125 102386137 102386149	QJ01FF01	Sistemico
		CLINDABACTIN Clindabactin 440 mg Chewable Tablets for Dogs	Clindamycin hydrochloride	Compressa masticabile		Cane	Uso orale		105224012 105224024 105224036 105224048 105224051 105224063	QJ01FF01	Sistemico
		Clindabactin 220 mg Chewable Tablets for Dogs Clindabactin 220 mg compresse masticabili per cani	Clindamycin hydrochloride	Compressa masticabile		Cane	Uso orale		105224012 105224024 105224036 105224048 105224051 105224063	QJ01FF01	Sistemico
		Clindabactin 55 mg Chewable Tablets for Dogs and Cats Clindabactin 55 mg compresse masticabili per cani e gatti	Clindamycin hydrochloride	Compressa masticabile		Cane, Gatto	Uso orale		105224012 105224024 105224036 105224048 105224051 105224063	QJ01FF01	Sistemico
		Clindacutin 10 mgg ointment for dogs Clindacutin 10 mgg unguento per cani	Clindamycin hydrochloride	Unguento		Cane	Uso cutaneo		105457016	QD06AX	Dermatologico
		CLINDASEPTIN 25 MGML ORAL SOLUTION FOR CATS AND DOGS	Clindamycin hydrochloride	Soluzione orale		Cane, Gatto	Uso orale		104403011 104403023	QJ01FF01	Sistemico

Categoria C - ATTENZIONE

Classe di antibiotici	Molecola	Specialità veterinaria	Sostanze attive	Forma farmaceutica	Specie DPA	Specie non DPA	Vie di somministrazione	Tempi di attesa	Codice AIC	ATCvet	Uso (da ATCvet)
LINCOSAMIDI	clindamicina	SOLUCLIN 25 MGML ORAL SOLUTION FOR CATS AND DOGS Soluclin 25 mgml soluzione orale per gatti e cani	Clindamycin hydrochloride	Soluzione orale		Cane, Gatto	Uso orale		105700025 105700037	QJ01FF01	Sistemico
		ZODON 150 MG CHEWABLE TABLETS FOR DOGS	Clindamycin hydrochloride	Compressa masticabile		Cane	Uso orale		104652019 104652021 104652033 104652045 104652058 104652060 104652072 104652084 104652096 104652108 104652110 104652122 104652134 104652146	QJ01FF01	Sistemico
		ZODON 25 MGML ORAL SOLUTION FOR CATS AND DOGS	Clindamycin hydrochloride	Soluzione orale		Cane, Gatto	Uso orale		104626015	QJ01FF01	Sistemico
		ZODON 264 MG CHEWABLE TABLETS FOR DOGS	Clindamycin hydrochloride	Compressa masticabile		Cane	Uso orale		104652019 104652021 104652033 104652045 104652058 104652060 104652072 104652084 104652096 104652108 104652110 104652122 104652134 104652146	QJ01FF01	Sistemico
		ZODON 88 MG CHEWABLE TABLETS FOR DOGS	Clindamycin hydrochloride	Compressa masticabile		Cane	Uso orale		104652019 104652021 104652033 104652045 104652058 104652060 104652072 104652084 104652096 104652108 104652110 104652122 104652134 104652146	QJ01FF01	Sistemico
	lincomicina	Albiotic 330 mg 100 mg Soluzione Intramammaria per bovine in lattazione Huvebiotic 330 mg100 mg Intramammary solution	Lincomycin hydrochloride + NEOMYCIN SULFATE	Soluzione intramammaria	Bovini		Per uso intramammario	Bovini (bovine /vacche in lattazione): carne 2 giorni (uso intramammario); latte 60 ore (uso intramammario)	105547018	QJ51RF03, QJ51RG01	Intramammario
		COMBOMICIN 50 MGML + 100 MGML SOLUZIONE INIETTABILE SUINIVITELLI NON RUMINANTIOVINICANI E GATTI	Lincomycin + Spectinomycin	Soluzione iniettabile	Suino, Ovino, Bovini	Cane, Gatto	Uso intramuscolare	Bovini (vitelli da latte): carne 15 giorni (uso intramuscolare) Ovini (ovini/pecore per prod carne): carne 21 giorni (uso intramuscolare) Suino: carne 14 giorni (uso intramuscolare)	105137018 105137020 105137032 105137044 105137057 105137069 105137071 105137083	QJ01RA94	Sistemico
		DUORESPAL PREMIX 105 mgg di amoxicillina + 105 mgg lincomicina premiscela per alimenti medicamentosi per Suini Polli	Amoxicillin + Lincomycin	Premiscela per alimenti medicamentosi	Suino, Pollo (pollo da carne)		Uso orale	Pollo: carne 6 giorni (somministrazione con il mangime) Suino: carne 5 giorni (somministrazione con il mangime)	102658010	QJ01RA01	Sistemico
		FILOLINC 400 400 mgg Polvere per soluzione orale per suini broiler escluso galline che producono uova destinate al consumo umano	Lincomycin	Polvere per soluzione orale	Suino, Pollo (pollo da carne)		Uso orale	Pollo: carne 5 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino: carne 0 giorni (somministrazione in acqua da bere)	104734013 104734025 104734037	QJ01FF02	Sistemico
		Galactis 750 mg gel intramammario per bovine in lattazione	Lincomycin hydrochloride	Gel intramammario	Bovini (vacca in lattazione)		Per uso intramammario	Bovini (bovine /vacche in lattazione): carne 3 giorni (uso intramammario); latte 84 ore (uso intramammario)	104517014 104517026	QJ51FF	Intramammario
		LINCOBAN 110 gkg premiscela per mangimi medicati per suini	Lincomycin	Premiscela per alimenti medicamentosi	Suino		Somministrazione con il mangime	Suino: carne 2 giorni (somministrazione con il mangime)	103467015 103467027	QJ01FF02	Sistemico
		LINCODOX 110 110 mgg polvere solubile per uso orale per suini	Lincomycin hydrochloride	Polvere per soluzione orale	Suino		Uso orale	Suino: carne 2 giorni (somministrazione in acqua da bere)	104016011	QJ01FF02	Sistemico
		Lincofarm 110 110 mgg premiscela per mangimi medicati per suini	Lincomycin	Premiscela per alimenti medicamentosi	Suino		Somministrazione con il mangime	Suino: carne 1 giorni (somministrazione con il mangime)	103470011 103470023	QJ01FF02	Sistemico

Categoria C - ATTENZIONE

Classe di antibiotici	Molecola	Specialità veterinaria	Sostanze attive	Forma farmaceutica	Specie DPA	Specie non DPA	Vie di somministrazione	Tempi di attesa	Codice AIC	ATCvet	Uso (da ATCvet)
LINCOSAMIDI	lincomicina	Lincofarm S 110 mgg polvere per soluzione orale per suini	Lincomycin hydrochloride	Polvere orale	Suino		Somministrazione in acqua da bere	Pollo (broiler): carne 3 giorni (somministrazione in acqua da bere) Pollo (galline ovaiole): uova 4 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino: carne 2 giorni (somministrazione in acqua da bere); carne 5 giorni (somministrazione in acqua da bere) Uccelli (anatre): carne 4 giorni (somministrazione in acqua da bere) Uccelli (fagiani): carne 3 giorni (somministrazione in acqua da bere) Uccelli (faraone): carne 1 giorni (somministrazione in acqua da bere) Uccelli (oche): carne 3 giorni (somministrazione in acqua da bere) Uccelli (pernici/starne): carne 3 giorni (somministrazione in acqua da bere) Uccelli (piccione/colomba): carne 3 giorni (somministrazione in acqua da bere) Uccelli (quaglie): carne 3 giorni (somministrazione in acqua da bere)	103471013 103471025 103471037 103471049 103471052 103471064	QJ01FF02	Sistemico
		LINCOFARM S 250 mgml soluzione orale per uso in acqua da bere per suini polli ovaiole faraone anatre oche quaglie fagiani starne pernici e piccioni	Lincomycin hydrochloride	Soluzione orale	Suino, Polli, Pollo (gallina ovaiola), Faraona, Anatra, Oca, Pernice, Fagiano, Quaglia, Colombo		Uso orale	Pollo (broiler): carne 3 giorni (somministrazione in acqua da bere) Pollo (galline ovaiole): uova 4 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino: carne 2 giorni (somministrazione in acqua da bere); carne 5 giorni (somministrazione in acqua da bere) Uccelli (anatre): carne 4 giorni (somministrazione in acqua da bere) Uccelli (fagiani): carne 3 giorni (somministrazione in acqua da bere) Uccelli (faraone): carne 1 giorni (somministrazione in acqua da bere) Uccelli (oche): carne 3 giorni (somministrazione in acqua da bere) Uccelli (pernici/starne): carne 3 giorni (somministrazione in acqua da bere) Uccelli (piccione/colomba): carne 3 giorni (somministrazione in acqua da bere) Uccelli (quaglie): carne 3 giorni (somministrazione in acqua da bere)	103471013 103471025 103471037 103471049 103471052 103471064	QJ01FF02	Sistemico
		LincoralS 222 mgg + 4447 mgg powder for use in drinking water	Spectinomycin sulfate tetrahydrate + Lincomycin hydrochloride monohydrate	Polvere per somministrazione in acqua da bere	Polli, Suino		Somministrazione in acqua da bere	Pollo: carne 5 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino: carne 0 giorni (somministrazione in acqua da bere)	105677013 105677025	QJ01FF52	Sistemico
		LincoSol 400 mgg polvere per uso in acqua da bere per suini e polli LincoSol 400 mgg powder for use in drinking water for pigs and chickens	Lincomycin	Polvere per somministrazione in acqua da bere	Suino, Pollo (pollo da carne)		Uso orale	Pollo (broiler): carne 5 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino: carne 1 giorni (somministrazione in acqua da bere)	104325016 104325028 104325030	QJ01FF02	Sistemico
		LincoSpectin 100 222 mgg 4447 mgg Powder for use in drinking water LincoSpectin SolPO 2224447 mgg polvere per uso in acqua da bere per suini e polli	Spectinomycin sulfate + Lincomycin hydrochloride	Polvere per somministrazione in acqua da bere	Suino, Polli		Uso orale	Pollo: carne 5 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino: carne 0 giorni (somministrazione in acqua da bere)	105994014 105994026	QJ01FF52	Sistemico
		LINCOSPECTIN 50 + 100 mgml soluzione iniettabile per suini vitelli ovini cani e gatti	Spectinomycin + Lincomycin	Soluzione iniettabile	Suino, Ovino, Bovini (vitello)	Cane, Gatto	Uso intramuscolare	Bovini (vitelli): carne 21 giorni (uso intramuscolare) Ovini: carne 7 giorni (uso intramuscolare) Pollo: carne 5 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino: carne 0 giorni (somministrazione in acqua da bere); carne 12 giorni (uso intramuscolare)	100237015 100237027 100237054 100237066 100237078	QJ01FF52	Sistemico
		LINCOVEX Lincovex 400 mgg soluble powder for pigs and chickens	Lincomycin	Polvere per somministrazione in acqua da bere	Suino, Polli		Uso orale	Pollo (broiler): carne 0 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino: carne 0 giorni (somministrazione in acqua da bere)	104983010	QJ01FF02	Sistemico
		Lincovex 100 mgml solution for injection for pigs cats and dogs	Lincomycin hydrochloride monohydrate	Soluzione iniettabile	Suino	Cane, Gatto	Uso intramuscolare; Uso endovenoso	Suino: carne 3 giorni (uso intramuscolare)	105747012 105747024	QJ01FF02	Sistemico
		LISMAY 4447 mgg + 2220 mgg powder for use in drinking water Lismay 4447 mgg + 2220 mgg polvere per somministrazione in acqua da bere per suini	Lincomycin hydrochloride + Spectinomycin sulfate tetrahydrate	Polvere per somministrazione in acqua da bere	Suino		Somministrazione in acqua da bere	Suino: carne 0 giorni (somministrazione in acqua da bere)	105432013 105432025	QJ01FF52	Sistemico
		MACRAMID 50 mgml + 100 mgml soluzione iniettabile per bovini e suini	Spectinomycin + Lincomycin	Soluzione iniettabile	Bovini, Suino		Uso intramuscolare	Bovini: carne 20 giorni (uso intramuscolare); latte 72 ore (uso intramuscolare) Suino: carne 18 giorni (uso intramuscolare)	104099015 104099027 104099039	QJ01FF52	Sistemico
		MICOSPECTONE 1665 mgg + 3335 mgg polvere per soluzione orale per vitelli suinetti e polli	Spectinomycin + Lincomycin	Polvere orale	Bovini (vitello), Suino (suinetto), Polli		Uso orale	Bovini: carne 20 giorni (uso intramuscolare); latte 72 ore (uso intramuscolare) Bovini (vitelli): carne 4 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Pollo: carne 3 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino: carne 1 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Suino: carne 18 giorni (uso intramuscolare)	101596017 101596029 101596031 101596043 101596056 101596068 101596070 101596082 101596094 101596106 101596118 101596120 101596132	QJ01FF52	Sistemico

Categoria C - ATTENZIONE

Classe di antibiotici	Molecola	Specialità veterinaria	Sostanze attive	Forma farmaceutica	Specie DPA	Specie non DPA	Vie di somministrazione	Tempi di attesa	Codice AIC	ATCvet	Uso (da ATCvet)
LINCOSAMIDI	lincomicina	MICOSPECTONE 50 mgml + 100 mgml soluzione iniettabile per bovini e suini	SPECTINOMYCIN HYDROCHLORIDE + Lincomycin hydrochloride	Soluzione iniettabile	Bovini, Suino		Uso intramuscolare	Bovini: carne 20 giorni (uso intramuscolare); latte 72 ore (uso intramuscolare) Bovini (vitelli): carne 4 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Pollo: carne 3 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino: carne 1 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Suino: carne 18 giorni (uso intramuscolare)	101596017 101596029 101596031 101596043 101596056 101596068 101596070 101596082 101596094 101596106 101596118 101596120 101596132	QJ01FF52	Sistemico
		MICOSPECTONE PA 50 mgml + 100 mgml soluzione iniettabile per cani e gatti	SPECTINOMYCIN HYDROCHLORIDE + Lincomycin hydrochloride	Soluzione iniettabile		Cane, Gatto	Uso intramuscolare		101596017 101596029 101596031 101596043 101596056 101596068 101596070 101596082 101596094 101596106 101596118 101596120 101596132	QJ01FF52	Sistemico
		OCNIL 400 mgg polvere per uso nellacqua da bere OCNIL 400 mgg powder for use in drinking water	Lincomycin hydrochloride	Polvere per somministrazione in acqua da bere	Polli, Suino		Somministrazione in acqua da bere	Pollo (broiler): carne 5 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino: carne 1 giorni (somministrazione in acqua da bere)	104937014 104937026	QJ01FF02	Sistemico
		PNEUMOSPECTIN 50100 mgml SOLUTION FOR INJECTION FOR CALVES OVINE CAPRINE PORCINE CHICKENS TURKEYS CATS AND DOGS	Spectinomycin + Lincomycin	Soluzione iniettabile	Bovini (vacca), Ovino, Caprino, Suino, Polli, Tacchino	Gatto, Cane	Solution for injection	Bovini (vitelli): carne 14 giorni (uso intramuscolare) Caprini: carne 14 giorni (uso intramuscolare) Ovini: carne 14 giorni (uso intramuscolare) Pollo: carne 14 giorni (uso sottocutaneo) Suino: carne 14 giorni (uso intramuscolare) Uccelli (tacchino): carne 14 giorni (uso sottocutaneo)	104545013 104545025	QJ01FF52	Sistemico
	pirlimicina	Nessuna specialità veterinaria autorizzata in Italia									
PLEUROMUTILINE	tiamulina	CEVAMULINE 125 MGML ORAL SOLUTION FOR USE IN DRINKING WATER FOR RABBITS	Tiamulin hydrogen fumarate	Soluzione orale	Coniglio		Uso orale	Conigli: carne 2 giorni (somministrazione in acqua da bere)	104721055 104721079	QJ01XQ01	Sistemico
		DENAGARD 20 SOLUZIONE INIETTABILE	Tiamulin	Soluzione iniettabile	Suino		Uso intramuscolare	Suino: carne 22 giorni (uso intramuscolare)	101564019 101564021	QJ01XQ01	Sistemico
		DOXAMULIN BMP	Tiamulin hydrogen fumarate	Premiscela per alimenti medicamentosi	Coniglio, Suino		Somministrazione con il mangime	Conigli: carne 1 giorni (somministrazione con il mangime) Suino: carne 7 giorni (somministrazione con il mangime)	104572019	QJ01XQ01	Sistemico
		Doximutil 60 mgg + 243 mgg premiscela per mangimi medicati per suini	Doxycycline + Tiamulin	Premiscela per alimenti medicamentosi	Suino		Somministrazione con il mangime	Suino: carne 8 giorni (somministrazione con il mangime)	104112014	QJ01RA90	Sistemico
		Karimulina 1000 mgg granules for use in drinking water for pigs chickens and turkeys Karimulina 1000 mgg granuli per uso in acqua da bere per suini polli e tacchini	Tiamulin hydrogen fumarate	Granulato per uso in acqua da bere	Suino, Polli, Tacchino		Somministrazione in acqua da bere	Pollo: carne 2 giorni (somministrazione in acqua da bere); uova 0 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino: carne 2 giorni (somministrazione in acqua da bere) Uccelli (tacchino): carne 6 giorni (somministrazione in acqua da bere)	105359018 105359020	QJ01XQ01	Sistemico
		KARIMULINA 1012 MGML SOLUTION FOR USE IN DRINKING WATER FOR RABBITS Karimulina 1012 mgml soluzione orale per uso in acqua da bere per conigli	Tiamulin hydrogen fumarate	Soluzione per somministrazione in acqua da bere	Coniglio		Uso orale	Conigli: carne 2 giorni (uso orale)	105707018 105707020	QJ01XQ01	Sistemico
		TIACLOR 50 mgg + 200 mgg premiscela per alimenti medicamentosi per suini	Chlortetracycline hydrochloride + Tiamulin hydrogen fumarate	Premiscela per alimenti medicamentosi	Suino		Somministrazione con il mangime	Suino: carne 4 giorni (somministrazione con il mangime)	102907019 102907021	QJ01RA90	Sistemico
		TIADOX 50 mgg + 100 mgg premiscela per alimenti medicamentosi per suini	Tiamulin hydrogen fumarate + Doxycycline	Premiscela per alimenti medicamentosi	Suino		Uso orale	Suino: carne 6 giorni (uso orale)	104140013 104140025	QJ01RA90	Sistemico
		Tialin 125 mgml Solution for Use in Drinking Water for Pigs Chickens and Turkeys Tialin 125 mgml soluzione per uso in acqua da bere per suini polli e tacchini	Tiamulin hydrogen fumarate	Soluzione per somministrazione in acqua da bere	Polli, Suino, Tacchino		Somministrazione in acqua da bere	Pollo: carne 2 giorni (uso orale); uova 0 giorni (uso orale) Suino: carne 2 giorni (basso dosaggio) (uso orale); carne 4 giorni (alto dosaggio) (uso orale) Uccelli (tacchino): carne 6 giorni (uso orale)	105128019 105128021 105128033 105128045	QJ01XQ01	Sistemico

Categoria C - ATTENZIONE

Classe di antibiotici	Molecola	Specialità veterinaria	Sostanze attive	Forma farmaceutica	Specie DPA	Specie non DPA	Vie di somministrazione	Tempi di attesa	Codice AIC	ATCvet	Uso (da ATCvet)
PLEUROMUTILINE	tiamulina	Tialin 250 mgml solution for use in drinking water for Pigs Chickens and Turkeys Tialin 250 mgml soluzione per uso in acqua da bere per suini polli e tacchini	Tiamulin hydrogen fumarate	Soluzione per somministrazione in acqua da bere	Polli, Suino, Tacchino		Somministrazione in acqua da bere	Pollo: carne 2 giorni (uso orale); uova 0 giorni (uso orale) Suino: carne 2 giorni (basso dosaggio) (uso orale); carne 4 giorni (alto dosaggio) (uso orale) Uccelli (tacchino): carne 6 giorni (uso orale)	105128019 105128021 105128033 105128045	QJ01XQ01	Sistemico
		TIAMIX Tiamulina 80mgg premiscela per alimenti medicamentosi per suini	Tiamulin	Premiscela per alimenti medicamentosi	Suino		Somministrazione con il mangime	Suino: carne 4 giorni (somministrazione con il mangime)	103436010 103436022	QJ01XQ01	Sistemico
		TIAMOXI 40 + 300 mgg Premiscela per alimenti medicamentosi per suini	Oxytetracycline + Tiamulin	Premiscela per alimenti medicamentosi	Suino		Somministrazione con il mangime	Suino: carne 8 giorni (somministrazione con il mangime)	102799018 102799020	QJ01RA90	Sistemico
		TIAMULDOX 125 BMP 100 mgg premiscela per alimenti medicamentosi per suini	Tiamulin	Premiscela per alimenti medicamentosi	Suino		Somministrazione con il mangime	Suino: carne 5 giorni (somministrazione con il mangime)	103437012	QJ01XQ01	Sistemico
		TIAMULIN HF 125 125 mgg polvere per uso orale per suini e per polli da carne	Tiamulin	Polvere orale	Suino, Pollo (pollo da carne)		Somministrazione in acqua da bere/latte; Somministrazione in acqua da bere	Pollo (broiler): carne 8 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino: carne 3 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte)	103432011	QJ01XQ01	Sistemico
		TIAMULINA 10 LIQUIDA TREI 100 mgg soluzione per uso in acqua da bere per polli da carne e suini	Tiamulin	Soluzione orale	Suino, Pollo (pollo da carne)		Somministrazione in acqua da bere/latte; Somministrazione in acqua da bere	Pollo (broiler): carne 8 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino: carne 2 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte)	103433013 103433025	QJ01XQ01	Sistemico
		Tiamulina 10 liquido Chemifarma 100 mgg soluzione per uso orale per polli da carne e suini	Tiamulin	Soluzione orale	Pollo (pollo da carne), Suino		Uso orale	Pollo (broiler): carne 2 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino: carne 4 giorni (somministrazione in acqua da bere)	103434015 103434027 103434039	QJ01XQ01	Sistemico
		Tiamulina 8 Chemifarma SpA 80 mgg polvere solubile per soluzione orale per suini	Tiamulin	Polvere per soluzione orale	Suino		Uso orale	Suino: carne 7 giorni (somministrazione in acqua da bere)	103438014 103438026 103438038	QJ01XQ01	Sistemico
		TIAMVET 125 MGML ORAL SOLUTION	Tiamulin hydrogen fumarate	Soluzione orale	Tacchino, Suino, Polli		Uso orale	Pollo: carne 6 giorni (somministrazione in acqua da bere); uova 0 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino: carne 6 giorni (somministrazione in acqua da bere) Uccelli (tacchino): carne 6 giorni (somministrazione in acqua da bere)	103844015 103844027 103844039 103844041	QJ01XQ01	Sistemico
		TYAMULEX	Tiamulin	Polvere orale	Suino		Somministrazione con il mangime	Suino: carne 2 giorni (somministrazione con il mangime)	103435018 103435020	QJ01XQ01	Sistemico
		VETMULIN 100 GKG Vetmulin 100 gkg Premix for medicated feeding stuff	Tiamulin hydrogen fumarate	Premiscela per alimenti medicamentosi	Tacchino, Suino, Coniglio, Polli		Somministrazione con il mangime	Conigli: carne 0 giorni (somministrazione con il mangime) Pollo: carne 1 giorni (somministrazione con il mangime); uova 0 giorni (somministrazione con il mangime) Suino: carne 6 giorni (somministrazione con il mangime) Uccelli (tacchino): carne 4 giorni (somministrazione con il mangime)	104021011 104021023 104021035	QJ01XQ01	Sistemico
		VETMULIN 100 MGG GRANULATO PER USO ORALE Vetmulin 100 mgg Granules	Tiamulin hydrogen fumarate	Granulato	Suino		Uso orale	Suino: carne 7 giorni (somministrazione con il mangime)	104141015 104141027	QJ01XQ01	Sistemico
		Vetmulin 125 mgml soluzione per somministrazione in acqua da bere per conigli	Tiamulin	Soluzione per somministrazione in acqua da bere	Coniglio		Uso orale	Conigli: carne 2 giorni (uso orale)	105713010 105713022	QJ01XQ01	Sistemico
		VETMULIN 125 SOLUZIONE ORALE VETMULIN 125 mgml Solution for use in drinking water for pigs and chickens	Tiamulin hydrogen fumarate + Tiamulin hydrogen fumarate	Soluzione per somministrazione in acqua da bere	Pollame, Suino		Somministrazione in acqua da bere	Pollo (galline ovaiole): carne 2 giorni (somministrazione in acqua da bere); uova 0 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino: carne 2 giorni (basso dosaggio) (somministrazione in acqua da bere); carne 4 giorni (alto dosaggio) (somministrazione in acqua da bere)	105179016 105179028	QJ01XQ01	Sistemico
		VETMULIN 162 MGML SOLUZIONE INIETTABILE VETMULIN 162 mgml Solution for Injection for pigs	Tiamulin	Soluzione iniettabile	Suino		Uso intramuscolare	Suino: carne 21 giorni (uso intramuscolare)	104236017	QJ01XQ01	Sistemico
		VETMULIN 450 MGG GRANULATO PER USO IN ACQUA DA BERE Vetmulin 450 mgg Granules for use in drinking water	Tiamulin hydrogen fumarate	Granulato per uso in acqua da bere	Suino, Polli, Tacchino		Somministrazione in acqua da bere	Pollo: carne 2 giorni (somministrazione in acqua da bere); uova 0 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino: carne 2 giorni (basso dosaggio) (somministrazione in acqua da bere); carne 4 giorni (alto dosaggio) (somministrazione in acqua da bere) Uccelli (tacchino): carne 6 giorni (somministrazione in acqua da bere)	103958017	QJ01XQ01	Sistemico
	valnemulina	BIOTILINA 10 premix for medicated feed for pigs and rabbits BIOTILINA 100 mgg premiscela per alimenti medicamentosi per suini e conigli	Valnemulin hydrochloride	Premiscela per alimenti medicamentosi	Suino, Coniglio		Somministrazione con il mangime	Conigli: carne 0 giorni (somministrazione con il mangime) Suino: carne 1 giorni (somministrazione con il mangime)	105351011	QJ01XQ02	Sistemico
		VALMUVET 100 MGG PREMIX FOR MEDICATED FEED FOR PIGS AND RABBITS VALMUVET 100 mgg premiscela per alimenti medicamentosi per suini e conigli	Valnemulin hydrochloride	Premiscela per alimenti medicamentosi	Suino, Coniglio		Somministrazione con il mangime	Conigli: carne 0 giorni (uso orale) Suino: carne 1 giorni (uso orale)	105675019	QJ01XQ02	Sistemico
RIFAMICINE: SOLO RIFAXIMINA	rifaximina	CEFAXIMINL pomata intramammaria per bovine e bufale in lattazione	Rifaximin + Cefacetrile sodium	Pomata intramammaria	Bovini (vacca), Bufalo (bufala)		Per uso intramammario	Bovini (bovine /vacche in lattazione): carne 5 giorni (uso intramammario); latte 144 ore (uso intramammario); latte 72 ore (uso intramammario) Bufali: carne 5 giorni (uso intramammario); latte 144 ore (uso intramammario); latte 72 ore (uso intramammario)	101715011 101715047 101715050 101715074	QJ51RD34	Intramammario
		CEFAXIMINL spray intramammario per bovine e bufale in lattazione	Rifaximin + Cefacetrile sodium	Emulsione intramammaria	Bovini (vacca in lattazione), Bufalo (bufala)		Per uso intramammario	Bovini (bovine /vacche in lattazione): carne 5 giorni (uso intramammario); latte 144 ore (uso intramammario); latte 72 ore (uso intramammario) Bufali: carne 5 giorni (uso intramammario); latte 144 ore (uso intramammario); latte 72 ore (uso intramammario)	101715011 101715047 101715050 101715074	QJ51RD34	Intramammario

Categoria C - ATTENZIONE

Classe di antibiotici	Molecola	Specialità veterinaria	Sostanze attive	Forma farmaceutica	Specie DPA	Specie non DPA	Vie di somministrazione	Tempi di attesa	Codice AIC	ATCvet	Uso (da ATCvet)
RIFAMICINE: SOLO RIFAXIMINA	rifaximina	FATROXIMIN 100 mg134 g schiuma endouterina per bovine e cavalle non destinate alla produzione di alimenti per il consumo umano	Rifaximin	Schiuma intrauterina	Bovini (vacca)	Cavallo Non DPA	Uso intrauterino	Bovini: carne 0 giorni (spray); latte 0 ore (spray) Bovini: carne 0 giorni (uso intramammario, uso intrauterino); latte 0 giorni (uso intramammario, uso intrauterino); latte 0 ore (uso intrauterino, uso intramammario) Bufali: carne 0 giorni (uso intramammario, uso intrauterino); latte 0 ore (uso intramammario); latte 72 ore (uso intrauterino) Caprini: carne 0 giorni (spray); latte 0 ore (spray) Conigli: carne 0 giorni (spray) Equidi (cavallo): carne 0 giorni (spray); latte 0 ore (spray) Ovini: carne 0 giorni (spray); latte 0 ore (spray) Suino: carne 0 giorni (spray)	100077015 100077039 100077078 100077080 100077092 100077104 100077128 100077130 100077142	QG51AA06	Intrauterino
		FATROXIMIN endomammario asciutta 100 mg5 ml pomata intramammaria per bovine e bufale	Rifaximin	Emulsione intramammaria	Bovini (vacca), Bufalo (bufala)		Per uso intramammario	Bovini: carne 0 giorni (spray); latte 0 ore (spray) Bovini: carne 0 giorni (uso intramammario, uso intrauterino); latte 0 giorni (uso intramammario, uso intrauterino); latte 0 ore (uso intrauterino, uso intramammario) Bufali: carne 0 giorni (uso intramammario, uso intrauterino); latte 0 ore (uso intramammario); latte 72 ore (uso intrauterino) Caprini: carne 0 giorni (spray); latte 0 ore (spray) Conigli: carne 0 giorni (spray) Equidi (cavallo): carne 0 giorni (spray); latte 0 ore (spray) Ovini: carne 0 giorni (spray); latte 0 ore (spray) Suino: carne 0 giorni (spray)	100077015 100077039 100077078 100077080 100077092 100077104 100077128 100077130 100077142	QJ51XX01	Intramammario
		FATROXIMIN pessari effervescenti per bovine bufale e cavalle non destinate alla macellazione per il consumo umano	Rifaximin	Ovulo	Bovini (vacca), Bufalo (bufala)	Cavallo Non DPA	Per uso intramammario	Bovini: carne 0 giorni (spray); latte 0 ore (spray) Bovini: carne 0 giorni (uso intramammario, uso intrauterino); latte 0 giorni (uso intramammario, uso intrauterino); latte 0 ore (uso intrauterino, uso intramammario) Bufali: carne 0 giorni (uso intramammario, uso intrauterino); latte 0 ore (uso intramammario); latte 72 ore (uso intrauterino) Caprini: carne 0 giorni (spray); latte 0 ore (spray) Conigli: carne 0 giorni (spray) Equidi (cavallo): carne 0 giorni (spray); latte 0 ore (spray) Ovini: carne 0 giorni (spray); latte 0 ore (spray) Suino: carne 0 giorni (spray)	100077015 100077039 100077078 100077080 100077092 100077104 100077128 100077130 100077142	QG51AA06	Intrauterino
		Fatroximin soluzione spray per uso topico Per bovini ovicaprini suini equini conigli cani e gatti	Rifaximin	Spray cutaneo, soluzione	Bovini, Ovino, Caprino, Suino, Coniglio	Cane, Gatto	Uso cutaneo	Bovini: carne 0 giorni (spray); latte 0 ore (spray) Bovini: carne 0 giorni (uso intramammario, uso intrauterino); latte 0 giorni (uso intramammario, uso intrauterino); latte 0 ore (uso intrauterino, uso intramammario) Bufali: carne 0 giorni (uso intramammario, uso intrauterino); latte 0 ore (uso intramammario); latte 72 ore (uso intrauterino) Caprini: carne 0 giorni (spray); latte 0 ore (spray) Conigli: carne 0 giorni (spray) Equidi (cavallo): carne 0 giorni (spray); latte 0 ore (spray) Ovini: carne 0 giorni (spray); latte 0 ore (spray) Suino: carne 0 giorni (spray)	100077015 100077039 100077078 100077080 100077092 100077104 100077128 100077130 100077142	QD06AX11	Dermatologico
		MASTORANGE	Rifaximin	Pomata intramammaria	Bovini (vacca), Bufalo (bufala)		Per uso intramammario	Bovini: carne 0 giorni (uso intramammario); latte 0 ore (uso intramammario) Bufali: carne 0 giorni (uso intramammario); latte 0 ore (uso intramammario)	104001019 104001021	QJ51XX01	Intramammario

Categoria B - LIMITARE

Classe di antibiotici	Molecola	Specialità veterinaria	Sostanze attive	Forma farmaceutica	Specie DPA	Specie non DPA	Vie di somministrazione	Tempi di attesa	Codice AIC	ATCvet	Uso (da ATCvet)
CEFALOSPORINE DI TERZA E QUARTA GENERAZIONE (ESCLUSE LE COMBINAZIONI CON INIBITORI DELLE BETA-LATTAMASI)	cefoperazone	PATHOZONE 2585 mg10 ml sospensione intramammaria per bovine da latte in lattazione	Cefoperazone sodium	Sospensione intramammaria	Bovini		Per uso intramammario	Bovini (bovine /vacche in lattazione): carne 3 giorni (uso intramammario); latte 72 ore (uso intramammario)	101299016 101299028 101299030	QJ51DD12	Intramammario
		STANDALONE 2585 mg10 ml sospensione intramammaria per bovine da latte in lattazione	Cefoperazone sodium	Sospensione intramammaria	Bovini		Per uso intramammario	Bovini (bovine /vacche in lattazione): carne 3 giorni (uso intramammario); latte 72 ore (uso intramammario)	105158012 105158024	QJ51	Intramammario
	cefovecina	Convenia 80 mgml Powder and solvent for solution for injection	Cefovecin	Polvere e solvente per soluzione iniettabile		Cane, Gatto	Uso sottocutaneo		103791012 103791024	QJ01DD91	Sistemico
	cefquinome	Ceffect 25 mgml suspension for injection for cattle and pigs	Cefquinome sulfate	Sospensione iniettabile	Bovini, Suino		Uso intramuscolare	Bovini: carne 5 giorni (uso intramuscolare); latte 24 ore (uso intramuscolare) Suino: carne 3 giorni (uso intramuscolare)	104458017 104458029 104458031 104458043 104458056	QJ01DE90	Sistemico
		CEFFECT LC Ceffect LC 75 mg intramammary ointment for lactating cows	Cefquinome sulfate	Pomata intramammaria	Bovini		Per uso intramammario	Bovini: carne 4 giorni (uso intramammario); latte 5 giorni (uso intramammario)	104627017 104627029 104627031 104627043	QJ51DE90	Intramammario
		COBACTAN 25 wv suspension for injection for cattle and pigs	Cefquinome sulfate	Sospensione iniettabile	Bovini, Suino		Uso intramuscolare	Bovini: carne 5 giorni (uso intramuscolare); latte 1 giorni (uso intramuscolare) Suino: carne 3 giorni (uso intramuscolare)	101593010 101593022	QJ01DE90	Sistemico
		Cobactan L 75 mg pomata intramammaria per bovine in lattazione Cobactan LC 75 mg intramammary ointment for lactating cattle	Cefquinome sulfate	Pomata intramammaria	Bovini		Per uso intramammario	Bovini (bovine /vacche in lattazione): carne 4 giorni (uso intramammario); latte 5 giorni (uso intramammario)	102623016 102623028 102623030 102623042	QJ51DE90	Intramammario
		COBACTAN LA 75 75 mgml sospensione iniettabile per bovini COBACTAN LA 75 wv suspension for injection for cattle	Cefquinome sulfate	Sospensione iniettabile	Bovini		Uso sottocutaneo	Bovini: carne 13 giorni (uso sottocutaneo) Suino: carne 7 giorni (uso intramuscolare)	103839015 103839027 103839039 103839041 103839054 103839066	QJ01DE90	Sistemico
		COBACTAN LA 75 sospensione iniettabile per suini Cobactan LA 75 wv suspension for injection for swine	Cefquinome	Sospensione iniettabile	Suino		Uso intramuscolare	Bovini: carne 13 giorni (uso sottocutaneo) Suino: carne 7 giorni (uso intramuscolare)	103839015 103839027 103839039 103839041 103839054 103839066	QJ01DE90	Sistemico
		MASTERCEF 25 mgml sospensione iniettabile per bovini e suini	Cefquinome sulfate	Sospensione iniettabile	Bovini, Suino		Uso intramuscolare	Bovini: carne 5 giorni (uso intramuscolare); latte 24 ore (uso intramuscolare) Suino: carne 3 giorni (uso intramuscolare)	104769017 104769029 104769031	QJ01DE90	Sistemico
		MASTIVIA 75 mg pomata intramammaria per bovine in lattazione	Cefquinome sulfate	Pomata intramammaria	Bovini		Per uso intramammario	Bovini (bovine /vacche in lattazione): carne 4 giorni (uso intramammario); latte 120 ore (uso intramammario)	104411018 104411020	QJ51DA92	Intramammario
		QIVITAN Qivitan 25 mgml suspension for injection for cattle and pigs	Cefquinome sulfate	Sospensione iniettabile	Bovini, Suino		Uso intramuscolare	Bovini: carne 5 giorni (uso intramuscolare); latte 24 ore (uso intramuscolare) Suino: carne 3 giorni (uso intramuscolare)	104970013 104970025	QJ01DE90	Sistemico
		QIVITAN LC Qivitan LC 75 mg intramammary ointment for lactating cows	Cefquinome sulfate	Pomata intramammaria	Bovini		Per uso intramammario	Bovini (bovine /vacche in lattazione): carne 4 giorni (uso intramammario); latte 5 giorni (uso intramammario)	105099016 105099028 105099030 105099042	QJ51DE90	Intramammario
		VIRBACTAN 150 MG INTRAMAMMARY OINTMENT	Cefquinome sulfate	Pomata intramammaria	Bovini (vacca in asciutta)		Per uso intramammario	Bovini (bovine/vacche in asciutta): carne 2 giorni (uso intramammario); latte 24 ore (dopo il parto per asciutta superiore a 5 settimane) (uso intramammario); latte 36 giorni (dopo trattamento per asciutta inferiore uguale a 5 settimane) (uso intramammario); organi 2 giorni (uso intramammario)	103706014 103706026 103706038 103706040 103706053	QJ51DE90	Intramammario
	ceftiofur	ACTIONIS 50 mgml suspension for injection for pigs and cattle Actionis 50 mgml sospensione iniettabile per bovini e suini	Ceftiofur hydrochloride	Sospensione iniettabile	Bovini, Suino		Uso sottocutaneo; Uso intramuscolare	Bovini: carne 6 giorni (uso sottocutaneo); latte 0 giorni (uso sottocutaneo) Suino: carne 6 giorni (uso intramuscolare)	104289032 104289044	QJ01DD90	Sistemico
		CEFAVEX 50 Cefavex 50 mgml suspension for injection for pigs and cattle	Ceftiofur hydrochloride	Sospensione iniettabile	Suino, Bovini		Uso intramuscolare; Uso sottocutaneo	Bovini: carne 8 giorni (uso sottocutaneo); latte 0 ore (uso sottocutaneo) Suino: carne 5 giorni (uso intramuscolare)	104519018 104519020	QJ01DD90	Sistemico

Categoria B - LIMITARE

Classe di antibiotici	Molecola	Specialità veterinaria	Sostanze attive	Forma farmaceutica	Specie DPA	Specie non DPA	Vie di somministrazione	Tempi di attesa	Codice AIC	ATCvet	Uso (da ATCvet)
CEFALOSPORINE DI TERZA E QUARTA GENERAZIONE (ESCLUSE LE COMBINAZIONI CON INIBITORI DELLE BETA-LATTAMASI)	ceftiofur	CEFTIOMAX Ceftiomax 50 mgml suspension for injection for swine and cattle	Ceftiofur	Sospensione iniettabile	Suino, Bovini		Uso intramuscolare; Uso sottocutaneo	Bovini: carne 8 giorni (uso sottocutaneo) Bovini: latte 0 ore (uso sottocutaneo) Suino: carne 5 giorni (uso intramuscolare)	104230014 104230026	QJ01DD90	Sistemico
		Ceftionil 50 mgml suspension for injection for pigs and cattle	Ceftiofur hydrochloride	Sospensione iniettabile	Bovini, Suino		Uso sottocutaneo; Uso intramuscolare	Bovini: carne 8 giorni (uso sottocutaneo) Bovini: latte 0 giorni (uso sottocutaneo) Suino: carne 5 giorni (uso intramuscolare)	104629011 104629023	QJ01DD90	Sistemico
		CEFTIOSAN 50 MGML SOLUZIONE INIETTABILE Ceftiosan 50 mgml suspension for injection for pigs and cattle	Ceftiofur hydrochloride	Sospensione iniettabile	Suino, Bovini		Uso intramuscolare; Uso sottocutaneo	Bovini: carne 8 giorni (uso intramuscolare); latte 0 giorni (uso intramuscolare); latte 0 ore (uso intramuscolare) Suino: carne 8 giorni (uso intramuscolare)	104270018 104270020 104270032 104270044 104270057 104270069	QJ01DD90	Sistemico
		CEMAY 50 MGML CEMAY 50 mgml suspension for injection for pigs and cattle	Ceftiofur hydrochloride	Sospensione iniettabile	Bovini, Suino		Uso sottocutaneo; Uso intramuscolare	Bovini: carne 8 giorni (uso sottocutaneo); latte 0 giorni (uso sottocutaneo) Suino: carne 5 giorni (uso intramuscolare)	104329014 104329026	QJ01DD90	Sistemico
		CEVAXELRTU 50 MGML SUSPENSION FOR INJECTION FOR CATTLE AND PIGS	Ceftiofur hydrochloride	Sospensione iniettabile	Suino, Bovini		Uso intramuscolare; Uso sottocutaneo	Bovini: carne 8 giorni (uso sottocutaneo) Bovini: latte 0 ore (uso sottocutaneo) Suino (suini da ingrasso): carne 5 giorni (uso intramuscolare)	104250016 104250028 104250030	QJ01DD90	Sistemico
		CURACEF DUO 50 MGML + 150 MGML SUSPENSION FOR INJECTION FOR CATTLE	Ceftiofur hydrochloride + Ketoprofen	Sospensione iniettabile	Bovini		Uso intramuscolare	Bovini: carne 8 giorni (uso intramuscolare); organi 8 giorni (uso intramuscolare) Bovini: latte 0 giorni (uso intramuscolare)	104619010 104619022 104619034 104619046 104619059 104619061	QJ01DD99	Sistemico
		EFICUR 50 MGML EFICUR 50 mgml suspension for injection for pigs and cattle	Ceftiofur hydrochloride	Sospensione iniettabile	Suino, Bovini		Uso intramuscolare; Uso sottocutaneo	Bovini: carne 8 giorni (uso sottocutaneo); latte 0 giorni (uso sottocutaneo) Suino: carne 5 giorni (uso intramuscolare)	104121013 104121025 104121037 104121049 104121052 104121064	QJ01DD90	Sistemico
		EXCENEL Polvere sterile per soluzione iniettabile da 1 g per equide non destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano e per suini e bovini	Ceftiofur sodium	Polvere per soluzione iniettabile	Suino, Bovini	Cavallo Non DPA	Uso intramuscolare	Bovini: carne 48 ore (uso intramuscolare); latte 0 ore (uso intramuscolare) Suino: carne 48 ore (uso intramuscolare)	100403017 100403029 100403031 100403043	QJ01DD90	Sistemico
		EXCENEL Polvere sterile per soluzione iniettabile da 4 g per equide non destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano e per suini e bovini	Ceftiofur	Polvere per soluzione iniettabile	Bovini, Suino	Cavallo Non DPA	Uso intramuscolare	Bovini: carne 48 ore (uso intramuscolare); latte 0 ore (uso intramuscolare) Suino: carne 48 ore (uso intramuscolare)	100403017 100403029 100403031 100403043	QJ01DD90	Sistemico
		EXCENEL FLOW 50 MGML SUSPENSION FOR INJECTION FOR PIGS AND CATTLE	Ceftiofur hydrochloride	Sospensione iniettabile	Suino, Bovini		Uso intramuscolare; Uso sottocutaneo	Bovini: carne 6 giorni (uso sottocutaneo); latte 0 giorni (uso sottocutaneo); latte 0 ore (uso sottocutaneo) Suino: carne 2 giorni (uso intramuscolare)	102366010 102366022 102366034 102366046 102366059	QJ01DD90	Sistemico
		Naxcel 100 mgml Suspension for injection	Ceftiofur	Sospensione iniettabile	Suino		Uso intramuscolare	Bovini: carne 9 giorni (uso sottocutaneo); latte 0 giorni (uso sottocutaneo) Suino: carne 71 giorni (uso intramuscolare)	103602013 103602025 103602037	QJ01DD90	Sistemico
		Naxcel 200 mgml Suspension for injection	Ceftiofur	Sospensione iniettabile	Bovini		Uso sottocutaneo	Bovini: carne 9 giorni (uso sottocutaneo); latte 0 giorni (uso sottocutaneo) Suino: carne 71 giorni (uso intramuscolare)	103602013 103602025 103602037	QJ01DD90	Sistemico
		WONDERCEF 1g 50 mgml polvere e solvente per soluzione iniettabile per bovini e suini	Ceftiofur	Liofilizzato e solvente per soluzione iniettabile	Bovini, Suino		Uso intramuscolare	Bovini: carne 24 ore (uso intramuscolare); latte 0 ore (uso intramuscolare) Suino: carne 48 ore (uso intramuscolare)	103976015 103976027 103976039 103976041	QJ01DD90	Sistemico
		WONDERCEF 1g 50 mgml polvere e solvente per soluzione iniettabile per equidi non destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano NDPA	Ceftiofur	Liofilizzato e solvente per soluzione iniettabile		Cavallo Non DPA	Uso intramuscolare		103976015 103976027 103976039 103976041	QJ01DD90	Sistemico
		WONDERCEF 50 mgml polvere e solvente per soluzione iniettabile per bovini e suini	Ceftiofur	Liofilizzato e solvente per soluzione iniettabile	Bovini, Suino		Uso intramuscolare	Bovini: carne 24 ore (uso intramuscolare); latte 0 ore (uso intramuscolare) Suino: carne 48 ore (uso intramuscolare)	103976015 103976027 103976039 103976041	QJ01DD90	Sistemico
		WONDERCEF 5g 50 mgml polvere e solvente per soluzione iniettabile per equidi non destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano NDPA	Ceftiofur	Liofilizzato e solvente per soluzione iniettabile		Cavallo Non DPA	Uso intramuscolare		103976015 103976027 103976039 103976041	QJ01DD90	Sistemico

Categoria B - LIMITARE

Classe di antibiotici	Molecola	Specialità veterinaria	Sostanze attive	Forma farmaceutica	Specie DPA	Specie non DPA	Vie di somministrazione	Tempi di attesa	Codice AIC	ATCvet	Uso (da ATCvet)
POLIMIXINE	colistina	AQUACOLI 2 000 000 IUml solution for use in drinking watermilk for cattle sheep pigs chickens and turkeys AQUACOLI 2 000 000 UIml Soluzione per uso in acqua da bere o nel latte	COLISTIN SULFATE	Soluzione per somministrazione in acqua da bere/latte	Suino, Bovini (vitello), Ovino (agnello), Polli, Tacchino		Somministrazione in acqua da bere/latte	Bovini (vitelli): carne 1 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Ovini (agnelli): carne 1 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Pollo: carne 1 giorni (somministrazione in acqua da bere); uova 0 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino: carne 1 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte)	104531013 104531025	QA07AA10	Intestinale
		BACOLAM 100 mgml + 250000 UIml sospensione iniettabile per bovini ovicaprini suini equini e tacchini	Amoxicillin + COLISTIN SULFATE	Sospensione iniettabile	Bovini, Caprino, Ovino, Suino, Tacchino	Cavallo Non DPA	Uso intramuscolare; Uso sottocutaneo	Bovini: carne 28 giorni (uso intramuscolare) Caprini: carne 28 giorni (uso intramuscolare) Equidi (cavallo): carne 28 giorni (uso intramuscolare) Ovini: carne 28 giorni (uso intramuscolare) Suino: carne 13 giorni (uso intramuscolare) Uccelli (tacchino): carne 25 giorni (uso sottocutaneo)	100097031 100097043 100097056	QJ01RA01	Sistemico
		COLDOSTIN COLDOSTIN 4 800 000 UIG POWDER FOR ADMINISTRATION IN DRINKING WATERMILK	COLISTIN SULFATE	Polvere per somministrazione in acqua da bere/latte	Tacchino, Suino, Ovino (agnello), Bovini (vitello), Polli		Uso orale	Bovini (vitelli): carne 1 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Ovini (agnelli): carne 1 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Pollo (galline ovaiole): uova 0 giorni (somministrazione in acqua da bere) Pollo: carne 1 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino: carne 1 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Uccelli (tacchino): carne 1 giorni (somministrazione in acqua da bere); uova 0 giorni (somministrazione in acqua da bere)	104933015 104933027 104933039 104933041	QA07AA10	Intestinale
		Colfive 5000000 IUml solution for use in drinking watermilk for calves pigs lambs chickens and turkeys	COLISTIN SULFATE	Concentrato per soluzione orale	Suino, Tacchino, Bovini (vitello), Ovino (agnello), Polli		Somministrazione in acqua da bere/latte; Uso orale	Bovini (vitelli): carne 1 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Ovini (agnelli): carne 1 giorni (somministrazione in acqua da bere) Pollo: carne 1 giorni (somministrazione in acqua da bere); uova 0 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino: carne 1 giorni (somministrazione in acqua da bere) Uccelli (tacchino): carne 1 giorni (somministrazione in acqua da bere); uova 0 giorni (somministrazione in acqua da bere)	104747011 104747023 104747035	QA07AA10	Intestinale
		COLISID 120 mgml soluzione per uso in acqua da bere o in alimento liquido per vitelli da latte suini polli da carne tacchini galline ovaiole conigli	COLISTIN SULFATE	Polvere per somministrazione in acqua da bere	Bovini (vitello), Tacchino, Pollo (gallina ovaiola), Pollo (pollo da carne), Coniglio, Suino		Somministrazione in acqua da bere/latte; Somministrazione in acqua da bere	Bovini (vitelli da latte): carne 7 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Conigli: carne 0 giorni (somministrazione in acqua da bere) Pollo (broiler): carne 0 giorni (somministrazione in acqua da bere) Pollo (galline ovaiole): uova 0 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino: carne 0 giorni (somministrazione in acqua da bere) Uccelli (tacchino): carne 1 giorni (somministrazione in acqua da bere)	102550011 102550047 102550050	QA07AA10	Intestinale
		Colistina solfato 12 Chemifarma 120 mgg polvere solubile per uso in acqua da bere per vitelli da latte suini broiler tacchini galline ovaiole	COLISTIN SULFATE	Soluzione orale	Tacchino, Pollo (gallina ovaiola), Pollo (pollo da carne), Suino, Bovino (vitello lattante)		Somministrazione in acqua da bere	Bovini (vitelli da latte): carne 7 giorni (somministrazione in acqua da bere) Pollo (broiler): carne 0 giorni (somministrazione in acqua da bere) Pollo (galline ovaiole): uova 5 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino: carne 7 giorni (somministrazione in acqua da bere) Uccelli (tacchino): carne 0 giorni (somministrazione in acqua da bere)	102560012	QA07AA10	Intestinale
		DOXAMICINA	COLISTIN SULFATE	Polvere orale	Tacchino, Pollo (gallina ovaiola), Pollo (pollo da carne), Coniglio, Suino		Somministrazione con il mangime	Conigli: carne 0 giorni (somministrazione con il mangime) Pollo (broiler): carne 5 giorni (somministrazione con il mangime) Pollo (galline ovaiole): uova 5 giorni (somministrazione con il mangime) Suino: carne 0 giorni (somministrazione con il mangime) Uccelli (tacchino): carne 5 giorni (somministrazione con il mangime)	102454016	QA07AA10	Intestinale
POLIMIXINE	colistina	ENTEROCIDE 100000 UIml sospensione orale per suinetti conigli agnelli capretti	COLISTIN SULFATE	Sospensione orale	Ovino (agnello), Capra (capretto), Coniglio, Suino (suinetto)		Uso orale	Bovini (vitelli): carne 7 giorni (somministrazione in acqua da bere) Bufali (annutoli): carne 7 giorni (somministrazione in acqua da bere) Caprini: carne 7 giorni (somministrazione in acqua da bere) Conigli: carne 5 giorni (somministrazione in acqua da bere) Ovini (agnelli): carne 7 giorni (somministrazione in acqua da bere) Pollo: carne 0 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino: carne 7 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino: carne 7 giorni (somministrazione in acqua da bere) Uccelli (tacchino): carne 0 giorni (somministrazione in acqua da bere)	101823021 101823084 101823096	QA07AA10	Intestinale
		ENTEROCIDE 12000000 UIg polvere per soluzione orale per vitelli annutoli agnelli capretti suini polli tacchini conigli	COLISTIN SULFATE	Polvere orale	Bovini (vitello), Bufalo (vitello bufalino), Ovino (agnello), Capra (capretto), Suino, Polli, Tacchino, Coniglio		Uso orale	Bovini (vitelli): carne 7 giorni (somministrazione in acqua da bere) Bufali (annutoli): carne 7 giorni (somministrazione in acqua da bere) Caprini: carne 7 giorni (somministrazione in acqua da bere) Conigli: carne 5 giorni (somministrazione in acqua da bere) Ovini (agnelli): carne 7 giorni (somministrazione in acqua da bere) Pollo: carne 0 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino: carne 7 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino: carne 7 giorni (somministrazione in acqua da bere) Uccelli (tacchino): carne 0 giorni (somministrazione in acqua da bere)	101823021 101823084 101823096	QA07AA10	Intestinale
		ENTEROCIDE 4000000 UIg polvere per soluzione orale per vitelli annutoli agnelli capretti suini polli tacchini conigli	COLISTIN SULFATE	Polvere orale	Bovini (vitello), Bufalo (vitello bufalino), Ovino (agnello), Capra (capretto), Suino, Polli, Tacchino, Coniglio		Uso orale	Bovini (vitelli): carne 7 giorni (somministrazione in acqua da bere) Bufali (annutoli): carne 7 giorni (somministrazione in acqua da bere) Caprini: carne 7 giorni (somministrazione in acqua da bere) Conigli: carne 5 giorni (somministrazione in acqua da bere) Ovini (agnelli): carne 7 giorni (somministrazione in acqua da bere) Pollo: carne 0 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino: carne 7 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino: carne 7 giorni (somministrazione in acqua da bere) Uccelli (tacchino): carne 0 giorni (somministrazione in acqua da bere)	101823021 101823084 101823096	QA07AA10	Intestinale
		ENTEROCIDE 800000 UIg polvere per soluzione orale per vitelli annutoli agnelli capretti suini polli tacchini conigli	COLISTIN SULFATE	Polvere orale	Bovini (vitello), Bufalo (vitello bufalino), Ovino (agnello), Capra (capretto), Suino, Polli, Tacchino, Coniglio		Uso orale	Bovini (vitelli): carne 7 giorni (somministrazione in acqua da bere) Bufali (annutoli): carne 7 giorni (somministrazione in acqua da bere) Caprini: carne 7 giorni (somministrazione in acqua da bere) Conigli: carne 5 giorni (somministrazione in acqua da bere) Ovini (agnelli): carne 7 giorni (somministrazione in acqua da bere) Pollo: carne 0 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino: carne 7 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino: carne 7 giorni (somministrazione in acqua da bere) Uccelli (tacchino): carne 0 giorni (somministrazione in acqua da bere)	101823021 101823084 101823096	QA07AA10	Intestinale

Categoria B - LIMITARE

Classe di antibiotici	Molecola	Specialità veterinaria	Sostanze attive	Forma farmaceutica	Specie DPA	Specie non DPA	Vie di somministrazione	Tempi di attesa	Codice AIC	ATCvet	Uso (da ATCvet)
POLIMIXINE	colistina	FILOSTIN 120 LIQUIDO	COLISTIN SULFATE	Soluzione orale	Tacchino, Pollo (gallina ovaiola), Pollo (pollo da carne), Coniglio, Suino, Bovino (vitello lattante)		Somministrazione in acqua da bere	Bovini (vitelli da latte): carne 7 giorni (somministrazione in acqua da bere) Conigli: carne 5 giorni (somministrazione in acqua da bere) Pollo (broiler): carne 0 giorni (somministrazione in acqua da bere) Pollo (galline ovaiole): uova 0 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino: carne 7 giorni (somministrazione in acqua da bere) Uccelli (tacchino): carne 0 giorni (somministrazione in acqua da bere)	102459017 102459029 102459031	QA07AA10	Intestinale
		FILOSTIN SOL	COLISTIN SULFATE	Polvere per somministrazione in acqua da bere	Tacchino, Pollo (gallina ovaiola), Pollo (pollo da carne), Coniglio, Suino, Bovino (vitello lattante)		Somministrazione in acqua da bere	Bovini (vitelli da latte): carne 7 giorni (somministrazione in acqua da bere) Conigli: carne 5 giorni (somministrazione in acqua da bere) Pollo (broiler): carne 5 giorni (somministrazione in acqua da bere) Pollo (galline ovaiole): uova 5 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino: carne 7 giorni (somministrazione in acqua da bere) Uccelli (tacchino): carne 5 giorni (somministrazione in acqua da bere)	102461023	QA07AA10	Intestinale
		HIDROCOL HIDROCOL 4000000 IUML SOLUTION FOR USE IN DRINKING WATERMILK	COLISTIN SULFATE	Soluzione per somministrazione in acqua da bere/latte	Tacchino, Suino, Ovino (agnello), Bovini (vitello), Polli		Uso orale	Bovini (vitelli): carne 1 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Ovini (agnelli): carne 1 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Pollo (galline ovaiole): uova 0 giorni (somministrazione in acqua da bere) Pollo: carne 1 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino: carne 1 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Uccelli (tacchino): carne 1 giorni (somministrazione in acqua da bere); uova 0 giorni (somministrazione in acqua da bere)	104924016 104924028	QA07AA10	Intestinale
		MEDISTIN 120 120 gkg premiscela per alimenti medicamentosi per suini broiler tacchini e galline ovaiole	COLISTIN SULFATE	Premiscela per alimenti medicamentosi	Suino, Polli, Tacchino		Uso orale	Pollo (broiler): carne 5 giorni (somministrazione con il mangime) Pollo (galline ovaiole): uova 5 giorni (somministrazione con il mangime) Suino: carne 0 giorni (somministrazione con il mangime) Uccelli (tacchino): carne 5 giorni (somministrazione con il mangime)	102561014 102561026	QA07AA10	Intestinale
		MULTIBIO sospensione iniettabile per bovini e suini	Colistin + Dexamethasone + Ampicillin	Sospensione iniettabile	Bovini, Suino		Uso intramuscolare	Bovini: carne 60 giorni (uso intramuscolare, uso intraperitoneale, uso sottocutaneo); latte 14 giorni (uso intramuscolare, uso intraperitoneale, uso sottocutaneo) Suino: carne 60 giorni (uso intramuscolare, uso intraperitoneale, uso sottocutaneo)	101588010 101588022	QJ01RV01	Sistemico
		OTOPET TERAPIA	COLISTIN SULFATE + Carbaril + Miconazole + Triamcinolone acetonide + Rifaximin	Gocce auricolari, sospensione		Cane, Gatto	Uso auricolare		100052012	QS02CA04	Auricolare
		POTENCIL	Amoxicillin + COLISTIN SULFATE	Sospensione iniettabile	Bovini, Suino	Cane, Gatto	Uso intramuscolare; Uso sottocutaneo	Bovini: carne 29 giorni (uso intramuscolare, uso sottocutaneo) Suino: carne 12 giorni (uso intramuscolare, uso sottocutaneo)	100234018 100234020 100234032	QJ01RA01	Sistemico
		RALDON 120 mgg soluzione per uso in acqua da bere per vitelli suini polli da carne galline ovaiole tacchini conigli	COLISTIN SULFATE	Soluzione per somministrazione in acqua da bere	Tacchino, Pollo (gallina ovaiola), Pollo (pollo da carne), Coniglio, Suini (da ingrasso), Bovino (vitello lattante)		Somministrazione in acqua da bere	Bovini (vitelli da latte): carne 7 giorni (somministrazione in acqua da bere) Bovini (vitelli): carne 7 giorni (somministrazione in acqua da bere) Conigli: carne 5 giorni (somministrazione in acqua da bere) Pollo (broiler): carne 1 giorni (somministrazione in acqua da bere) Pollo (galline ovaiole): uova 0 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino (suini da ingrasso): carne 7 giorni (somministrazione in acqua da bere) Uccelli (tacchino): carne 1 giorni (somministrazione in acqua da bere)	102453014 102453026 102453038 102453040 102453053 102453065	QA07AA10	Intestinale
		RALDON 600 mgg polvere per uso in acqua da bere per vitelli suini polli da carne galline ovaiole tacchini conigli	COLISTIN SULFATE	Soluzione per somministrazione in acqua da bere	Tacchino, Pollo (gallina ovaiola), Pollo (pollo da carne), Bovini (vitello), Coniglio, Suini (da ingrasso), Bovino (vitello lattante)		Somministrazione in acqua da bere	Bovini (vitelli da latte): carne 7 giorni (somministrazione in acqua da bere) Bovini (vitelli): carne 7 giorni (somministrazione in acqua da bere) Conigli: carne 5 giorni (somministrazione in acqua da bere) Pollo (broiler): carne 1 giorni (somministrazione in acqua da bere) Pollo (galline ovaiole): uova 0 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino (suini da ingrasso): carne 7 giorni (somministrazione in acqua da bere) Uccelli (tacchino): carne 1 giorni (somministrazione in acqua da bere)	102453014 102453026 102453038 102453040 102453053 102453065	QA07AA10	Intestinale
		STIMIXIN LIQUIDO 120 mgg soluzione orale per vitelli da latte suini polli da carne tacchini galline ovaiole e conigli	COLISTIN SULFATE	Soluzione orale	Bovini (vitello), Suino, Pollo (pollo da carne), Tacchino, Pollo (gallina ovaiola), Coniglio		Uso orale	Bovini (vitelli da latte): carne 7 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Conigli: carne 5 giorni (somministrazione in acqua da bere) Pollo (broiler): carne 0 giorni (somministrazione in acqua da bere) Pollo (galline ovaiole): uova 0 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino: carne 7 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Uccelli (tacchino): carne 1 giorni (somministrazione in acqua da bere)	102559010 102559022 102559034 102559046 102559059 102559061	QA07AA10	Intestinale
		STIMIXIN LIQUIDO 360 mgg soluzione orale per vitelli da latte suini polli da carne tacchini galline ovaiole e conigli	COLISTIN SULFATE	Soluzione orale	Bovini (vitello), Suino, Pollo (pollo da carne), Tacchino, Pollo (gallina ovaiola), Coniglio		Uso orale	Bovini (vitelli da latte): carne 7 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Conigli: carne 5 giorni (somministrazione in acqua da bere) Pollo (broiler): carne 0 giorni (somministrazione in acqua da bere) Pollo (galline ovaiole): uova 0 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino: carne 7 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Uccelli (tacchino): carne 1 giorni (somministrazione in acqua da bere)	102559010 102559022 102559034 102559046 102559059 102559061	QA07AA10	Intestinale
	polimixina B	Chanear	POLYMYXIN B SULFATE + Prednisolone acetate + Miconazole nitrate	Gocce auricolari, sospensione		Cane, Gatto	Uso auricolare; Uso cutaneo		Non presente nell'elenco ministeriale	QS02CA01	Auricolare
		DUOMYXIN 3 400 IUml 10 000 IUml Eye drops powder and solvent for solution for dogs and cats	NEOMYCIN SULFATE + POLYMYXIN B SULFATE	Collirio, polvere per soluzione		Gatto, Cane	Uso oftalmico		105676011	QS01AA30	Oftalmico
		MIPREPOL 20 mgml + 448 mgml + 05293 mgml cutaneous suspensionear drops suspension for dogs and cats	Miconazole + Prednisolone + POLYMYXIN B SULFATE	Cutaneous/ear drops suspension		Cane, Gatto	Uso cutaneo; Uso auricolare		104700012 104700024 104700036 104700048	QS02CA01	Auricolare

Categoria B - LIMITARE

Classe di antibiotici	Molecola	Specialità veterinaria	Sostanze attive	Forma farmaceutica	Specie DPA	Specie non DPA	Vie di somministrazione	Tempi di attesa	Codice AIC	ATCvet	Uso (da ATCvet)
POLIMIXINE	polimixina B	Mitex Ohrentropfen und Suspension zur Anwendung auf der Haut für Hunde und Katzen	Miconazole nitrate + Prednisolone acetate + POLYMYXIN B SULFATE	Cutaneous/ear drops suspension		Cane, Gatto	Uso auricolare; Uso cutaneo		104740016	QS02CA01	Auricolare
		Otisur	POLYMYXIN B SULFATE + Prednisolone acetate + Miconazole nitrate	Gocce auricolari, sospensione		Cane, Gatto	Uso auricolare; Uso cutaneo		105615013 105615025	QS02CA01	Auricolare
		Otomicol ear drops and cutaneous suspension for dogs cats and guinea pigs Otomicol gocce auricolari e sospensione cutanea per cani gatti e porcellini dindia	Miconazole nitrate + Prednisolone acetate + POLYMYXIN B SULFATE	Gocce auricolari, sospensione		Gatto, Cane, Porcellino d'India	Uso auricolare; Uso cutaneo		105786014	QS02CA01	Auricolare
		Ototop Ear Drops and Cutaneous Suspension for Dogs Cats and Guinea Pigs Ototop gocce auricolari e sospensione cutanea per cani gatti e cavie	POLYMYXIN B SULFATE + Prednisolone acetate + Miconazole nitrate	Cutaneous/ear drops suspension		Cane, Gatto, Porcellino d'India	Uso cutaneo; Uso auricolare		105353015 105353027	QS02CA01	Auricolare
		Surolan sospensione cutaneagocce auricolari per cani e gatti	Miconazole nitrate + POLYMYXIN B SULFATE + Prednisolone acetate	Cutaneous/ear drops suspension		Cane, Gatto	Uso cutaneo		100167016 100167028 100167042 100167055	QS02CA01	Auricolare
CHINOLONI: FLUOROCHINOLONI E ALTRI CHINOLONI	cinoxacina	Nessuna specialità veterinaria autorizzata in Italia									
	danofloxacina	ADVOCIN 180 180 MGML SOLUTION FOR INJECTION FOR CATTLE Advovet 180 180 mgml Soluzione Iniettabile per Bovini	Danofloxacin mesilate	Soluzione iniettabile	Bovini		Uso endovenoso; Uso sottocutaneo	Bovini: carne 8 giorni (uso endovenoso, uso sottocutaneo); latte 4 giorni (uso endovenoso, uso sottocutaneo)	103312017 103312029 103312031	QJ01MA92	Sistemico
	difloxacina	Nessuna specialità veterinaria autorizzata in Italia									
	enrofloxacina	Baytril 10 OL	Enrofloxacin	Soluzione orale	Polli, Tacchino, Coniglio		Uso orale	Conigli: carne 3 giorni (somministrazione in acqua da bere) Pollo: carne 7 giorni (somministrazione in acqua da bere) Uccelli (tacchino): carne 13 giorni (somministrazione in acqua da bere)	101057014 101057026 101057038 101057040	QJ01MA90	Sistemico
		Baytril 100 mgml soluzione iniettabile	Enrofloxacin	Soluzione iniettabile	Ovino, Caprino, Bovini, Suino		Uso sottocutaneo; Uso intramuscolare; Uso endovenoso	Bovini: carne 12 giorni (uso sottocutaneo); carne 5 giorni (uso endovenoso); latte 3 giorni (uso endovenoso); latte 4 giorni (uso sottocutaneo) Bovini (vitelli): carne 12 giorni (uso sottocutaneo); carne 5 giorni (uso endovenoso); carne 7 giorni (uso orale) Caprini: carne 14 giorni (uso orale); carne 6 giorni (uso sottocutaneo, dispersione superficiale sull'alimento); latte 4 giorni (uso sottocutaneo); latte 8 giorni (uso orale) Conigli: carne 11 giorni (uso orale); carne 6 giorni (uso sottocutaneo, uso intramuscolare) Ovini: carne 14 giorni (uso orale); carne 4 giorni (uso sottocutaneo); latte 3 giorni (uso sottocutaneo); latte 8 giorni (uso orale) Suino: carne 3 giorni (uso orale) Suino: carne 10 giorni (uso orale); carne 13 giorni (uso intramuscolare)	100155023 100155035 100155047 100155050 100155062 100155074 100155086 100155098 100155100 100155112 100155124 100155136 100155148 100155151 100155163 100155175 100155199 100155201 100155213 100155225	QJ01MA90	Sistemico

Categoria B - LIMITARE

Classe di antibiotici	Molecola	Specialità veterinaria	Sostanze attive	Forma farmaceutica	Specie DPA	Specie non DPA	Vie di somministrazione	Tempi di attesa	Codice AIC	ATCvet	Uso (da ATCvet)
CHINOLONI: FLUOROCHINOLONI E ALTRI CHINOLONI	enrofloxacina	Baytril 25 mgml soluzione iniettabile	Enrofloxacin	Soluzione iniettabile	Coniglio, Suino (suinetto)	Cane, Gatto, Roditori, Rettili, Uccelli da gabbia e da voliera	Uso intramuscolare; Uso sottocutaneo	Bovini: carne 12 giorni (uso sottocutaneo); carne 5 giorni (uso endovenoso); latte 3 giorni (uso endovenoso); latte 4 giorni (uso sottocutaneo) Bovini (vitelli): carne 12 giorni (uso sottocutaneo); carne 5 giorni (uso endovenoso); carne 7 giorni (uso orale) Caprini: carne 14 giorni (uso orale); carne 6 giorni (uso sottocutaneo, dispersione superficiale sull'alimento); latte 4 giorni (uso sottocutaneo); latte 8 giorni (uso orale) Conigli: carne 11 giorni (uso orale); carne 6 giorni (uso sottocutaneo, uso intramuscolare) Ovini: carne 14 giorni (uso orale); carne 4 giorni (uso sottocutaneo); latte 3 giorni (uso sottocutaneo); latte 8 giorni (uso orale) Suino: carne 3 giorni (uso orale) Suino: carne 10 giorni (uso orale); carne 13 giorni (uso intramuscolare)	100155023 100155035 100155047 100155050 100155062 100155074 100155086 100155098 100155100 100155112 100155124 100155136 100155148 100155151 100155163 100155175 100155199 100155201 100155213 100155225	QJ01MA90	Sistemico
		Baytril 25 mgml soluzione iniettabile per cani gatti roditori e conigli da compagnia rettili e uccelli ornamentali	Enrofloxacin	Soluzione iniettabile		Cane, Gatto, Roditori, Coniglio Non DPA, Rettili, Uccelli da gabbia e da voliera	Uso intramuscolare; Uso sottocutaneo		100155023 100155035 100155047 100155050 100155062 100155074 100155086 100155098 100155100 100155112 100155124 100155136 100155148 100155151 100155163 100155175 100155199 100155201 100155213 100155225	QJ01MA90	Sistemico
		Baytril 25 mgml soluzione orale per vitelli ovini caprini suini	Enrofloxacin	Soluzione orale	Bovini (vitello), Ovino, Caprino, Suino		Uso orale	Bovini: carne 12 giorni (uso sottocutaneo); carne 5 giorni (uso endovenoso); latte 3 giorni (uso endovenoso); latte 4 giorni (uso sottocutaneo) Bovini (vitelli): carne 12 giorni (uso sottocutaneo); carne 5 giorni (uso endovenoso); carne 7 giorni (uso orale) Caprini: carne 14 giorni (uso orale); carne 6 giorni (uso sottocutaneo, dispersione superficiale sull'alimento); latte 4 giorni (uso sottocutaneo); latte 8 giorni (uso orale) Conigli: carne 11 giorni (uso orale); carne 6 giorni (uso sottocutaneo, uso intramuscolare) Ovini: carne 14 giorni (uso orale); carne 4 giorni (uso sottocutaneo); latte 3 giorni (uso sottocutaneo); latte 8 giorni (uso orale) Suino: carne 3 giorni (uso orale) Suino: carne 10 giorni (uso orale); carne 13 giorni (uso intramuscolare)	100155023 100155035 100155047 100155050 100155062 100155074 100155086 100155098 100155100 100155112 100155124 100155136 100155148 100155151 100155163 100155175 100155199 100155201 100155213 100155225	QJ01MA90	Sistemico
		Baytril 50 mgml soluzione iniettabile	Enrofloxacin	Soluzione iniettabile	Bovini (vitello), Ovino, Caprino, Suino	Cane, Gatto	Uso sottocutaneo; Uso intramuscolare; Uso endovenoso	Bovini: carne 12 giorni (uso sottocutaneo); carne 5 giorni (uso endovenoso); latte 3 giorni (uso endovenoso); latte 4 giorni (uso sottocutaneo) Bovini (vitelli): carne 12 giorni (uso sottocutaneo); carne 5 giorni (uso endovenoso); carne 7 giorni (uso orale) Caprini: carne 14 giorni (uso orale); carne 6 giorni (uso sottocutaneo, dispersione superficiale sull'alimento); latte 4 giorni (uso sottocutaneo); latte 8 giorni (uso orale) Conigli: carne 11 giorni (uso orale); carne 6 giorni (uso sottocutaneo, uso intramuscolare) Ovini: carne 14 giorni (uso orale); carne 4 giorni (uso sottocutaneo); latte 3 giorni (uso sottocutaneo); latte 8 giorni (uso orale) Suino: carne 3 giorni (uso orale) Suino: carne 10 giorni (uso orale); carne 13 giorni (uso intramuscolare)	100155023 100155035 100155047 100155050 100155062 100155074 100155086 100155098 100155100 100155112 100155124 100155136 100155148 100155151 100155163 100155175 100155199 100155201 100155213 100155225	QJ01MA90	Sistemico

Categoria B - LIMITARE

Classe di antibiotici	Molecola	Specialità veterinaria	Sostanze attive	Forma farmaceutica	Specie DPA	Specie non DPA	Vie di somministrazione	Tempi di attesa	Codice AIC	ATCvet	Uso (da ATCvet)
CHINOLONI: FLUOROCHINOLONI E ALTRI CHINOLONI	enrofloxacina	Baytril Direct 100 mgml Injektionslösung für Rinder und Schweine	Enrofloxacin	Soluzione iniettabile	Suino, Bovini		Uso intramuscolare; Uso endovenoso; Uso sottocutaneo	Bovini: carne 12 giorni (uso sottocutaneo); carne 5 giorni (uso endovenoso); latte 3 giorni (uso endovenoso); latte 4 giorni (uso sottocutaneo) Bovini (vitelli): carne 12 giorni (uso sottocutaneo); carne 5 giorni (uso endovenoso); carne 7 giorni (uso orale) Caprini: carne 14 giorni (uso orale); carne 6 giorni (uso sottocutaneo, dispersione superficiale sull'alimento); latte 4 giorni (uso sottocutaneo); latte 8 giorni (uso orale) Conigli: carne 11 giorni (uso orale); carne 6 giorni (uso sottocutaneo, uso intramuscolare) Ovini: carne 14 giorni (uso orale); carne 4 giorni (uso sottocutaneo); latte 3 giorni (uso sottocutaneo); latte 8 giorni (uso orale) Suino: carne 3 giorni (uso orale) Suino: carne 10 giorni (uso orale); carne 13 giorni (uso intramuscolare)	100155023 100155035 100155047 100155050 100155062 100155074 100155086 100155098 100155100 100155112 100155124 100155136 100155148 100155151 100155163 100155175 100155199 100155201 100155213 100155225	QJ01MA90	Sistemico
		Baytril flavour 15 mg compresse per cani e gatti	Enrofloxacin	Compressa		Cane, Gatto	Uso orale		100155023 100155035 100155047 100155050 100155062 100155074 100155086 100155098 100155100 100155112 100155124 100155136 100155148 100155151 100155163 100155175 100155199 100155201 100155213 100155225	QJ01MA90	Sistemico
		Baytril flavour 150 mg compresse per cani e gatti	Enrofloxacin	Compressa		Cane, Gatto	Uso orale		100155023 100155035 100155047 100155050 100155062 100155074 100155086 100155098 100155100 100155112 100155124 100155136 100155148 100155151 100155163 100155175 100155199 100155201 100155213 100155225	QJ01MA90	Sistemico
		Baytril flavour 25 mgml oral suspension for cat	Enrofloxacin	Sospensione orale		Gatto	Uso orale		104308010 104308022	QJ01MA90	Sistemico

Categoria B - LIMITARE

Classe di antibiotici	Molecola	Specialità veterinaria	Sostanze attive	Forma farmaceutica	Specie DPA	Specie non DPA	Vie di somministrazione	Tempi di attesa	Codice AIC	ATCvet	Uso (da ATCvet)
CHINOLONI: FLUOROCHINOLONI E ALTRI CHINOLONI	enrofloxacina	Baytril flavour 50 mg compresse per cani e gatti	Enrofloxacin	Compressa		Cane, Gatto	Uso orale		100155023 100155035 100155047 100155050 100155062 100155074 100155086 100155098 100155100 100155112 100155124 100155136 100155148 100155151 100155163 100155175 100155199 100155201 100155213 100155225	QJ01MA90	Sistemico
		Baytril flavour compresse da 250 mg per cani	Enrofloxacin	Compressa		Cane, Gatto	Uso orale		100155023 100155035 100155047 100155050 100155062 100155074 100155086 100155098 100155100 100155112 100155124 100155136 100155148 100155151 100155163 100155175 100155199 100155201 100155213 100155225	QJ01MA90	Sistemico
		BAYTRIL OTIC	Enrofloxacin + Sulfadiazine silver	Gocce auricolari, emulsione		Cane	Uso auricolare		103829014	QS02AA30	Auricolare
		Baytril soluzione orale 5 mgml con pig doser per suinetti e conigli	Enrofloxacin	Soluzione orale	Suino (suinetto), Coniglio		Uso orale	Bovini: carne 12 giorni (uso sottocutaneo); carne 5 giorni (uso endovenoso); latte 3 giorni (uso endovenoso); latte 4 giorni (uso sottocutaneo) Bovini (vitelli): carne 12 giorni (uso sottocutaneo); carne 5 giorni (uso endovenoso); carne 7 giorni (uso orale) Caprini: carne 14 giorni (uso orale); carne 6 giorni (uso sottocutaneo, dispersione superficiale sull'alimento); latte 4 giorni (uso sottocutaneo); latte 8 giorni (uso orale) Conigli: carne 11 giorni (uso orale); carne 6 giorni (uso sottocutaneo, uso intramuscolare) Ovini: carne 14 giorni (uso orale); carne 4 giorni (uso sottocutaneo); latte 3 giorni (uso sottocutaneo); latte 8 giorni (uso orale) Suino: carne 3 giorni (uso orale) Suino: carne 10 giorni (uso orale); carne 13 giorni (uso intramuscolare)	100155023 100155035 100155047 100155050 100155062 100155074 100155086 100155098 100155100 100155112 100155124 100155136 100155148 100155151 100155163 100155175 100155199 100155201 100155213 100155225	QJ01MA90	Sistemico
		COLMYC 100MGML QUINOLCEN 100 mgml Injection	Enrofloxacin	Soluzione iniettabile	Bovini, Ovino, Caprino, Suino		Uso sottocutaneo; Uso endovenoso; Uso intramuscolare	Bovini: carne 12 giorni (uso sottocutaneo); carne 5 giorni (uso endovenoso); latte 3 giorni (uso endovenoso); latte 4 giorni (uso sottocutaneo) Caprini: carne 6 giorni (uso sottocutaneo); latte 4 giorni (uso sottocutaneo) Ovini: carne 4 giorni (uso sottocutaneo); latte 3 giorni (uso sottocutaneo) Suino: carne 13 giorni (uso intramuscolare)	104191010 104191022 104191034	QJ01MA90	Sistemico
		EFLOXIN	Enrofloxacin	Soluzione iniettabile	Suino, Bovini (vitello), Ovino		Uso intramuscolare; Uso endovenoso; Uso sottocutaneo	Bovini (vitelli): carne 12 giorni (uso sottocutaneo); carne 5 giorni (uso endovenoso) Ovini: carne 4 giorni (uso sottocutaneo); latte 3 giorni (uso sottocutaneo) Suino: carne 13 giorni (uso intramuscolare)	104357013	QJ01MA90	Sistemico
		ENROBACTIN Enrobactin 25 mgml concentrate for oral solution for pet rabbits rodents ornamental birds and reptiles	Enrofloxacin	Concentrato per soluzione orale	Coniglio	Rettili, Uccelli da gabbia e da voliera, Roditori	Uso orale	Non indicato nell'elenco ministeriale: vedi RCP	104806017 104806029 104806031	QJ01MA90	Sistemico
		ENROCAT FLAVOUR 25 MGML SOSPENSIONE ORALE PER GATTI Enrocat flavour 25 mgml oral suspension for cats	Enrofloxacin	Sospensione orale		Gatto	Uso orale		105218010	QJ01MA90	Sistemico

Categoria B - LIMITARE

Classe di antibiotici	Molecola	Specialità veterinaria	Sostanze attive	Forma farmaceutica	Specie DPA	Specie non DPA	Vie di somministrazione	Tempi di attesa	Codice AIC	ATCvet	Uso (da ATCvet)
CHINOLONI: FLUOROCHINOLONI E ALTRI CHINOLONI	enrofloxacina	ENRODEXIL 100 MGML ENRODEXIL 100 mgml solution for injection for cattle and pigs	Enrofloxacin	Soluzione iniettabile	Suino, Bovini		Uso intramuscolare; Uso endovenoso; Uso sottocutaneo	Bovini: carne 12 giorni (uso sottocutaneo); carne 5 giorni (uso endovenoso); latte 3 giorni (uso endovenoso); latte 4 giorni (uso sottocutaneo) Suino: carne 13 giorni (uso intramuscolare)	104419015 104419027	QJ01MA90	Sistemico
		ENROSYVA ENROSYVA 100 mgml solution for injection for cattle and pigs	Enrofloxacin	Soluzione iniettabile	Bovini, Suino		Uso intramuscolare; Uso endovenoso; Uso sottocutaneo	Bovini: carne 12 giorni (uso sottocutaneo); carne 5 giorni (uso intramuscolare); latte 3 giorni (uso intramuscolare); latte 4 giorni (uso sottocutaneo); organi 12 giorni (uso sottocutaneo); organi 5 giorni (uso intramuscolare) Suino: carne 13 giorni (uso intramuscolare, uso sottocutaneo); organi 13 giorni (uso intramuscolare, uso sottocutaneo)	105216016 105216028	QJ01MA90	Sistemico
		Enrotron 50 mgml Solution for injection for cattle sheep goats pigs dogs and cats Enrovet 50 mgml soluzione iniettabile per cani gatti roditori rettili e uccelli ornamentali	Enrofloxacin	Soluzione iniettabile	Suino, Bovini, Caprino, Ovino	Cane, Gatto	Uso intramuscolare; Uso endovenoso; Uso sottocutaneo	Bovini: carne 12 giorni (uso sottocutaneo); carne 5 giorni (uso endovenoso); latte 3 giorni (uso endovenoso); latte 4 giorni (uso sottocutaneo) Bovini: latte 3 giorni (uso endovenoso); latte 4 giorni (uso sottocutaneo) Bovini (vitelli): carne 12 giorni (uso sottocutaneo); carne 5 giorni (uso endovenoso) Caprini: carne 6 giorni (uso sottocutaneo); latte 4 giorni (uso sottocutaneo) Ovini: carne 4 giorni (uso sottocutaneo); latte 3 giorni (uso sottocutaneo) Suino: carne 13 giorni (uso intramuscolare)	104370010 104370022 104370034 104370046 104370059 104370061	QJ01MA90	Sistemico
		ENROVETSOLUZIONE INIETTABILE Enrotron 100 mgml Solution for injection for cattle sheep goats and pigs	Enrofloxacin	Soluzione iniettabile	Suino, Bovini, Caprino, Ovino		Uso intramuscolare; Uso endovenoso; Uso sottocutaneo	Bovini: carne 12 giorni (uso sottocutaneo); carne 5 giorni (uso endovenoso); latte 3 giorni (uso endovenoso); latte 4 giorni (uso sottocutaneo) Bovini: latte 3 giorni (uso endovenoso); latte 4 giorni (uso sottocutaneo) Bovini (vitelli): carne 12 giorni (uso sottocutaneo); carne 5 giorni (uso endovenoso) Caprini: carne 6 giorni (uso sottocutaneo); latte 4 giorni (uso sottocutaneo) Ovini: carne 4 giorni (uso sottocutaneo); latte 3 giorni (uso sottocutaneo) Suino: carne 13 giorni (uso intramuscolare)	104370010 104370022 104370034 104370046 104370059 104370061	QJ01MA90	Sistemico
		ENROVETSOLUZIONE INIETTABILE Enrotron 25 mgml Solution for injection for dogs cats rodents reptiles and ornamental birds	Enrofloxacin	Soluzione iniettabile		Rettili, Uccelli da gabbia e da voliera, Cane, Gatto, Cincillà, Gerbillo, Porcellino d'India, Criceto, Topo, Ratto	Uso intramuscolare; Uso sottocutaneo		104370010 104370022 104370034 104370046 104370059 104370061	QJ01MA90	Sistemico
		ENROX FLAVOUR COMPRESSE Enrox Flavour 50 mg Tablets for dogs	Enrofloxacin	Compressa		Cane	Uso orale		103992018 103992020 103992032 103992044 103992057 103992069	QJ01MA90	Sistemico
		ENROX FLAVOUR COMPRESSE Enrox Flavour 150 mg Tablets for dogs	Enrofloxacin	Compressa		Cane	Uso orale		103992018 103992020 103992032 103992044 103992057 103992069	QJ01MA90	Sistemico
		ENROX FLAVOUR COMPRESSE Enrox Flavour 15 mg Tablets for dogs and cats	Enrofloxacin	Compressa		Cane, Gatto	Uso orale		103992018 103992020 103992032 103992044 103992057 103992069	QJ01MA90	Sistemico
		Enroxal 100 mgml oral solution for chickens and turkeys	Enrofloxacin	Soluzione orale	Tacchino, Polli		Somministrazione in acqua da bere	Pollo: carne 7 giorni (somministrazione in acqua da bere) Uccelli (tacchino): carne 13 giorni (somministrazione in acqua da bere)	104590017 104590029 104590031	QJ01MA90	Sistemico
		ENROXAL FLAVOUR 15 MG	Enrofloxacin	Compressa		Cane, Gatto	Uso orale		104903012 104903024 104903036 104903048 104903051 104903063	QJ01MA90	Sistemico
		ENROXAL FLAVOUR 150 MG	Enrofloxacin	Compressa		Cane	Uso orale		104903012 104903024 104903036 104903048 104903051 104903063	QJ01MA90	Sistemico
		ENROXAL FLAVOUR 50 MG	Enrofloxacin	Compressa		Cane, Gatto	Uso orale		104903012 104903024 104903036 104903048 104903051 104903063	QJ01MA90	Sistemico

Categoria B - LIMITARE

Classe di antibiotici	Molecola	Specialità veterinaria	Sostanze attive	Forma farmaceutica	Specie DPA	Specie non DPA	Vie di somministrazione	Tempi di attesa	Codice AIC	ATCvet	Uso (da ATCvet)
CHINOLONI: FLUOROCHINOLONI E ALTRI CHINOLONI	enrofloxacina	ENROXAL MAX 100 mgml soluzione iniettabile per bovini e suini Enrox Max 100 mgml Injektionslösung für Rinder und Schweine	Enrofloxacin	Soluzione iniettabile	Suino, Bovini		Uso intramuscolare; Uso endovenoso; Uso sottocutaneo	Bovini: carne 14 giorni (uso sottocutaneo); carne 7 giorni (uso endovenoso); latte 120 ore (uso sottocutaneo); latte 72 ore (uso endovenoso) Suino: carne 12 giorni (uso intramuscolare)	104587011	QJ01MA90	Sistemico
		Enroxil Max 100 mgml solution for injection for cattle	Enrofloxacin	Soluzione iniettabile	Bovini		Uso endovenoso; Uso sottocutaneo	Non disponibile (specialità assente dall'elenco ministeriale)	Non presente nell'elenco ministeriale	QJ01MA90	Sistemico
		Fenoflox 100 mgml Solution for Injection for Cattle and Pigs GELLIFLOX 100 MGML SOLUZIONE INIETTABILE PER BOVINI E SUINI	Enrofloxacin	Soluzione iniettabile	Suino, Bovini		Uso intramuscolare; Uso endovenoso; Uso sottocutaneo	Bovini: carne 12 giorni (uso sottocutaneo); carne 5 giorni (uso endovenoso); latte 3 giorni (uso endovenoso); latte 4 giorni (uso sottocutaneo) Suino: carne 13 giorni (uso intramuscolare)	104123017 104123029	QJ01MA90	Sistemico
		Fenoflox 50 mgml Solution for Injection for Cattle Pigs Dogs and Cats GELLIFLOX 50 MGML SOLUZIONE INIETTABILE PER BOVINI E SUINI	Enrofloxacin	Soluzione iniettabile	Suino, Bovini	Cane, Gatto	Uso intramuscolare; Uso endovenoso; Uso sottocutaneo	Bovini (vitelli): carne 12 giorni (uso sottocutaneo); carne 5 giorni (uso endovenoso) Suino: carne 13 giorni (uso intramuscolare)	104124019 104124021	QJ01MA90	Sistemico
		Floxabactin 15 mg compresse per gatti e cani Floxabactin 15 mg tablets for cats and dogs	Enrofloxacin	Compressa		Cane, Gatto	Uso orale		104167010 104167022 104167034 104167046 104167059 104167061 104167073 104167085 104167097 104167109 104167111 104167123 104167135 104167147 104167150 104167162 104167174 104167186 104167198 104167200 104167212	QJ01MA90	Sistemico
		Floxabactin 150 mg compresse per cani Floxabactin 150 mg tablets for dogs	Enrofloxacin	Compressa		Cane	Uso orale		104167010 104167022 104167034 104167046 104167059 104167061 104167073 104167085 104167097 104167109 104167111 104167123 104167135 104167147 104167150 104167162 104167174 104167186 104167198 104167200 104167212	QJ01MA90	Sistemico

Categoria B - LIMITARE

Classe di antibiotici	Molecola	Specialità veterinaria	Sostanze attive	Forma farmaceutica	Specie DPA	Specie non DPA	Vie di somministrazione	Tempi di attesa	Codice AIC	ATCvet	Uso (da ATCvet)
CHINOLONI: FLUOROCHINOLONI E ALTRI CHINOLONI	enrofloxacina	Floxabactin 50 mg compresse per cani Floxabactin 50 mg tablets for dogs	Enrofloxacin	Compressa		Cane	Uso orale		104167010 104167022 104167034 104167046 104167059 104167061 104167073 104167085 104167097 104167109 104167111 104167123 104167135 104167147 104167150 104167162 104167174 104167186 104167198 104167200 104167212	QJ01MA90	Sistemico
		FLOXADOX	Enrofloxacin	Soluzione orale	Quaglia, Tacchino, Pollo (pollo da carne), Anatra, Faraona, Fagiano, Coniglio		Somministrazione in acqua da bere	Conigli: carne 3 giorni (somministrazione in acqua da bere) Pollo (broiler): carne 7 giorni (somministrazione in acqua da bere) Uccelli (anatre): carne 4 giorni (somministrazione in acqua da bere) Uccelli (fagiani): carne 4 giorni (somministrazione in acqua da bere) Uccelli (faraone): carne 4 giorni (somministrazione in acqua da bere) Uccelli (quaglie): carne 4 giorni (somministrazione in acqua da bere) Uccelli (tacchino): carne 13 giorni (somministrazione in acqua da bere)	104066016 104066028 104066042	QJ01MA90	Sistemico
		FLOXAVEX 100 mgml concentrato per soluzione orale per polli e tacchini Floxamax 100 mgml concentrate for oral solution for chickens and turkeys	Enrofloxacin	Soluzione orale	Tacchino, Polli		Uso orale	Pollo (broiler): carne 7 giorni (somministrazione in acqua da bere) Uccelli (tacchino): carne 13 giorni (somministrazione in acqua da bere)	103944017 103944029	QJ01MA90	Sistemico
		INTERFLOX100 Interflox100 100 mgml solution for injection for cattle sheep goats and pigs	Enrofloxacin	Soluzione iniettabile	Bovini, Ovino, Caprino, Suino		Uso endovenoso; Uso sottocutaneo; Uso intramuscolare	Bovini: carne 12 giorni (uso sottocutaneo); carne 5 giorni (uso endovenoso) Bovini: latte 3 giorni (uso endovenoso); latte 4 giorni (uso sottocutaneo) Caprini: carne 6 giorni (uso sottocutaneo) Caprini (capre per la produzione di latte): latte 4 giorni (uso sottocutaneo) Ovini: carne 4 giorni (uso sottocutaneo) Ovini (ovine/pecore femm adulte): latte 3 giorni (uso sottocutaneo) Suino: carne 13 giorni (uso intramuscolare)	105365011	QJ01MA90	Sistemico
		KFLOX 100 mgml solution for use in drinking water for chickens and rabbits KFLOX 100 mgml soluzione in acqua da bere per polli e conigli	Enrofloxacin	Soluzione per somministrazione in acqua da bere	Coniglio, Pollo (pollo da carne)		Somministrazione in acqua da bere/latte	Conigli: carne 2 giorni (somministrazione in acqua da bere) Pollo (broiler): carne 7 giorni (somministrazione in acqua da bere)	104184015 104184027	QJ01MA90	Sistemico
		LEVOFLOK LEVOFLOK 100 mgml Solution for use in drinking water for chickens turkeys and rabbits	Enrofloxacin	Soluzione per somministrazione in acqua da bere	Coniglio, Pollo (pollo da carne), Tacchino (da carne)		Somministrazione in acqua da bere	Conigli: carne 2 giorni (somministrazione in acqua da bere, uso orale) Pollo (broiler): carne 7 giorni (uso orale) Pollo: carne 7 giorni (somministrazione in acqua da bere) Uccelli (tacchino): carne 13 giorni (somministrazione in acqua da bere, uso orale)	104186010 104186022 104186034	QJ01MA90	Sistemico
		QUINOFLOX 100 mgml soluzione per uso in acqua da bere per polli e conigli Quinoflox 100 mgml solution for use in drinking water chicken and rabbits	Enrofloxacin	Soluzione orale	Coniglio, Polli		Uso orale	Conigli: carne 2 giorni (somministrazione in acqua da bere) Pollo: carne 7 giorni (somministrazione in acqua da bere)	104332010 104332022	QJ01MA90	Sistemico
		ROXACIN 100 MGML ROXACIN 100 mgml solution for injection for cattle and pigs	Enrofloxacin	Soluzione iniettabile	Suino, Bovini		Uso intramuscolare; Uso endovenoso; Uso sottocutaneo	Bovini: carne 12 giorni (uso sottocutaneo); carne 5 giorni (uso endovenoso) Bovini: latte 72 ore (uso endovenoso); latte 96 ore (uso sottocutaneo) Suino: carne 13 giorni (uso intramuscolare)	104264015 104264027	QJ01MA90	Sistemico
		UNISOL 25 MGML Unisol 25 mgml oral solution for calves	Enrofloxacin	Soluzione orale	Bovini		Uso orale	Bovini (vitelli): carne 11 giorni (uso orale, somministrazione in acqua da bere); organi 11 giorni (uso orale)	104750017 104750029 104750031	QJ01MA90	Sistemico
		VALEMAS 10 100 mgml soluzione iniettabile per bovini ovini caprini e suini	Enrofloxacin	Soluzione iniettabile	Bovini, Ovino, Caprino, Suino		Uso endovenoso; Uso sottocutaneo; Uso intramuscolare	Bovini: carne 12 giorni (uso sottocutaneo); carne 5 giorni (uso endovenoso); latte 3 giorni (uso endovenoso); latte 4 giorni (uso sottocutaneo) Caprini: carne 6 giorni (uso sottocutaneo); latte 3 giorni (uso sottocutaneo); latte 4 giorni (uso sottocutaneo) Ovini: carne 4 giorni (uso sottocutaneo); latte 3 giorni (uso sottocutaneo) Suino: carne 13 giorni (uso intramuscolare)	104150014 104150026 104150038	QJ01MA90	Sistemico
		VALEMAS 5 50 mgml soluzione iniettabile per bovini ovini caprini e suini	Enrofloxacin	Soluzione iniettabile	Ovino, Caprino, Bovini (vitello), Suino		Uso sottocutaneo; Uso endovenoso; Uso intramuscolare	Bovini (vitelli): carne 12 giorni (uso sottocutaneo); carne 5 giorni (uso endovenoso) Caprini: carne 6 giorni (uso sottocutaneo); latte 4 giorni (uso sottocutaneo) Ovini: carne 4 giorni (uso sottocutaneo); latte 3 giorni (uso sottocutaneo) Suino: carne 13 giorni (uso intramuscolare)	104219011 104219023 104219035	QJ01MA90	Sistemico
		VALEMAS 5 50 mgml soluzione iniettabile per cani e gatti	Enrofloxacin	Soluzione iniettabile		Cane, Gatto	Uso sottocutaneo		104219011 104219023 104219035	QJ01MA90	Sistemico

Categoria B - LIMITARE

Classe di antibiotici	Molecola	Specialità veterinaria	Sostanze attive	Forma farmaceutica	Specie DPA	Specie non DPA	Vie di somministrazione	Tempi di attesa	Codice AIC	ATCvet	Uso (da ATCvet)
CHINOLONI: FLUOROCHINOLONI E ALTRI CHINOLONI	enrofloxacina	XEDEN 15 MG TABLET FOR CATS	Enrofloxacin	Compressa		Gatto	Uso orale		103993010 103993022 103993034 103993046 103993059 103993061 103993073 103993097	QJ01MA90	Sistemico
		XEDEN 200 MG TABLET FOR DOGS	Enrofloxacin	Compressa		Cane	Uso orale		103993010 103993022 103993034 103993046 103993059 103993061 103993073 103993097	QJ01MA90	Sistemico
		XEDEN INIETTABILE 100 mgml soluzione iniettabile per bovini ovini suini	Enrofloxacin	Soluzione iniettabile	Ovino, Suino, Bovini		Uso endovenoso; Uso intramuscolare; Uso sottocutaneo	Bovini: carne 12 giorni (uso sottocutaneo); carne 5 giorni (uso endovenoso); latte 3 giorni (uso endovenoso); latte 4 giorni (uso sottocutaneo) Bovini (vitelli): carne 12 giorni (uso sottocutaneo); carne 5 giorni (uso endovenoso) Ovini: carne 4 giorni (uso sottocutaneo); latte 3 giorni (uso sottocutaneo) Suino: carne 12 giorni (uso intramuscolare); carne 13 giorni (uso intramuscolare, uso sottocutaneo)	104206014 104206026 104206038 104206053 104206065 104206077 104206089 104206091 104206103 104206115 104206127 104206139	QJ01MA90	Sistemico
		XEDEN INIETTABILE 50 mgml soluzione iniettabile per bovini vitelli ovini suini	Enrofloxacin	Soluzione iniettabile	Bovini (vitello), Ovino, Suino		Uso endovenoso; Uso intramuscolare; Uso sottocutaneo	Bovini: carne 12 giorni (uso sottocutaneo); carne 5 giorni (uso endovenoso); latte 3 giorni (uso endovenoso); latte 4 giorni (uso sottocutaneo) Bovini (vitelli): carne 12 giorni (uso sottocutaneo); carne 5 giorni (uso endovenoso) Ovini: carne 4 giorni (uso sottocutaneo); latte 3 giorni (uso sottocutaneo) Suino: carne 12 giorni (uso intramuscolare); carne 13 giorni (uso intramuscolare, uso sottocutaneo)	104206014 104206026 104206038 104206053 104206065 104206077 104206089 104206091 104206103 104206115 104206127 104206139	QJ01MA90	Sistemico
		XEDEN INIETTABILE 50 mgml soluzione iniettabile per cani gatti	Enrofloxacin	Soluzione iniettabile		Cane, Gatto	Uso sottocutaneo		104206014 104206026 104206038 104206053 104206065 104206077 104206089 104206091 104206103 104206115 104206127 104206139	QJ01MA90	Sistemico
		XEDEN VET 150 MG TABLET FOR DOGS	Enrofloxacin	Compressa		Cane	Uso orale		103993010 103993022 103993034 103993046 103993059 103993061 103993073 103993097	QJ01MA90	Sistemico
		XEDEN VET 50 MG TABLET FOR DOGS	Enrofloxacin	Compressa		Cane	Uso orale		103993010 103993022 103993034 103993046 103993059 103993061 103993073 103993097	QJ01MA90	Sistemico
	quina	Colifarm 200 flumechina premiscela per alimenti medicamentosi per suini e pesci	Flumequine	Premiscela per alimenti medicamentosi	Pesce, Suino		Somministrazione con il mangime	Pesci: carne 70 gradi giorno (somministrazione con il mangime) Suino: carne 2 giorni (somministrazione con il mangime)	102821016 102821028	QJ01MB07	Sistemico
		DOXAQUIN	Flumequine	Polvere orale	Bovini (vitello), Suino, Tacchino, Polli, Coniglio		Somministrazione in acqua da bere/latte; Somministrazione in acqua da bere	Bovini (vitelli): carne 8 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Conigli: carne 6 giorni (somministrazione in acqua da bere) Pollo: carne 6 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino: carne 8 giorni (somministrazione in acqua da bere/latte) Uccelli (tacchino): carne 6 giorni (somministrazione in acqua da bere)	100172030	QJ01MB07	Sistemico
		FLUMECHINA 2 LIQUIDA 20 mgml soluzione orale per uso in acqua da bere o in mangime liquido per uccelli da gabbia e da voliera e colombi viaggiatori	Flumequine	Soluzione orale		Colombo, Uccelli da gabbia e da voliera	Somministrazione in acqua da bere		102830015 102830027 102830039	QJ01MB07	Sistemico

Categoria B - LIMITARE

Classe di antibiotici	Molecola	Specialità veterinaria	Sostanze attive	Forma farmaceutica	Specie DPA	Specie non DPA	Vie di somministrazione	Tempi di attesa	Codice AIC	ATCvet	Uso (da ATCvet)
CHINOLONI: FLUOROCHINOLONI E ALTRI CHINOLONI	flume	Flumechina 20 Chemifarma polvere per soluzione orale per polli e suini	Flumequine	Polvere per somministrazione in acqua da bere	Pollo (pollo da carne), Suino		Somministrazione in acqua da bere	Pollo (broiler): carne 5 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino: carne 2 giorni (somministrazione in acqua da bere)	102831017 102831031	QJ01MB07	Sistemico
		FLUMECHINA 20 LIQUIDA TREI	Flumequine	Soluzione orale	Pollo (pollo da carne)		Somministrazione in acqua da bere	Pollo (broiler): carne 2 giorni (somministrazione in acqua da bere)	102825015 102825027	QJ01MB07	Sistemico
		FLUMECHINA 40 LIQUIDA DOXAL	Flumequine	Soluzione orale	Tacchino, Pollo (pollo da carne)		Somministrazione in acqua da bere	Pollo (broiler): carne 2 giorni (somministrazione in acqua da bere) Uccelli (tacchino): carne 4 giorni (somministrazione in acqua da bere)	102827019 102827021	QJ01MB07	Sistemico
		FLUMECHINA 50 LIQUIDA TREI	Flumequine	Soluzione orale	Pollo (pollo da carne)		Somministrazione in acqua da bere	Pollo (broiler): carne 2 giorni (somministrazione in acqua da bere)	102822018 102822020	QJ01MB07	Sistemico
		Flumechina 50 liquido Chemifarma 500 mgml soluzione per uso orale per broiler e suini	Flumequine	Soluzione orale	Pollo (pollo da carne), Suino		Somministrazione in acqua da bere	Pollo (broiler): carne 2 giorni (somministrazione in acqua da bere) Suino: carne 2 giorni (somministrazione in acqua da bere)	102820026 102820038	QJ01MB07	Sistemico
		FLUMEXIL 100 mgg granulato per uso in acqua da bere o mangime liquido per vitelli annutoli puledri agnelli capretti suini e suinetti conigli polli	Flumequine	Granulato per soluzione orale	Bovini (vitello), Bufalo (vitello bufalino), Cavallo (puledro), Ovino (agnello), Capra (capretto), Suino, Suino (suinetto), Polli, Coniglio		Uso orale	Bovini: carne 8 giorni (uso intramuscolare); latte 48 ore (uso intramuscolare) Bovini (vitelli): carne 8 giorni (uso orale) Bufali: carne 8 giorni (uso intramuscolare); latte 48 ore (uso intramuscolare) Bufali (annutoli): carne 8 giorni (uso orale) Caprini: carne 8 giorni (uso intramuscolare); latte 144 ore (uso intramuscolare) Caprini: carne 8 giorni (uso orale) Conigli: carne 6 giorni (uso intramuscolare, uso orale) Equidi (cavallo): carne 8 giorni (uso intramuscolare) Equidi (puledri): carne 8 giorni (uso orale) Ovini: carne 8 giorni (uso intramuscolare) Ovini (agnelli): carne 8 giorni (uso orale) Pollo: carne 6 giorni (uso intramuscolare, uso orale) Suino: carne 8 giorni (uso orale) Suino: carne 8 giorni (uso intramuscolare, uso orale)	101840015 101840104 101840116 101840155	QJ01MB07	Sistemico
	flumequina	FLUMEXIL 15 mgg pasta orale per suinetti agnelli capretti conigli e cani cuccioli	Flumequine	Pasta per uso orale	Suino (suinetto), Ovino (agnello), Capra (capretto), Coniglio	Cane, Gatto	Uso orale	Bovini: carne 8 giorni (uso intramuscolare); latte 48 ore (uso intramuscolare) Bovini (vitelli): carne 8 giorni (uso orale) Bufali: carne 8 giorni (uso intramuscolare); latte 48 ore (uso intramuscolare) Bufali (annutoli): carne 8 giorni (uso orale) Caprini: carne 8 giorni (uso intramuscolare); latte 144 ore (uso intramuscolare) Caprini: carne 8 giorni (uso orale) Conigli: carne 6 giorni (uso intramuscolare, uso orale) Equidi (cavallo): carne 8 giorni (uso intramuscolare) Equidi (puledri): carne 8 giorni (uso orale) Ovini: carne 8 giorni (uso intramuscolare) Ovini (agnelli): carne 8 giorni (uso orale) Pollo: carne 6 giorni (uso intramuscolare, uso orale) Suino: carne 8 giorni (uso orale) Suino: carne 8 giorni (uso intramuscolare, uso orale)	101840015 101840104 101840116 101840155	QJ01MB07	Sistemico
		FLUMEXIL 50 mgml sospensione iniettabile per bovini e bufalini equini ovini caprini suini conigli cani gatti polli	Flumequine	Soluzione iniettabile	Bovini, Bufalo, Cavallo, Ovino, Caprino, Suino, Coniglio, Polli	Cane, Gatto	Uso intramuscolare	Bovini: carne 8 giorni (uso intramuscolare); latte 48 ore (uso intramuscolare) Bovini (vitelli): carne 8 giorni (uso orale) Bufali: carne 8 giorni (uso intramuscolare); latte 48 ore (uso intramuscolare) Bufali (annutoli): carne 8 giorni (uso orale) Caprini: carne 8 giorni (uso intramuscolare); latte 144 ore (uso intramuscolare) Caprini: carne 8 giorni (uso orale) Conigli: carne 6 giorni (uso intramuscolare, uso orale) Equidi (cavallo): carne 8 giorni (uso intramuscolare) Equidi (puledri): carne 8 giorni (uso orale) Ovini: carne 8 giorni (uso intramuscolare) Ovini (agnelli): carne 8 giorni (uso orale) Pollo: carne 6 giorni (uso intramuscolare, uso orale) Suino: carne 8 giorni (uso orale) Suino: carne 8 giorni (uso intramuscolare, uso orale)	101840015 101840104 101840116 101840155	QJ01MB07	Sistemico
	ibafloxacina	Nessuna specialità veterinaria autorizzata in Italia									
		ALPHADERM Plus cutaneous spray solution for dogs Alphaderm Plus Soluzione cutanea spray per cani	Marbofloxacin + Ketoconazole + Prednisolone	Spray cutaneo, soluzione		Cane	Uso cutaneo		104577010 104577022	QD07CA03	Dermatologico
		ARISTOS 10 100 mgml soluzione iniettabile per bovini e scrofe	Marbofloxacin	Soluzione iniettabile	Suino (scrofa), Bovini		Uso intramuscolare; Uso sottocutaneo; Uso endovenoso	Bovini: carne 3 giorni (alto dosaggio) (uso intramuscolare); carne 6 giorni (basso dosaggio) (uso intramuscolare, uso endovenoso) Bovini: carne 6 giorni (basso dosaggio) (uso sottocutaneo); latte 36 ore (basso dosaggio) (uso intramuscolare, uso endovenoso, uso sottocutaneo); latte 72 ore (alto dosaggio) (uso intramuscolare) Suino (scrofe): carne 4 giorni (uso intramuscolare)	104197013 104197025 104197037	QJ01MA93	Sistemico
	ina	ARISTOS 2 20 mgml soluzione iniettabile per bovini e suini	Marbofloxacin	Soluzione iniettabile	Bovini, Suino		Uso sottocutaneo; Uso intramuscolare; Uso endovenoso	Bovini: carne 6 giorni (uso intramuscolare, uso endovenoso, uso sottocutaneo) Suino (suini da ingrasso): carne 4 giorni (uso intramuscolare)	104214010 104214022 104214034	QJ01MA93	Sistemico

Categoria B - LIMITARE

Classe di antibiotici	Molecola	Specialità veterinaria	Sostanze attive	Forma farmaceutica	Specie DPA	Specie non DPA	Vie di somministrazione	Tempi di attesa	Codice AIC	ATCvet	Uso (da ATCvet)
CHINOLONI: FLUOROCHINOLONI E ALTRI CHINOLONI	marbofloxaci	ARISTOS 4 40mgml soluzione iniettabile per suini	Marbofloxacin	Soluzione iniettabile	Suini (da ingrasso)		Uso intramuscolare	Suino (suini da ingrasso): carne 6 giorni (uso intramuscolare)	104453016 104453028 104453030 104453042 104453055	QJ01MA93	Sistemico
		ARISTOS P 10 mg compresse divisibili per cani e gatti	Marbofloxacin	Compressa		Cane, Gatto	Uso orale		104287014 104287026 104287038 104287040 104287053 104287065 104287077 104287089 104287091 104287103 104287115	QJ01MA93	Sistemico
		ARISTOS P 20 mg compresse divisibili per cani	Marbofloxacin	Compressa		Cane	Uso orale		104287014 104287026 104287038 104287040 104287053 104287065 104287077 104287089 104287091 104287103 104287115	QJ01MA93	Sistemico
		ARISTOS P 5 mg compresse divisibili per cani e gatti	Marbofloxacin	Compressa		Cane, Gatto	Uso orale		104287014 104287026 104287038 104287040 104287053 104287065 104287077 104287089 104287091 104287103 104287115	QJ01MA93	Sistemico
		ARISTOS P 80 mg compresse divisibili per cani	Marbofloxacin	Compressa		Cane	Uso orale		104287014 104287026 104287038 104287040 104287053 104287065 104287077 104287089 104287091 104287103 104287115	QJ01MA93	Sistemico
	marbofloxacina	AURIZON EAR DROPS SUSPENSION	Marbofloxacin + Dexamethasone acetate + Clotrimazole	Gocce auricolari, sospensione		Cane	Uso auricolare		103269015 103269027 103269039	QS02CA06	Auricolare
		BOFLOX 100 MGML BOFLOX 100 mgml	Marbofloxacin	Soluzione iniettabile	Bovini, Suino (scrofa)		Uso intramuscolare; Uso endovenoso; Uso sottocutaneo	Bovini: carne 3 giorni (uso intramuscolare); carne 6 giorni (uso sottocutaneo); latte 36 ore (uso sottocutaneo); latte 72 ore (uso intramuscolare); organi 6 giorni (uso sottocutaneo) Bovini: latte 36 ore (uso sottocutaneo) Suino: carne 4 giorni (uso intramuscolare); organi 4 giorni (uso intramuscolare)	104499013 104499025	QJ01MA93	Sistemico
		Boflox flavour 20mg	Marbofloxacin	Compressa		Cane, Gatto	Uso orale		104982018 104982020 104982032 104982044	QJ01MA93	Sistemico
		Boflox flavour 80mg oral tablet for dogs	Marbofloxacin	Compressa		Cane	Uso orale		104982018 104982020 104982032 104982044	QJ01MA93	Sistemico

Categoria B - LIMITARE

Classe di antibiotici	Molecola	Specialità veterinaria	Sostanze attive	Forma farmaceutica	Specie DPA	Specie non DPA	Vie di somministrazione	Tempi di attesa	Codice AIC	ATCvet	Uso (da ATCvet)
CHINOLONI: FLUOROCHINOLONI E ALTRI CHINOLONI	marbofloxacina	EFEX 100 MG CHEWABLE TABLETS FOR DOGS	Marbofloxacin	Compressa masticabile		Cane	Uso orale		104514017 104514029 104514031 104514043 104514056 104514068 104514070 104514082 104514094 104514106 104514118 104514120 104514132 104514144 104514157 104514169 104514171 104514183 104514195 104514207 104514219 104514221	QJ01MA93	Sistemico
		EFEX 40 MG CHEWABLE TABLETS FOR DOGS	Marbofloxacin	Compressa masticabile		Cane	Uso orale		104514017 104514029 104514031 104514043 104514056 104514068 104514070 104514082 104514094 104514106 104514118 104514120 104514132 104514144 104514157 104514169 104514171 104514183 104514195 104514207 104514219 104514221	QJ01MA93	Sistemico
		EFEX10 MG CHEWABLE TABLETS FOR CATS AND DOGS	Marbofloxacin	Compressa masticabile		Cane, Gatto	Uso orale		104514017 104514029 104514031 104514043 104514056 104514068 104514070 104514082 104514094 104514106 104514118 104514120 104514132 104514144 104514157 104514169 104514171 104514183 104514195 104514207 104514219 104514221	QJ01MA93	Sistemico
		FORCYL 160 MGML SOLUTION FOR INJECTION FOR CATTLE	Marbofloxacin	Soluzione iniettabile	Bovini		Uso intramuscolare; Uso endovenoso	Bovini: carne 5 giorni (uso intramuscolare) Bovini: latte 48 ore (uso intramuscolare)	104276011 104276023 104276035	QJ01MA93	Sistemico
		FORCYL SWINE 160 MGML SOLUTION FOR INJECTION FOR PIGS	Marbofloxacin	Soluzione iniettabile	Suino		Uso intramuscolare	Suino: carne 9 giorni (uso intramuscolare)	104428014 104428026 104428038	QJ01MA93	Sistemico
		MAFLOXIN	Marbofloxacin	Soluzione iniettabile	Bovini, Suino (scrofa)		Uso intramuscolare; Uso endovenoso; Uso sottocutaneo	Bovini: carne 6 giorni (uso sottocutaneo, uso endovenoso, uso intramuscolare); latte 36 ore (uso sottocutaneo, uso endovenoso, uso intramuscolare) Suino (scrofe): carne 4 giorni (uso intramuscolare)	104359017	QJ01MA93	Sistemico
		MARBO FD	Marbofloxacin	Polvere e solvente per soluzione iniettabile		Cane, Gatto	Uso endovenoso; Uso sottocutaneo		Non presente nell'elenco ministeriale	QJ01MA93	Sistemico

Categoria B - LIMITARE

Classe di antibiotici	Molecola	Specialità veterinaria	Sostanze attive	Forma farmaceutica	Specie DPA	Specie non DPA	Vie di somministrazione	Tempi di attesa	Codice AIC	ATCvet	Uso (da ATCvet)
CHINOLONI: FLUOROCHINOLONI E ALTRI CHINOLONI	marbofloxacina	MARBOCYL 100 MGML SOLUTION FOR INJECTION FOR CATTLE AND PIGS	Marbofloxacin	Soluzione iniettabile	Bovini, Suino		Uso intramuscolare; Uso sottocutaneo	Bovini: carne 3 giorni (alto dosaggio) (uso intramuscolare); carne 6 giorni (basso dosaggio) (uso intramuscolare, uso endovenoso, uso sottocutaneo); latte 36 ore (basso dosaggio) (uso intramuscolare, uso endovenoso, uso sottocutaneo); latte 72 ore (alto dosaggio) (uso intramuscolare) Suino (scrofe): carne 4 giorni (uso intramuscolare) Suino (suini da ingrasso): carne 4 giorni (uso intramuscolare)	102602012 102602024 102602036 102602048	QJ01MA93	Sistemico
		MARBOCYL 20 MGML SOLUTION FOR INJECTION FOR CATTLE AND PIGS	Marbofloxacin	Soluzione iniettabile	Bovini (vitello), Suino		Uso intramuscolare; Uso sottocutaneo; Uso endovenoso	Bovini (vitelli): carne 6 giorni (uso intramuscolare, uso sottocutaneo) Suino (suini da ingrasso): carne 4 giorni (uso intramuscolare)	102854015 102854027 102854039 102854041 102854054	QJ01MA93	Sistemico
		Marbocyl P 20 mg compresse per cani	Marbofloxacin	Compressa		Cane	Uso orale		102611100 102611112 102611124 102611136 102611148 102611151 102611163 102611175 102611187	QJ01MA93	Sistemico
		Marbocyl P 5 mg compresse per cani e gatti	Marbofloxacin	Compressa		Cane, Gatto	Uso orale		102611100 102611112 102611124 102611136 102611148 102611151 102611163 102611175 102611187	QJ01MA93	Sistemico
		Marbocyl P 80 mg compresse per cani	Marbofloxacin	Compressa		Cane	Uso orale		102611100 102611112 102611124 102611136 102611148 102611151 102611163 102611175 102611187	QJ01MA93	Sistemico
		MARBOGEN COMPLEX MARBOGEN COMPLEX ear drops solution for dogs	Prednisolone + Ketoconazole + Gentamicin sulfate + Marbofloxacin	Gocce auricolari, soluzione		Cane	Uso auricolare		104898010	QS02AA30	Auricolare
		MARBOSYVA 100 mgml solution for injection for cattle and pigs Marbosyva 100 mgml soluzione iniettabile per bovini e suini	Marbofloxacin	Soluzione iniettabile	Bovini, Suino (scrofa)		Uso intramuscolare; Uso endovenoso; Uso sottocutaneo	Bovini: carne 3 giorni (alto dosaggio) (uso intramuscolare); carne 6 giorni (basso dosaggio) (uso intramuscolare, uso sottocutaneo); latte 36 ore (basso dosaggio) (uso intramuscolare, uso sottocutaneo); latte 72 ore (alto dosaggio) (uso intramuscolare) Suino (scrofe): carne 4 giorni (uso intramuscolare)	104490014 104490026 104490038	QJ01MA93	Sistemico
		Marbotis 3 mgml + 10 mgml + 1 mgml gocce auricolari sospensione per cani Otisan 3 mgml + 10 mgml + 1 mgml ear drops suspension for dogs	Marbofloxacin + Clotrimazole + Dexamethasone acetate	Gocce auricolari, sospensione		Cane	Uso auricolare		105755019 105755021	QS02CA06	Auricolare
		MARBOX 100 MGML SOLUTION FOR INJECTION FOR CATTLE AND PIGS	Marbofloxacin	Soluzione iniettabile	Bovini, Suino (scrofa)		Uso intramuscolare; Uso sottocutaneo	Bovini: carne 3 giorni (uso intramuscolare); carne 6 giorni (uso sottocutaneo); latte 36 ore (uso sottocutaneo); latte 72 ore (uso intramuscolare) Suino (scrofe): carne 4 giorni (uso intramuscolare)	104221015 104221027 104221039	QJ01MA93	Sistemico
		MARFLOQUIN 100 MGML SOLUTION FOR INJECTION FOR BOVINES AND PIGS SOWS Marfloquin 100 mgml soluzione iniettabile per bovini e suini scrofe	Marbofloxacin	Soluzione iniettabile	Bovini, Suino (scrofa)		Uso intramuscolare; Uso sottocutaneo; Uso endovenoso	Bovini: latte 36 ore (basso dosaggio) (uso intramuscolare); latte 72 ore (alto dosaggio) (uso intramuscolare) Bovini (bovini da carne): carne 3 giorni (alto dosaggio) (uso intramuscolare); carne 6 giorni (basso dosaggio) (uso intramuscolare) Suino (scrofe): carne 4 giorni (uso intramuscolare)	104268014 104268026 104268038	QJ01MA93	Sistemico
		Marfloxin 20 mg Tablets for Dogs Marfloxin 20 mg compresse per cani	Marbofloxacin	Compressa		Cane	Uso orale		104492018 104492020 104492032 104492044 104492057 104492069	QJ01MA93	Sistemico
		Marfloxin 5 mg Tablets for Cats and Dogs Marfloxin 5 mg compresse per gatti e cani	Marbofloxacin	Compressa		Cane, Gatto	Uso orale		104492018 104492020 104492032 104492044 104492057 104492069	QJ01MA93	Sistemico
		Marfloxin 80 mg Tablets for Dogs Marfloxin 80 mg compresse per cani	Marbofloxacin	Compressa		Cane	Uso orale		104492018 104492020 104492032 104492044 104492057 104492069	QJ01MA93	Sistemico

Categoria B - LIMITARE

Classe di antibiotici	Molecola	Specialità veterinaria	Sostanze attive	Forma farmaceutica	Specie DPA	Specie non DPA	Vie di somministrazione	Tempi di attesa	Codice AIC	ATCvet	Uso (da ATCvet)
CHINOLONI: FLUOROCHINOLONI E ALTRI CHINOLONI		MASTERFLOX MASTERFLOX 40 mgml solution for injection for pigs	Marbofloxacin	Soluzione iniettabile	Suini (da ingrasso)		Uso intramuscolare	Suino: carne 6 giorni (uso intramuscolare)	104612015 104612027 104612039 104612041	QJ01MA93	Sistemico
		MASTERFLOX 10 SOLO 100 mgml soluzione iniettabile per suini	Marbofloxacin	Soluzione iniettabile	Suino		Uso intramuscolare	Suino: carne 8 giorni (uso intramuscolare)	104802018 104802020 104802032 104802044 104802057	QJ01MA93	Sistemico
		OTOXOLAN gocce auricolari sospensione per cani Otoxolan ear drops suspension for dogs	Marbofloxacin + Clotrimazole + Dexamethasone acetate	Gocce auricolari, sospensione		Cane	Uso auricolare		104990015 104990027 104990039	QS02CA06	Auricolare
		Quiflor 100 mgml solution for injection for cattle and pigs sows	Marbofloxacin	Soluzione iniettabile	Bovini, Suino (scrofa da riproduzione)		Uso endovenoso; Uso sottocutaneo; Uso intramuscolare	Bovini: carne 6 giorni (uso intramuscolare) Bovini: latte 36 ore (uso intramuscolare) Bovini (bovini da carne): carne 6 giorni (uso intramuscolare) Suino (suini da ingrasso): carne 4 giorni (uso intramuscolare)	104298017 104298029 104298031	QJ01MA93	Sistemico
		Quiflor S 100 mgml solution for injection for cattle	Marbofloxacin	Soluzione iniettabile	Bovini		Uso intramuscolare	Bovini: latte 72 ore (uso intramuscolare) Bovini (bovini da carne): carne 3 giorni (uso intramuscolare)	104297027 104297039	QJ01MA93	Sistemico
	norfloxacina	Nessuna specialità veterinaria autorizzata in Italia									
	orbifloxacina	Posatex 85 mgml orbifloxacin + 09 mgml mometasone furoate + 09 mgml posaconazole Ear drops suspension	Mometasone furoate + Posaconazole + Orbifloxacin	Gocce auricolari, sospensione		Cane	Uso auricolare		104095017 104095029 104095031	QS02CA91	Auricolare
	acido oxolinico	Nessuna specialità veterinaria autorizzata in Italia									
	pradofloxacina	Veraflox 120 mg Tablet	Pradofloxacin	Compressa		Cane	Uso orale		104311016 104311028 104311030 104311042 104311055 104311067 104311079 104311081 104311093 104311105 104311117 104311129 104311131 104311143	QJ01MA97	Sistemico
	pradofloxacina	Veraflox 15 mg Tablet	Pradofloxacin	Compressa		Cane, Gatto	Uso orale		104311016 104311028 104311030 104311042 104311055 104311067 104311079 104311081 104311093 104311105 104311117 104311129 104311131 104311143	QJ01MA97	Sistemico

Categoria B - LIMITARE

Classe di antibiotici	Molecola	Specialità veterinaria	Sostanze attive	Forma farmaceutica	Specie DPA	Specie non DPA	Vie di somministrazione	Tempi di attesa	Codice AIC	ATCvet	Uso (da ATCvet)
CHINOLONI: FLUOROCHINOLONI E ALTRI CHINOLONI	pradofloxacina	Veraflox 25 mgml Oral suspension	Pradofloxacin	Sospensione orale		Gatto	Uso orale		104311016 104311028 104311030 104311042 104311055 104311067 104311079 104311081 104311093 104311105 104311117 104311129 104311131 104311143	QJ01MA97	Sistemico
		Veraflox 60 mg Tablet	Pradofloxacin	Compressa		Cane	Uso orale		104311016 104311028 104311030 104311042 104311055 104311067 104311079 104311081 104311093 104311105 104311117 104311129 104311131 104311143	QJ01MA97	Sistemico

Categoria A - EVITARE

Classe di antibiotici	Molecola	Specialità veterinaria	Sostanze attive	Forma farmaceutica	Specie DPA	Specie non DPA	Vie di somministrazione	Tempi di attesa	Codice AIC	ATCvet	Uso (da ATCvet)
AMDINOPENICILLINE	**mecillinam**	Nessuna specialità veterinaria autorizzata in Italia									
	pivmecillinam	Nessuna specialità veterinaria autorizzata in Italia									
CARBAPENEMI	**meropenem**	Nessuna specialità veterinaria autorizzata in Italia									
	doripenem	Nessuna specialità veterinaria autorizzata in Italia									
MEDICINALI USATI SOLO PER TRATTARE LA TUBERCOLOSI O ALTRE MALATTIE CAUSATE DA MICOBATTERI	**isoniazide**	Nessuna specialità veterinaria autorizzata in Italia									
	etambutolo	Nessuna specialità veterinaria autorizzata in Italia									
	pirazinamide	Nessuna specialità veterinaria autorizzata in Italia									
	etionamide	Nessuna specialità veterinaria autorizzata in Italia									
GLICOPEPTIDI	**vancomicina**	Nessuna specialità veterinaria autorizzata in Italia									
KETOLIDI	**telitromicina**	Nessuna specialità veterinaria autorizzata in Italia									
LIPOPEPTIDI	**daptomicina**	Nessuna specialità veterinaria autorizzata in Italia									

Categoria A - EVITARE

Classe di antibiotici	Molecola	Specialità veterinaria	Sostanze attive	Forma farmaceutica	Specie DPA	Specie non DPA	Vie di somministrazione	Tempi di attesa	Codice AIC	ATCvet	Uso (da ATCvet)
GLICICICLINE	**tigeciclina**	Nessuna specialità veterinaria autorizzata in Italia									
MONOBATTAMI	**aztreonam**	Nessuna specialità veterinaria autorizzata in Italia									
OXAZOLIDINONI	**linezolid**	Nessuna specialità veterinaria autorizzata in Italia									
DERIVATI DELL'ACIDO FOSFONICO	**fosfomicina**	Nessuna specialità veterinaria autorizzata in Italia									
RIFAMICINE (TRANNE RIFAXIMINA)	**rifampicina**	Nessuna specialità veterinaria autorizzata in Italia									
RIMINOFENAZINE	**clofazimina**	Nessuna specialità veterinaria autorizzata in Italia									
ALTRE CEFALOSPORINE E PENEMI (ATC J01D), COMPRESE LE COMBINAZIONI DI CEFALOSPORINE DI	**ceftobiprolo**	Nessuna specialità veterinaria autorizzata in Italia									

Categoria A - EVITARE

Classe di antibiotici	Molecola	Specialità veterinaria	Sostanze attive	Forma farmaceutica	Specie DPA	Specie non DPA	Vie di somministrazione	Tempi di attesa	Codice AIC	ATCvet	Uso (da ATCvet)
ALTRE CEFALOSPORINE E PENEMI (ATC J01DI), COMPRESE LE COMBINAZIONI DI CEFALOSPORINE DI TERZA GENERAZIONE CON INIBITORI DELLE BETA-LATTAMASI	**ceftarolina**	Nessuna specialità veterinaria autorizzata in Italia									
	ceftalozano-tazobactam	Nessuna specialità veterinaria autorizzata in Italia									
	faropenem	Nessuna specialità veterinaria autorizzata in Italia									
ACIDI PSEUDOMONICI	**mupirocina**	Nessuna specialità veterinaria autorizzata in Italia									
CARBOSSIPENICILLINA E UREIDOPENICILLINA, COMPRESE LE COMBINAZIONI CON INIBITORI DELLE BETA-LATTAMASI	**piperacillina-tazobactam**	Nessuna specialità veterinaria autorizzata in Italia									
SOLFONI	**dapsone**	Nessuna specialità veterinaria autorizzata in Italia									
STREPTOGRAMINE	**pristinamicina**	Nessuna specialità veterinaria autorizzata in Italia									

Categoria A - EVITARE

Classe di antibiotici	Molecola	Specialità veterinaria	Sostanze attive	Forma farmaceutica	Specie DPA	Specie non DPA	Vie di somministrazione	Tempi di attesa	Codice AIC	ATCvet	Uso (da ATCvet)
STREPTOGRAMINE	**virginiamicina**	Nessuna specialità veterinaria autorizzata in Italia									

Categoria	Classe di antibiotici	Molecola	pecialità autorizzate in I
D	Aminopenicilline senza inibitori delle beta-lattamasi	amoxicillina	49
D	Aminopenicilline senza inibitori delle beta-lattamasi	ampicillina	14
D	Aminopenicilline senza inibitori delle beta-lattamasi	metampicillina	0
D	Aminoglicosidi: solo spectinomicina	spectinomicina	2
D	Sulfonamidi, inibitori della diidrofolato reduttasi e combinazioni	formosulfatiazolo	5
D	Sulfonamidi, inibitori della diidrofolato reduttasi e combinazioni	ftalilsulfatiazolo	0
D	Sulfonamidi, inibitori della diidrofolato reduttasi e combinazioni	sulfacetamide	0
D	Sulfonamidi, inibitori della diidrofolato reduttasi e combinazioni	sulfaclorpiridazina	0
D	Sulfonamidi, inibitori della diidrofolato reduttasi e combinazioni	sulfaclozina	0
D	Sulfonamidi, inibitori della diidrofolato reduttasi e combinazioni	sulfadiazina	17
D	Sulfonamidi, inibitori della diidrofolato reduttasi e combinazioni	sulfadimetoxina	21
D	Sulfonamidi, inibitori della diidrofolato reduttasi e combinazioni	sulfadimidina	6
D	Sulfonamidi, inibitori della diidrofolato reduttasi e combinazioni	sulfadoxina	0
D	Sulfonamidi, inibitori della diidrofolato reduttasi e combinazioni	sulfafurazolo	0
D	Sulfonamidi, inibitori della diidrofolato reduttasi e combinazioni	sulfaguanidina	1
D	Sulfonamidi, inibitori della diidrofolato reduttasi e combinazioni	sulfalene	0
D	Sulfonamidi, inibitori della diidrofolato reduttasi e combinazioni	sulfamerazina	2
D	Sulfonamidi, inibitori della diidrofolato reduttasi e combinazioni	sulfametizolo	0
D	Sulfonamidi, inibitori della diidrofolato reduttasi e combinazioni	sulfametoxazolo	4
D	Sulfonamidi, inibitori della diidrofolato reduttasi e combinazioni	sulfametoxipiridazina	0
D	Sulfonamidi, inibitori della diidrofolato reduttasi e combinazioni	sulfamonometoxina	4
D	Sulfonamidi, inibitori della diidrofolato reduttasi e combinazioni	sulfanilamide	1
D	Sulfonamidi, inibitori della diidrofolato reduttasi e combinazioni	sulfapiridina	1
D	Sulfonamidi, inibitori della diidrofolato reduttasi e combinazioni	sulfachinossalina	7
D	Sulfonamidi, inibitori della diidrofolato reduttasi e combinazioni	sulfatiazolo	1
D	Sulfonamidi, inibitori della diidrofolato reduttasi e combinazioni	trimetoprim	31
D	Tetracicline	clortetraciclina	16
D	Tetracicline	doxiciclina	47
D	Tetracicline	oxitetraciclina	43
D	Tetracicline	tetraciclina	2
D	Penicilline anti-stafilococciche (penicilline beta-lattamasi resistenti)	cloxacillina	11
D	Penicilline anti-stafilococciche (penicilline beta-lattamasi resistenti)	dicloxacillina	2
D	Penicilline anti-stafilococciche (penicilline beta-lattamasi resistenti)	nafcillina	0

Categoria	Classe di antibiotici	Molecola	ɔecialità autorizzate in I
D	Penicilline anti-stafilococciche (penicilline beta-lattamasi resistenti)	oxacillina	1
D	Penicilline naturali a spettro ristretto (penicilline sensibili alle beta-lattamasi)	benzilpenicillina benzatinica	0
D	Penicilline naturali a spettro ristretto (penicilline sensibili alle beta-lattamasi)	fenossimetilpenicillina benzatinica	0
D	Penicilline naturali a spettro ristretto (penicilline sensibili alle beta-lattamasi)	benzilpenicillina	1
D	Penicilline naturali a spettro ristretto (penicilline sensibili alle beta-lattamasi)	benzilpenicillina procaina	10
D	Penicilline naturali a spettro ristretto (penicilline sensibili alle beta-lattamasi)	penetamato iodidrato	5
D	Penicilline naturali a spettro ristretto (penicilline sensibili alle beta-lattamasi)	feneticillina	0
D	Penicilline naturali a spettro ristretto (penicilline sensibili alle beta-lattamasi)	fenossimetilpenicillina	3
D	Polipeptidi ciclici	bacitracina	2
D	Nitroimidazoli	metronidazolo	11
D	Antibatterici steroidei	acido fusidico	3
D	Derivati nitrofuranici	furaltadone	0
D	Derivati nitrofuranici	furazolidone	3
C	Aminoglicosidi (tranne spectinomicina)	amikacina	1
C	Aminoglicosidi (tranne spectinomicina)	apramicina	3
C	Aminoglicosidi (tranne spectinomicina)	diidrostreptomicina	13
C	Aminoglicosidi (tranne spectinomicina)	framicetina	2
C	Aminoglicosidi (tranne spectinomicina)	gentamicina	12
C	Aminoglicosidi (tranne spectinomicina)	kanamicina	3
C	Aminoglicosidi (tranne spectinomicina)	neomicina	8
C	Aminoglicosidi (tranne spectinomicina)	paromomicina	18
C	Aminoglicosidi (tranne spectinomicina)	streptomicina	3
C	Aminoglicosidi (tranne spectinomicina)	tobramicina	2
C	Aminopenicilline in associazione con inibitori delle beta-lattamasi	amoxicillina + acido clavulanico	51
C	Aminopenicilline in associazione con inibitori delle beta-lattamasi	ampicillina + sulbactam	0
C	Amfenicoli	cloramfenicolo	2

Categoria	Classe di antibiotici	Molecola	ɔecialità autorizzate in I
C	Amfenicoli	florfenicolo	44
C	Amfenicoli	tiamfenicolo	11
C	Macrolidi	eritromicina	7
C	Macrolidi	gamitromicina	2
C	Macrolidi	oleandomicina	0
C	Macrolidi	spiramicina	20
C	Macrolidi	tildipirosina	2
C	Macrolidi	tilmicosina	19
C	Macrolidi	tulatromicina	32
C	Macrolidi	tilosina	26
C	Macrolidi	tilvalosina	5
C	Cefalosporine di prima e seconda generazione e cefamicine	cefacetrile	2
C	Cefalosporine di prima e seconda generazione e cefamicine	cefadroxil	6
C	Cefalosporine di prima e seconda generazione e cefamicine	cefalexina	29
C	Cefalosporine di prima e seconda generazione e cefamicine	cefalonio	4
C	Cefalosporine di prima e seconda generazione e cefamicine	cefalotina	0
C	Cefalosporine di prima e seconda generazione e cefamicine	cefapirina	10
C	Cefalosporine di prima e seconda generazione e cefamicine	cefazolina	2
C	Lincosamidi	clindamicina	14
C	Lincosamidi	lincomicina	23
C	Lincosamidi	pirlimicina	0
C	Pleuromutiline	tiamulina	25
C	Pleuromutiline	valnemulina	2
C	Rifamicine: solo rifaximina	rifaximina	7
B	Cefalosporine di terza e quarta generazione (escluse le combinazioni con inibitori delle beta-lattamasi)	cefoperazone	2
B	Cefalosporine di terza e quarta generazione (escluse le combinazioni con inibitori delle beta-lattamasi)	cefovecina	1
B	Cefalosporine di terza e quarta generazione (escluse le combinazioni con inibitori delle beta-lattamasi)	cefquinome	11
B	Cefalosporine di terza e quarta generazione (escluse le combinazioni con inibitori delle beta-lattamasi)	ceftiofur	18
B	Polimixine	colistina	22

Categoria	Classe di antibiotici	Molecola	ɔecialità autorizzate in I
B	Polimixine	polimixina B	8
B	Chinoloni: fluorochinoloni e altri chinoloni	cinoxacina	0
B	Chinoloni: fluorochinoloni e altri chinoloni	danofloxacina	1
B	Chinoloni: fluorochinoloni e altri chinoloni	difloxacina	0
B	Chinoloni: fluorochinoloni e altri chinoloni	enrofloxacina	55
B	Chinoloni: fluorochinoloni e altri chinoloni	flumequina	11
B	Chinoloni: fluorochinoloni e altri chinoloni	ibafloxacina	0
B	Chinoloni: fluorochinoloni e altri chinoloni	marbofloxacina	37
B	Chinoloni: fluorochinoloni e altri chinoloni	norfloxacina	0
B	Chinoloni: fluorochinoloni e altri chinoloni	orbifloxacina	1
B	Chinoloni: fluorochinoloni e altri chinoloni	acido oxolinico	0
B	Chinoloni: fluorochinoloni e altri chinoloni	pradofloxacina	4
A	Amdinopenicilline	mecillinam	0
A	Amdinopenicilline	pivmecillinam	0
A	Carbapenemi	meropenem	0
A	Carbapenemi	doripenem	0
A	Medicinali usati solo per trattare la tubercolosi o altre malattie causate da micobatteri	isoniazide	0
A	Medicinali usati solo per trattare la tubercolosi o altre malattie causate da micobatteri	etambutolo	0
A	Medicinali usati solo per trattare la tubercolosi o altre malattie causate da micobatteri	pirazinamide	0
A	Medicinali usati solo per trattare la tubercolosi o altre malattie causate da micobatteri	etionamide	0
A	Glicopeptidi	vancomicina	0
A	Ketolidi	telitromicina	0
A	Lipopeptidi	daptomicina	0
A	Glicicicline	tigeciclina	0
A	Monobattami	aztreonam	0
A	Oxazolidinoni	linezolid	0
A	Derivati dell'acido fosfonico	fosfomicina	0
A	Rifamicine (tranne rifaximina)	rifampicina	0
A	Riminofenazine	clofazimina	0

Categoria	Classe di antibiotici	Molecola	pecialità autorizzate in I
A	Altre cefalosporine e penemi (ATC J01DI), comprese le combinazioni di cefalosporine di terza generazione con inibitori delle beta-lattamasi	ceftobiprolo	0
A	Altre cefalosporine e penemi (ATC J01DI), comprese le combinazioni di cefalosporine di terza generazione con inibitori delle beta-lattamasi	ceftarolina	0
A	Altre cefalosporine e penemi (ATC J01DI), comprese le combinazioni di cefalosporine di terza generazione con inibitori delle beta-lattamasi	ceftalozano-tazobactam	0
A	Altre cefalosporine e penemi (ATC J01DI), comprese le combinazioni di cefalosporine di terza generazione con inibitori delle beta-lattamasi	faropenem	0
A	Acidi pseudomonici	mupirocina	0
A	Carbossipenicillina e ureidopenicillina, comprese le combinazioni con inibitori delle beta-lattamasi	piperacillina-tazobactam	0
A	Solfoni	dapsone	0
A	Streptogramine	pristinamicina	0
A	Streptogramine	virginiamicina	0